MX012048



CARNERINA NO. 5 GESTACION API ABA LINCOMICINA Y CLORTETRACICLINA 40KG PE

Alimento balanceado medicado con lincomicina y clortetraciclina base para cerdas en gestación

Autorización SAGARPA A-0544-507

Análisis garantizado Proteína, mín. 13.0% Grasa, mín. 4.0% Humedad, máx. 12.0% Fibra, máx. 7.0% Cenizas, máx. 10.0%

54.0%

E.L.N.

Ingredientes

Granos y subproductos de cereales, pastas y subproductos de oleaginosas, aceite vegetal, melaza de caña, carbonato de calcio, ortofosfato de calcio, cloruro de sodio, ôxido o sulfato de manganeso, sulfato de cobre, ôxido o sulfato de zinc, sulfato de cobre, ôxido o sulfato de zinc, sulfato de cobre, oxido o sulfato de zinc, sulfato de cobre, oxido o sulfato de zinc, sulfato de cobre, oxido o sulfato ferroso, yoduro de potasio e DDDI, selemito orgánico, cromo orgánico, vitaminas A, D, E y K estabilizadas, vitaminas del complejo B, vitamina C, cloruro de colina, aminoácidos (lisina, metionina, treonina, triptófano), saborizante o aromatizante frutal sintético, levaduras deshidratadas Saccharomyces cerevisiae (2x10°9 UFC/kg·), enzimas deshidratadas (fitasa 500 FTU/kg·) o xilanasa 1250 U/kg·, glucanasa 200 U/kg·, clutasa 200 U/kg·, manasa 1800 U/kg·), fincomicina (100 gft), cfortetraciclina (400(gft)).

Indicaciones de uso

Alimento balanceado medicado con fincomicina y clortetraciclina para cerdas en gestación.

Presentación en pellet que ayuda a consumirlo adecuadamente. Formulado y elaborado con proteínas , granos de cereales procesados, minerales, vitaminas y aditivos que proporcionan los nutrientes necesarios para la gestación de las cerdas.

Indicado su uso 7 días para tratamiento de enfermedades respiratorias por Mycoplasma spp y Actinobacillus pleuropneumoniae (App), y de enfermedades entéricas como Enteropatías Proliferativas

DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACIÓN: Proporcionar 2 a 3.5 kg/cerda/día. Oral.

Tratar de ofrecerlo en 2 servidas al día. Bajo prescripción y supervisión del médico veterinario

ADVERTENCIAS: Evitar la contaminación del alimento. No almacenar el alimento en lugares húmedos

calientes, y mal ventilados, hágalo en sitios secos y protegidos de roedores, insectos y otros animales

De preferencia, estibar sobre tarimas y no dejar el alimento directamente sobre el suelo y/o en

contacto con paredes.

Tiempo de retiro; No destinar para consumo humano la carne de los animales tratados hasta transcurridos 5 días después de la última administración.

Porcinas (EPP). Mantener en todo momento aqua potable y fresca para las cerdas.

CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO.

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA. Fecha de caducidad: 3 meses después de la fecha de producción

CARNERINA NO. 5 GESTACION API ABA LINCOMICINA Y CLORTETRACICLINA 40KG PE

"Autorizado para su comercialización en empague cerrado"