MX012068



CAPORINA INICIADOR API ABA SALINOMICINA 40KG ME CD

Alimento balanceado medicado con Salinomicina para pollitos de engorda

Autorización SAGARPA A-0544-611

| Análisis | Garantizado |
|----------|-------------|
| , monto | |

Proteina, min. 22.0% Grasa, min. 3.5%

Humedad, máx. 12.0%

Fibra, máx. 3.0% Cenizas, máx. 7.0%

E.L.N. 52.5%

Ingredientes

Maíz o sorgo o trigo, harina de trigo, pastas y subproductos de oleaginosas, subproductos de cereales, harina de pescado, carbonato de calcio, levaduras deshidratadas (Saccharomyces cerevisiae boulardii 4x10⁴9 UFC/kg), ortofosfato de calcio, sal común (cloruro de sodio), vitaminas: A, D, E, K, B-1, B-2,B-8, B-12, niacina, ácido pantoténico, ácido fólico, biotina,

cofina, minerales orgânicos (todo, hierro, cobre, magnesio, manganeso, zinc, cobalto), color amarillo #5, enzimas deshidratadas (fitasa: 500 FTU/kg, xilanasa: 1200 U/kg, 8 glucanasa: 200

U/kg, celulasa: 200 U/kg, manasa: 1800 U/kg), carotenoides naturales.

Salinomicina 60 g/t.

Indicaciones de uso

Nimento balanceado medicado con Salinomicina para poliitos de engorda del 1er día de nacido lasta los 21 días de edad

CAPORINA INICIADOR es un alimento completo, con 22% de proteína. Este alimento esta diseñado ara politlos desde el 1er día u octavo día si se utiliza preiniciador hasta los 21 días de edad, portando los requerimientos de aminoácidos y energía necesarios para que el polític crezca ano hasta la etapa de engorda.

Il día 22 de edad sustituya este alimento por CAPORINA CRECIMIENTO. Mantenga una emperatura constante de 33°C la primera semana de vida suministre agua limpia y alimento a libertad. JOSIS Y VIA DE ADMINISTRACION: A libre acceso via oral, del 1er día de nacido hasta los 11 días de edad.

ADVERTENCIAS: Retirar 4 días previos al sacrificio de los animales destinados al consumo humano lo debe utilizarse como tratamiento curativo. No administrar en aves

le postura, productora de huevo para plato destinado para consumo humano.

lo almacenar el alimento en lugares húmedos, calientes y mal ventilados, hágalo en sitios secos y rotegidos de roedores, insectos y otros animales.

Estibar sobre tarimas y nunca dejar el alimento directamente sobre el suelo y/o en contacto con varedes

CONSULTE A SU MEDICO VETERINARIO SU VENTA REQUIERE RECETA MEDICA

Fecha de caducidad: 3 meses después de la fecha de producción



A09

CAPORINA INICIADOR API ABA SALINOMICINA 40KG ME CD