Guía del Paciente: El Control de su Presión Arterial Empieza en Casa

La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes arteriales. La hipertensión persistente es un riesgo acumulativo para el corazón, riñones y salud cerebral, aumentando el riesgo de demencia. El monitoreo en el hogar (AMPA) es fundamental para obtener datos reales, evitando el 'efecto de bata blanca', y ajustar el tratamiento.

PASO A PASO: CÓMO MEDIR SU PRESIÓN CORRECTAMENTE

1

Prepárese 30 minutos antes: No fume, no tome café ni haga ejercicio. Vejiga vacía.

2

Reposo absoluto de 5 minutos: Sentado en silencio, sin distracciones, sin celular ni hablar.

3

Posición corporal correcta: Espalda apoyada, pies planos (sin cruzar piernas), brazo apoyado a la altura del corazón.

4

Use un brazalete validado: Sobre piel desnudo, tamaño adecuado para evitar errores.

5

Realice tomas dobles: Dos mediciones separadas por 1 o 2 minutos, mañana y noche, idealmente 7 días seguidos.

¿QUÉ SIGNIFICAN SUS RESULTADOS?

1. **PRESIÓN NORMAL**
   <120/80 mmHg
   Objetivo ideal para proteger corazón y cerebro a largo plazo.
2. **PRESIÓN ELEVADA**
   120-129 / <80 mmHg
   Aviso para iniciar cambios de estilo de vida.
3. **HIPERTENSIÓN NIVEL 1**
   130-139 / 80-99 mmHg
   Riesgo cardiovascular aumenta; médico evaluará medicación.
4. **HIPERTENSIÓN NIVEL 2**
   ≥140 / ≥90 mmHg
   Requiere inicio inmediato de tratamiento farmacológico.

CRISIS HIPERTENSIVA: >180 / >120 mmHg.
Si tiene síntomas como dolor de pecho o dificultad para hablar, llame a emergencias de inmediato; es una situación de vida e muerte.

LOS RIESGOS DEL MAL CONTROL



DETERIORO COGNITIVO Y DEMENCIA
Daña pequeños vasos cerebrales, acelerando pérdida de memoria y salud mental.

DAÑO CARDÍACO Y ACCIDENTES CEREBROVASCULARES
Causa principal de infartos, insuficiencia cardiaca y ataques cerebrales (ictus).

ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA
Daña filtros renales, puede llevar a diálisis o trasplante.

EL ESTILO DE VIDA COMO BASE DEL TRATAMIENTO

1

Reduzca la sal (Sodio): Consumir <2,300 mg/día (idealmente 1,500 mg). Revise etiquetas.

2

Dieta DASH y Potasio: Priorice frutas, verduras y granos enteros. Sustitutos con potasio pueden ayudar (si no padece de riñones).

3

Movimiento constante: 75–150 minutos/semana de ejercicio aeróbico y de resistencia para fortalecer el sistema cardiovascular.

NotebookLM

Día	Hora	Sistolica	Diastolica	Notas