Fiche test du pipeline

Fiche test du pipeline : tous les composants de la charte, nombres lus dans un fichier CSV

1 Formules de base

Dose prescrite sur dose disponible

$$V = \frac{D}{H} \times Q$$

D dose prescrite, H dose disponible, Q volume qui contient H.

Débit en gouttes par minute

$$\text{débit} = \frac{V \times \text{DF}}{T \times M}$$

V volume (mL), DF facteur de goutte (gouttes/mL), T durée (h), M minutes par heure.

Débit horaire

$$\text{mL/h} = \frac{V}{T}$$

1.1 Exemples corrigés

EXEMPLE Suspension buvable

Prescription 250 mg; flacon à 500 mg pour 5 mL.

$$V = \frac{250}{500} \times 5 = 2{,}5 \text{ mL}$$

EXEMPLE Perfusion par gravité

1000 mL en 8 h, perfuseur à 15 gouttes/mL.

$$\frac{1000 \times 15}{8 \times 60} = 31{,}25 \text{ gouttes/min}$$

EXEMPLE Dose au poids

Prescription 15 mg/kg; poids 12 kg.

$$15 \times 12 = 180 \text{ mg}$$

PIÈGE

Convertir **avant** de diviser : mg et µg diffèrent d'un facteur 1000.

PIÈGE Arrondi

N'arrondir que le résultat final, jamais les étapes intermédiaires.

2 Valeurs de référence

Cas	Formule	Résultat
EX01	`D / H * Q`	2,5 mL
EX02	`V * DF / (T * M)`	31,25 gouttes/min
EX03	`V / T`	125 mL/h
EX04	`P * W`	180 mg
EX05	`C * K`	500 µg
EX06	`C / K`	12,5 mg

2.1 Format des nombres

- Milliers : 12 500 µg = 12,5 mg
- Décimales : 0,5 mg = 500 µg
  - Élément de second niveau, arrondi avec `decimales: 1` : 125,0 mL/h

NOTE CLINIQUE

Double contrôle indépendant pour les médicaments à haut risque (insuline, héparine, potassium).

Méthode en 3 étapes

1. Poser la formule avec les unités.
2. Convertir dans la même unité.
3. Vérifier l'ordre de grandeur.

2.1.1 Intertitre de niveau 3

Texte courant en Fira Sans. Un lien externe est souligné; le **gras** est semi-gras.

3 Bloc en trois colonnes

EXEMPLE Débit de pompe

$$\frac{500 \text{ mL}}{4 \text{ h}} = 125 \text{ mL/h}$$

EXEMPLE mg en µg

$$0{,}5 \text{ mg} \times 1000 = 500 \text{ µg}$$

EXEMPLE µg en mg

$$\frac{12\,500 \text{ µg}}{1000} = 12{,}5 \text{ mg}$$