


INTRODUCTION

La courbe ci-dessous représente une fonction $f : x \mapsto f(x)$.



Considérons la fonction f représentée ci-dessus et posons-nous les questions suivantes :

- Que devient $f(x)$ lorsque la variable x s'éloigne vers $+\infty$?
- Que devient $f(x)$ lorsque la variable x se rapproche de 0 ?

C'est en essayant de répondre à ce type de question que la notion de limite a été définie.

Ainsi, si on observe la courbe de f , on voit que lorsque x s'éloigne vers $+\infty$, $f(x)$ se rapproche de 0 ;

on dit que la limite lorsque x tend vers $+\infty$ de f est égale à 0.

De même, si on observe la courbe, on voit que lorsque x se rapproche de 0 tout en restant à droite de 0, $f(x)$ tend vers $+\infty$;

on dit que la limite à droite de 0 de f est égale à $+\infty$.


I. Notion de limite

1. Approche intuitive de la notion de limite


On considère les fonctions f et g , représentées ci-dessous, définies par : $f(x) = x^2$ et $g(x) = \frac{1}{x}$.
Observons leurs comportements lorsque x tend vers $+\infty$.

x	10	10^2	10^3	10^5
$f(x)$	10^2	10^4	10^6	10^{10}

x	10	10^2	10^3	10^5
$g(x)$	0.1	0.01	0.001	0.00001



Représentation graphique de f .



Représentation graphique de g .

Interprétation :

- On constate que lorsque x prend des valeurs positives de plus en plus grandes, $f(x)$ prend des valeurs positives de plus en plus grandes.
On dit alors que la limite lorsque x tend vers $+\infty$ de $f(x)$ est égale à $+\infty$.
On note :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

- On constate que lorsque x prend des valeurs positives de plus en plus grandes, $g(x)$ prend des valeurs positives de plus en plus proche de 0.
On dit alors que la limite lorsque x tend vers $+\infty$ de $g(x)$ est égale à 0.
On note :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$$

Théorème de l'unicité de la limite

Soit f une fonction.

Si f admet une limite en un point x_0 , en $+\infty$ ou en $-\infty$, alors cette limite est unique.

2. Limites à l'infini des fonctions usuelles

Propriété

Soient $a \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$, on a :

$$1) \lim_{x \rightarrow +\infty} a = a$$

$$4) \lim_{x \rightarrow -\infty} a = a$$

$$2) \lim_{x \rightarrow +\infty} x^n = +\infty$$

$$5) \lim_{x \rightarrow -\infty} x^n = \begin{cases} +\infty & \text{si } n \text{ est pair} \\ -\infty & \text{si } n \text{ est impair} \end{cases}$$

$$3) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^n} = 0$$

$$6) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^n} = 0$$

Exemple

$$1) \lim_{x \rightarrow +\infty} 2 = 2$$

$$4) \lim_{x \rightarrow -\infty} 3 = 3$$

$$7) \lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 = -\infty$$

$$2) \lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$$

$$5) \lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 = +\infty$$

$$8) \lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 = +\infty$$

$$3) \lim_{x \rightarrow -\infty} x = -\infty$$

$$6) \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty$$

$$9) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} = 0$$

3. Limites à l'infini de : $x \mapsto ax^n$ avec $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ et $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$

Pour calculer la limite à l'infini d'une fonction du type : $x \mapsto ax^n$, on fait le produit du réel a et du résultat de la limite à l'infini de x^n .

Puis on applique les résultats ci-dessous :

- Si $a > 0$, alors on a : $\ll a(+\infty) \gg = +\infty$ et $\ll a(-\infty) \gg = -\infty$.
- Si $a < 0$, alors on a : $\ll a(+\infty) \gg = -\infty$ et $\ll a(-\infty) \gg = +\infty$.

Exemple

Calculons les limites suivantes :

$$1) \lim_{x \rightarrow +\infty} -3x \qquad 2) \lim_{x \rightarrow -\infty} -2x^2 \qquad 3) \lim_{x \rightarrow -\infty} -3x^3 \qquad 4) \lim_{x \rightarrow -\infty} 4x^5$$

Solution

$$1) \lim_{x \rightarrow +\infty} -3x = -\infty \qquad 2) \lim_{x \rightarrow -\infty} -2x^2 = -\infty \qquad 3) \lim_{x \rightarrow -\infty} -3x^3 = +\infty \qquad 4) \lim_{x \rightarrow -\infty} 4x^5 = -\infty$$

Exercice

Calculer les limites suivantes :

$$\begin{array}{lll} 1) \lim_{x \rightarrow +\infty} 2x^3 = +\infty & 4) \lim_{x \rightarrow -\infty} -3x^2 = -\infty & 7) \lim_{x \rightarrow -\infty} -8x^3 = +\infty \\ 2) \lim_{x \rightarrow +\infty} -5x^4 = -\infty & 5) \lim_{x \rightarrow -\infty} -x^4 = -\infty & 8) \lim_{x \rightarrow +\infty} -x^3 = -\infty \\ 3) \lim_{x \rightarrow -\infty} 5x^2 = +\infty & 6) \lim_{x \rightarrow +\infty} -2x^5 = -\infty & 9) \lim_{x \rightarrow +\infty} -4x^3 = -\infty \end{array}$$

4. Limite en un point

Pour calculer la limite en un point x_0 d'une fonction f , on remplace x_0 par x sur l'expression de f .

Exemple

Calculons les limites suivantes :

1 .

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2} x^2 - 3x &= (2)^2 - 3(2) \\ &= 4 - 6 \\ &= -2 \end{aligned}$$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow 2} x^2 - 3x = -2}$$

2 .

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x+2}{x-1} &= \frac{0+2}{0-1} = \frac{2}{-1} = -2 \\ &= -2 \end{aligned}$$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x+2}{x-1} = -2}$$

Exercice

Calculer les limites suivantes :

1) $\lim_{x \rightarrow 0} -3x^2 + 3x - 1$

2) $\lim_{x \rightarrow -2} |x + 1|$

3) $\lim_{x \rightarrow 1} \sqrt{x - 1}$

4) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x - 2}{x - 1}$

5. Limite à gauche et à droite en un point x_0

a. Définition

Soit f une fonction et $x_0 \in \mathbb{R}$.

- On appelle limite à gauche en x_0 de f , la limite de f lorsque x tend vers x_0 , en restant à gauche de x_0 . On la note :

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \quad \text{ou} \quad \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x < x_0}} f(x)$$

- On appelle limite à droite en x_0 de f , la limite de f lorsque x tend vers x_0 , en restant à droite de x_0 . On la note :

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) \quad \text{ou} \quad \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x > x_0}} f(x)$$

Exemple

Soit f la fonction définie par : $f(x) = \begin{cases} 2x - 1 & \text{si } x > 1 \\ x^2 + x + 1 & \text{si } x \leq 1 \end{cases}$

Calculons les limites en 1^- et en 1^+ de f .

On a :

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 1^-} x^2 + x + 1 \\ &= (1)^2 + (1) + 1 \\ &= 3 \end{aligned}$$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 3}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 1^+} 2x - 1 \\ &= 2(1) - 1 \\ &= 1 \end{aligned}$$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 1}$$

b. Propriété

Pour tout réel a , on a :

$$\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{1}{x - a} = +\infty \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow a^-} \frac{1}{x - a} = -\infty$$

x	$-\infty$	a	$+\infty$
$x - a$	$-$	0	$+$

Explication : Le tableau de signes de l'expression $x - a$ permet de déterminer si le dénominateur tend vers 0 par valeurs positives (0^+) ou par valeurs négatives (0^-) :

- **Limite à droite** ($x \rightarrow a^+$) : Lorsque $x > a$ (à droite de a), le tableau indique que $x - a$ est **positif** (+). Le dénominateur tend donc vers 0 par valeurs supérieures, soit 0^+ .

Par règle des signes : $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{1}{x - a} = \frac{1}{0^+} = +\infty$

- **Limite à gauche** ($x \rightarrow a^-$) : Lorsque $x < a$ (à gauche de a), le tableau indique que $x - a$ est **négatif** (-). Le dénominateur tend donc vers 0 par valeurs inférieures, soit 0^- .

Par règle des signes : $\lim_{x \rightarrow a^-} \frac{1}{x - a} = \frac{1}{0^-} = -\infty$

Exemple

1. Limites de $\frac{1}{x}$ en 0 :

x	$-\infty$	0	$+\infty$
x	-	0	+

- **À droite** ($x \rightarrow 0^+$) : d'après le tableau, pour $x > 0$, le dénominateur est positif (+). Donc $x \rightarrow 0^+$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = \frac{1}{0^+} = +\infty$$

- **À gauche** ($x \rightarrow 0^-$) : d'après le tableau, pour $x < 0$, le dénominateur est négatif (-). Donc $x \rightarrow 0^-$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = \frac{1}{0^-} = -\infty$$

2. Limites de $\frac{1}{x - 2}$ en 2 :

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$x - 2$	-	0	+

- **À droite** ($x \rightarrow 2^+$) : d'après le tableau, pour $x > 2$, l'expression $x - 2$ est positive (+). Le dénominateur tend vers 0^+ .

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{1}{x - 2} = \frac{1}{0^+} = +\infty$$

- **À gauche** ($x \rightarrow 2^-$) : d'après le tableau, pour $x < 2$, l'expression $x - 2$ est négative (-). Le dénominateur tend vers 0^- .

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{1}{x - 2} = \frac{1}{0^-} = -\infty$$

6. Existence de limite d'une fonction en un point x_0

b. Propriété

Soit f une fonction et $x_0 \in \mathbb{R}$. La fonction f admet une limite l en x_0 si et seulement si on a :

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = l$$

Méthode :

Pour déterminer si une fonction f admet ou non une limite en un point x_0 , on calcule la limite à gauche en x_0 et la limite à droite en x_0 de f , puis on compare les résultats.

- Si $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$, alors f admet une limite l en x_0 vérifiant :

$$l = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x).$$

- Si $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$, alors f n'admet pas de limite en x_0 .

Exemple

1. Soit f la fonction définie par :
$$\begin{cases} f(x) = x - 1 & \text{si } x > 0 \\ f(x) = x^2 + 1 & \text{si } x \leq 0 \end{cases}.$$

La fonction f admet-elle une limite en 0 ?

On a :

- $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} x^2 + 1 = (0)^2 + 1 = 1$
- $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x - 1 = (0) - 1 = -1$

Ainsi, $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$, donc f n'admet pas de limite en 0.

2. Soit g la fonction définie par :
$$\begin{cases} g(x) = x - 1 & \text{si } x > 1 \\ g(x) = x^2 + x - 2 & \text{si } x \leq 1 \end{cases}.$$

La fonction g admet-elle une limite en 1 ?

On a :

- $\lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} x^2 + x - 2 = (1)^2 + (1) - 2 = 0$
- $\lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} x - 1 = (1) - 1 = 0$

Ainsi, $\lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = 0$, d'où g admet une limite en 1 et on a :

$$\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = 0.$$

Exercice

Pour chacune des fonctions suivantes, déterminer si elle admet ou non une limite en x_0 .

1)
$$\begin{cases} f(x) = \sqrt{x-1} & \text{si } x > 1 \\ f(x) = \frac{x-1}{x+3} & \text{si } x \leq 1 \end{cases} ; \quad x_0 = 1$$

3)
$$\begin{cases} h(x) = x - 1 & \text{si } x > 0 \\ h(x) = x^2 + x - 2 & \text{si } x \leq 0 \end{cases} ; \quad x_0 = 0$$

2)
$$\begin{cases} g(x) = |x-3| & \text{si } x > 2 \\ g(x) = 2x-3 & \text{si } x \leq 2 \end{cases} ; \quad x_0 = 2$$

4)
$$\begin{cases} i(x) = \sqrt{x^2+1} & \text{si } x > 1 \\ i(x) = \frac{2x-1}{x+3} & \text{si } x \leq 1 \end{cases} ; \quad x_0 = 0$$

II. Limites et opérations sur les fonctions

- Les propriétés suivantes, représentées sous forme de tableaux donnent les limites en un point x_0 . Toutefois les résultats restent vrais en $+\infty$, $-\infty$, et en x_0 par valeurs supérieures ou inférieures.
- La notation $F.I$ (Forme indéterminée) veut dire qu'on ne peut conclure directement ; il faudra dans ces cas procéder à d'autre méthodes pour lever l'indétermination.

1. Limite d'une somme de deux fonctions

a. Propriété

Soit $x_0 \in \mathbb{R}$, f et g deux fonctions dont chacune admet une limite en x_0 . Le tableau suivant donne les limites en x_0 de la fonction $f + g$

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$	l	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$+\infty$
$\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$	l'	l'	l'	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$
$\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) + g(x))$	$l + l'$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$F.I$

Exemple

- Soit f la fonction définie par : $f(x) = 2x + \frac{1}{x}$.
Calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(2x + \frac{1}{x} \right) : \begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} 2x = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0 \end{cases} \quad \text{Par somme}$$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty}$$

- Soit g la fonction définie par : $g(x) = -3x + \frac{1}{x-1}$.
Calculons $\lim_{x \rightarrow 1^+} g(x)$.

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \left(-3x + \frac{1}{x-1} \right) : \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 1^+} -3x = -3 \\ \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{x-1} = +\infty \end{cases} \quad \text{Par somme}$$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) = +\infty}$$

- Soit h la fonction définie par : $h(x) = x^3 + x^2$.
Calculons $\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x)$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^3 + x^2) : \begin{cases} \lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 = +\infty \end{cases} \quad \text{Par somme (F.I)}$$

C'est une Forme Indéterminée (F.I) ; on ne peut pas conclure directement.

Exercice

Calculer les limites suivantes :

① Calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(-3x^2 + \frac{1}{x} \right) :$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(-3x^2 + \frac{1}{x} \right) : \begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} -3x^2 = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0 \end{cases} \quad \text{Par somme}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(-3x^2 + \frac{1}{x} \right) = -\infty$$

② Calculons $\lim_{x \rightarrow 1^-} \left(2x + \frac{1}{x-1} \right) :$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \left(2x + \frac{1}{x-1} \right) : \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 1^-} 2x = 2 \\ \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{x-1} = -\infty \end{cases} \quad \text{Par somme}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \left(2x + \frac{1}{x-1} \right) = -\infty$$

③ Calculons $\lim_{x \rightarrow -\infty} (2x^2 - x) :$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (2x^2 - x) : \begin{cases} \lim_{x \rightarrow -\infty} 2x^2 = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} -x = +\infty \end{cases} \quad \text{Par somme}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (2x^2 - x) = +\infty$$

④ Calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 + 3x - 1) :$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 + 3x - 1) : \begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} (3x - 1) = +\infty \end{cases} \quad \text{Par somme}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 + 3x - 1) = +\infty$$

2. Limite du produit de deux fonctions

a. Propriété

Soit $x_0 \in \mathbb{R}$, f et g deux fonctions dont chacune admet une limite en x_0 . Le tableau suivant donne les limites en x_0 de la fonction fg

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$	l	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$+\infty$	∞
$\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$	l'	$l' \neq 0$	$l' \neq 0$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	0
$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x)$	ll'	$+\infty$ si $l' > 0$ $-\infty$ si $l' < 0$	$-\infty$ si $l' > 0$ $+\infty$ si $l' < 0$	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$F.I$

Exemple

- Soit f la fonction définie par : $f(x) = -2x^2$.
Calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (-2x^2) : \begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} -2 = -2 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty \end{cases} \quad \text{Par produit}$$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$

- Soit g la fonction définie par : $g(x) = x \left(-3 + \frac{1}{x} \right)$.
Calculons $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x \left(-3 + \frac{1}{x} \right) : \begin{cases} \lim_{x \rightarrow -\infty} x = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(-3 + \frac{1}{x} \right) = -3 \end{cases} \quad \text{Par produit}$$

$\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = +\infty$

- Soit h la fonction définie par : $h(x) = (x-1) \left(1 + \frac{1}{x-1} \right)$.
Calculons $\lim_{x \rightarrow 1^-} h(x)$.

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} (x-1) \left(1 + \frac{1}{x-1} \right) : \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 1^-} (x-1) = 0 \\ \lim_{x \rightarrow 1^-} \left(1 + \frac{1}{x-1} \right) = -\infty \end{cases} \quad \text{Par produit (F.I)}$$

C'est une Forme Indéterminée (F.I) ; on ne peut pas conclure directement.

Exercice

Calculer les limites suivantes :

1 Calculons $\lim_{x \rightarrow 1} (x+1)(x-3)$:

$$\lim_{x \rightarrow 1} (x+1)(x-3) : \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 1} (x+1) = 2 \\ \lim_{x \rightarrow 1} (x-3) = -2 \end{cases} \quad \text{Par produit}$$
$$\boxed{\lim_{x \rightarrow 1} (x+1)(x-3) = -4}$$

2 Calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2(1-x)$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2(1-x) : \begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} (1-x) = -\infty \end{cases} \quad \text{Par produit}$$
$$\boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2(1-x) = -\infty}$$

3 Calculons $\lim_{x \rightarrow 1^+} \left(\frac{1}{x-1} \right) (1-x^2)$:

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \left(\frac{1}{x-1} \right) (1-x^2) : \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{x-1} = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow 1^+} (1-x^2) = 0 \end{cases} \quad \text{Par produit (F.I)}$$

C'est une Forme Indéterminée (F.I) ; on ne peut pas conclure directement.

4 Calculons $\lim_{x \rightarrow 2} -3x^2 \left(\frac{1}{x} - 1 \right)$:

$$\lim_{x \rightarrow 2} -3x^2 \left(\frac{1}{x} - 1 \right) : \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 2} -3x^2 = -12 \\ \lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{1}{x} - 1 \right) = -\frac{1}{2} \end{cases} \quad \text{Par produit}$$
$$\boxed{\lim_{x \rightarrow 2} -3x^2 \left(\frac{1}{x} - 1 \right) = 6}$$

3. Limite du quotient de deux fonctions

a. Propriété

Soit $x_0 \in \mathbb{R}$, f et g deux fonctions dont chacune admet une limite en x_0 . Le tableau suivant donne les limites en x_0 de la fonction $\frac{f}{g}$

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$	l	l	$l > 0$	$l < 0$	0	$\pm\infty$
$\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$	$l' \neq 0$	$\pm\infty$	0	0	0	$\pm\infty$
$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$	$\frac{l}{l'}$	0	$+\infty$ si $g > 0$ $-\infty$ si $g < 0$	$-\infty$ si $g > 0$ $+\infty$ si $g < 0$	$F.I$	$F.I$

Exemple

- 1 Soit l la fonction définie par :

$$l(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2 - x + 2}.$$

Calculons $\lim_{x \rightarrow 1} l(x)$.

On a :

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x^2 - x + 2} = \left\langle \frac{0}{0} \right\rangle$$

est une forme indéterminée ; on ne peut conclure directement.

- 2 Soit f la fonction définie par :

$$f(x) = \frac{x + 3}{x - 1}.$$

Calculons $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$.

On a :

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x + 3}{x - 1} = \left\langle \frac{4}{0} \right\rangle.$$

Étudions le signe de $x - 1$.

$$x - 1 = 0 \implies x = 1$$

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$x - 1$	$-$	0	$+$

$x - 1$ est positif à droite de 1. Donc

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \left\langle \frac{4}{0^+} \right\rangle = +\infty.$$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty}$$

- 3 Soit g la fonction définie par :

$$g(x) = \frac{x-5}{x^2-3x+2}.$$

Calculons $\lim_{x \rightarrow 2^-} g(x)$.

On a :

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x-5}{x^2-3x+2} = \left\langle \frac{-3}{0} \right\rangle.$$

Étudions le signe de $x^2 - 3x + 2$.

$$x^2 - 3x + 2 = 0 \implies x = 1 \text{ ou } x = 2$$

x	$-\infty$	1	2	$+\infty$
$x^2 - 3x + 2$		+	-	+

$x^2 - 3x + 2$ est négatif à gauche de 2. Donc,

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} g(x) = \left\langle \frac{-3}{0^-} \right\rangle = +\infty.$$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow 2^-} g(x) = +\infty}$$

- 4 Soit h la fonction définie par :

$$h(x) = \frac{5}{x-1}.$$

Calculons $\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x)$.

On a :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{5}{x-1} = \left\langle \frac{5}{-\infty} \right\rangle = 0.$$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = 0}$$

Exercice

Calculer les limites suivantes :

- 1 Calculons $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x^2 + 2x - 3}$:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x^2 + 2x - 3} : \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 1} (x^2 - 1) = 0 \\ \lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + 2x - 3) = 0 \end{cases} \quad \text{Par quotient (F.I)}$$

C'est une *Forme Indéterminée (F.I)* ; on ne peut pas conclure directement.

2 Calculons $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x-3}{x-1}$:

Étudions le signe de $x-1$.

$$x-1=0 \implies x=1$$

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$x-1$	$-$	0	$+$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x-3}{x-1} : \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 1^+} (x-3) = -2 \\ \lim_{x \rightarrow 1^+} (x-1) = 0^+ \end{cases} \quad \text{Par quotient}$$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x-3}{x-1} = -\infty}$$

3 Calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x+1}{x-1}$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x+1}{x-1} : \begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} (x+1) = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} (x-1) = +\infty \end{cases} \quad \text{Par quotient (F.I.)}$$

C'est une Forme Indéterminée (F.I) ; on ne peut pas conclure directement.

4 Calculons $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2+1}{x-3}$:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2+1}{x-3} : \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 1} (x^2+1) = 2 \\ \lim_{x \rightarrow 1} (x-3) = -2 \end{cases} \quad \text{Par quotient}$$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2+1}{x-3} = -1}$$

4. Limites de $\sqrt{u}$ et $|u|$

a. Propriété

Soit u une fonction positive et x_0 un réel.

- Si $\lim_{x \rightarrow x_0} u = l$, alors $\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt{u} = \sqrt{l}$
- Si $\lim_{x \rightarrow x_0} u = +\infty$, alors $\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt{u} = +\infty$

Exemple

- ① Soit g la fonction définie par : $g(x) = \sqrt{x+3}$. Calculons $\lim_{x \rightarrow 1} g(x)$.

On a : $\lim_{x \rightarrow 1} x + 3 = 4$ donc $\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = \sqrt{4} = 2$.

$$\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = 2$$

0 Calculs de limites de certaines fonctions

- ② Soit f la fonction définie par : $f(x) = \sqrt{x+1}$. Calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

On a : $\lim_{x \rightarrow +\infty} x + 1 = +\infty$ donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

b. Propriété

Calculer les limites suivantes :

- ① Calculons $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{x^2 + 1}$:

On a : $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^2 + 1) = +\infty$ donc $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{x^2 + 1} = +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{x^2 + 1} = +\infty$$

- ② Calculons $\lim_{x \rightarrow 1} \sqrt{x-1}$:

On a : $\lim_{x \rightarrow 1} (x-1) = 0$ donc $\lim_{x \rightarrow 1} \sqrt{x-1} = 0$.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \sqrt{x-1} = 0$$

- ③ Calculons $\lim_{x \rightarrow 2} |x-3|$:

On a : $\lim_{x \rightarrow 2} (x-3) = -1$ donc $\lim_{x \rightarrow 2} |x-3| = |-1| = 1$.

$$\lim_{x \rightarrow 2} |x-3| = 1$$

- ④ Calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} |1-x|$:

On a : $\lim_{x \rightarrow +\infty} (1-x) = -\infty$ donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} |1-x| = +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} |1-x| = +\infty$$

III. Calculs de limites de certaines fonctions

1. Limites à l'infini des fonctions polynômes

Propriété

La limite à l'infini d'une fonction polynôme est égale à la limite de son monôme du plus haut degré.

En effet, on a $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0$, avec $a_n, a_{n-1}, \dots, a_0$ des réels tels que $a_n \neq 0$.

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0) \\&= \lim_{x \rightarrow \pm\infty} a_n x^n \left(1 + \frac{a_{n-1}}{a_n x} + \dots + \frac{a_0}{a_n x^n} \right) \\&= \lim_{x \rightarrow \pm\infty} a_n x^n \times \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(1 + \frac{a_{n-1}}{a_n x} + \dots + \frac{a_0}{a_n x^n} \right) \\&= \lim_{x \rightarrow \pm\infty} a_n x^n \quad \text{car} \quad \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(1 + \frac{a_{n-1}}{a_n x} + \dots + \frac{a_0}{a_n x^n} \right) = 1\end{aligned}$$

$$\text{Donc } \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} a_n x^n.$$

Méthode :

Pour calculer la limite à l'infini d'une fonction polynôme, il suffit de calculer la limite de son monôme du plus haut degré.

Exemple

Calculons les limites suivantes

$$\begin{aligned}1 \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} (-2x^3 + 4x^2 + 6x - 1) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} -2x^3 \\&= -2(-\infty) \\&= +\infty\end{aligned}$$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow -\infty} (-2x^3 + 4x^2 + 6x - 1) = +\infty}$$

$$\begin{aligned}2 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (4x^4 + x^3 + x - 1) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} 4x^4 \\&= 4(+\infty) \\&= +\infty\end{aligned}$$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} (4x^4 + x^3 + x - 1) = +\infty}$$

Exercice

Calculer les limites suivantes :

$$\begin{aligned}1 \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} (3x^3 + 2x^2 - 1) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} 3x^3 \\&= 3(-\infty) \\&= -\infty\end{aligned}$$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow -\infty} (3x^3 + 2x^2 - 1) = -\infty}$$

$$\begin{aligned} 2 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (-2x^2 + x - 4) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} -2x^2 \\ &= -2(+\infty) \\ &= -\infty \end{aligned}$$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} (-2x^2 + x - 4) = -\infty}$$

$$\begin{aligned} 3 \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} (-x^3 + x + 2) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} -x^3 \\ &= -(-\infty) \\ &= +\infty \end{aligned}$$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow -\infty} (-x^3 + x + 2) = +\infty}$$

$$\begin{aligned} 4 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (5x^3 + 3x - 4) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} 5x^3 \\ &= 5(+\infty) \\ &= +\infty \end{aligned}$$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} (5x^3 + 3x - 4) = +\infty}$$

2. Limites à l'infini des fonctions rationnelles

Propriété

La limite à l'infini d'une fonction rationnelle est égale à la limite du quotient des monômes du plus haut degré du numérateur et du dénominateur.

En effet :

Soit f une fonction rationnelle définie par : $f(x) = \frac{a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0}{b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \dots + b_0}$ avec $a_n \neq 0$ et $b_m \neq 0$.

On a :

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0}{b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \dots + b_0} \\ &= \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{a_n x^n \left(1 + \frac{a_{n-1}}{a_n x} + \dots + \frac{a_0}{a_n x^n} \right)}{b_m x^m \left(1 + \frac{b_{m-1}}{b_m x} + \dots + \frac{b_0}{b_m x^m} \right)} \\ &= \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{a_n x^n}{b_m x^m} \left(\frac{1 + \frac{a_{n-1}}{a_n x} + \dots + \frac{a_0}{a_n x^n}}{1 + \frac{b_{m-1}}{b_m x} + \dots + \frac{b_0}{b_m x^m}} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{a_n x^n}{b_m x^m} \times \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(\frac{1 + \frac{a_{n-1}}{a_n x} + \dots + \frac{a_0}{a_n x^n}}{1 + \frac{b_{m-1}}{b_m x} + \dots + \frac{b_0}{b_m x^m}} \right) \end{aligned}$$

$$\text{Or } \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(\frac{1 + \frac{a_{n-1}}{a_n x} + \dots + \frac{a_0}{a_n x^n}}{1 + \frac{b_{m-1}}{b_m x} + \dots + \frac{b_0}{b_m x^m}} \right) = 1 \text{ donc } \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{a_n x^n}{b_m x^m}.$$

Méthode :

Pour calculer la limite à l'infini d'une fonction rationnelle, il suffit de calculer la limite du quotient des monômes du plus haut degré du numérateur et du dénominateur.

Exemple :

Calculons les limites suivantes

$$\begin{aligned} 1 \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-2x^3 + x - 1}{x^2 - x + 2} &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-2x^3}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} -2x \\ &= -2(-\infty) \\ &= +\infty \end{aligned}$$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-2x^3 + x - 1}{x^2 - x + 2} = +\infty}$$

$$\begin{aligned} 2 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 + 4x^2 + 6x - 1}{2x^5 - 6x + 2} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{2x^5} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{2x^2} \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 + 4x^2 + 6x - 1}{2x^5 - 6x + 2} = 0}$$

$$\begin{aligned} 3 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x^2 - 2x - 3}{2x^2 - x - 5} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x^2}{2x^2} \\ &= 2 \end{aligned}$$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x^2 - 2x - 3}{2x^2 - x - 5} = 2}$$

Exercice :

Calculer les limites suivantes :

$$\begin{aligned} 1 \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^2 + x + 1}{x - 1} &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^2}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} 2x \\ &= 2(-\infty) \\ &= -\infty \end{aligned}$$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^2 + x + 1}{x - 1} = -\infty}$$

$$\begin{aligned} 2 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x+1}{x^2+x-1} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x+1}{x^2+x-1} = 0}$$

$$\begin{aligned} 3 \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x+1}{x-1} &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{x} \\ &= 1 \end{aligned}$$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x+1}{x-1} = 1}$$

$$\begin{aligned} 4 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2+x+1}{-4x^2-1} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2}{-4x^2} \\ &= -\frac{2}{4} \\ &= -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2+x+1}{-4x^2-1} = -\frac{1}{2}}$$

3. Limite en x_0 de $\frac{u(x)}{v(x)}$ avec $u(x_0) = v(x_0) = 0$

Méthode :

Pour calculer la limite en un point x_0 d'une fonction du type : $f = \frac{u}{v}$ où $u(x_0) = v(x_0) = 0$, on cherche, d'abord, à mettre en facteur $(x - x_0)$ au numérateur et dénominateur, puis on simplifie $f(x)$. Ensuite, on recalcule la limite de f avec son expression simplifiée.

Exemple :

1 Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{x^2+6x-7}{x^2+2x-3}$. Calculons $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$.

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) : \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + 6x - 7) = 0 \\ \lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + 2x - 3) = 0 \end{cases} \quad \text{donc le quotient est une forme indéterminée.}$$

Levons l'indétermination :

Factorisons $x^2 + 6x - 7$ et $x^2 + 2x - 3$

On a : $x^2 + 6x - 7 = (x - 1)(x + 7)$ et $x^2 + 2x - 3 = (x - 1)(x + 3)$

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow 1} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 6x - 7}{x^2 + 2x - 3} \\
&= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x+7)}{(x-1)(x+3)} \\
&= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+7}{x+3} \\
&= \frac{1+7}{1+3} \\
&= 2
\end{aligned}$$

Donc, $\boxed{\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2}$

- ② Soit g la fonction définie par $g(x) = \frac{\sqrt{x+3}-2}{x-1}$. Calculons $\lim_{x \rightarrow 1} g(x)$.

$$\lim_{x \rightarrow 1} g(x) : \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 1} (\sqrt{x+3}-2) = 0 \\ \lim_{x \rightarrow 1} (x-1) = 0 \end{cases} \quad \text{donc le quotient est une forme indéterminée.}$$

Levons l'indétermination :

Utilisons l'expression conjuguée du numérateur :

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow 1} g(x) &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+3}-2}{x-1} \\
&= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(\sqrt{x+3}-2)(\sqrt{x+3}+2)}{(x-1)(\sqrt{x+3}+2)} \\
&= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(\sqrt{x+3})^2 - 2^2}{(x-1)(\sqrt{x+3}+2)} \\
&= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+3-4}{(x-1)(\sqrt{x+3}+2)} \\
&= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{(x-1)(\sqrt{x+3}+2)} \\
&= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{\sqrt{x+3}+2} \\
&= \frac{1}{\sqrt{1+3}+2} \\
&= \frac{1}{4}
\end{aligned}$$

Donc, $\boxed{\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = \frac{1}{4}}$

- ③ Soit h la fonction définie par $h(x) = \frac{x-2}{\sqrt{x}-2}$. Calculons $\lim_{x \rightarrow 2^+} h(x)$.

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} h(x) : \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 2^+} (x-2) = 0 \\ \lim_{x \rightarrow 2^+} \sqrt{x}-2 = 0 \end{cases} \quad \text{donc le quotient est une forme indéterminée.}$$

Levons l'indétermination :

Rendons rationnel le dénominateur :

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 2^+} h(x) &= \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x-2}{\sqrt{x-2}} \\&= \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{(x-2)\sqrt{x-2}}{(\sqrt{x-2})^2} \\&= \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{(x-2)\sqrt{x-2}}{x-2} \\&= \lim_{x \rightarrow 2^+} \sqrt{x-2} \\&= 0\end{aligned}$$

Donc, $\boxed{\lim_{x \rightarrow 2^+} h(x) = 0}$