

CHAPITRE 6 : FONCTION LOGARITHME NÉPÉRIEN

Prof : M. BA

Classe : Terminale L

Durée : 6 heures

Année scolaire : 2025 – 2026

I. Généralités

Activité 1 Avec la calculatrice remplir le tableau suivant :

a	-2	-1	0	0,25	0,5	0,75	1	2	5
$\ln a$									

1. Définition et notation

Définition

On appelle **fonction logarithme népérien**, notée $\ln$, la primitive sur $]0; +\infty[$ de la fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$ qui s'annule en 1.

$$\ln(1) = 0 \quad \text{et pour tout } x \in]0; +\infty[, \quad (\ln x)' = \frac{1}{x}$$

2. Remarques

Remarque 1

- La fonction $\ln x$ n'est définie que pour des nombres ****strictement positifs**** ($x > 0$).
- Pour tout $x > 0$, $(\ln x)' = \frac{1}{x} > 0$, la fonction $\ln$ est donc ****strictement croissante**** sur $]0; +\infty[$.
- Il existe un unique nombre réel noté e (base du logarithme) tel que :

$$\ln(e) = 1 \quad \text{avec } e \approx 2,718$$

Remarque 2

- Si $a \in]-\infty; 0]$ alors $\ln a$ n'existe pas.
- Si $a \in]0; 1[$ alors $\ln a < 0$
- Si $a \in]1; +\infty[$ alors $\ln a > 0$

3. Propriétés algébriques

Propriété fondamentale (Produit)

Pour tous réels $a > 0$ et $b > 0$:

$$\ln(a \times b) = \ln(a) + \ln(b)$$

Conséquences des propriétés : Pour tous réels $a > 0$ et $b > 0$, et pour tout $n \in \mathbb{Z}$:

- a) **Inverse** : $\ln\left(\frac{1}{a}\right) = -\ln(a)$
- b) **Quotient** : $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln(a) - \ln(b)$
- c) **Puissance** : $\ln(a^n) = n \ln(a)$
- d) **Racine carrée** : $\ln(\sqrt{a}) = \frac{1}{2} \ln(a)$

Exemple :

Simplifier

$$A = \ln(6) - \ln(2) + \ln(e^3) :$$

Solution :

$$A = \ln\left(\frac{6}{2}\right) + 3\ln(e) = \ln(3) + 3(1) = \ln(3) + 3$$

Application :

- 1. Écrire $A = \ln\left(\frac{3}{4}\right) - \ln 18 + \ln 9$ en fonction de $\ln 2$ et $\ln 3$.
- 2. Écrire $A = \ln\left(\frac{9}{2}\right) - \ln 16 + \ln \sqrt{3}$ en fonction de $\ln 2$ et $\ln 3$.
- 3. Écrire $A = \ln\left(\frac{1}{8}\right) + \ln 24 - \ln 81$ en fonction de $\ln 2$ et $\ln 3$.

Correction :

1. Écrivons

$$A = \ln\left(\frac{3}{4}\right) - \ln 18 + \ln 9$$

$$= (\ln 3 - \ln 4) - \ln(2 \times 9) + \ln(3^2)$$

$$= \ln 3 - \ln(2^2) - (\ln 2 + \ln 9) + 2 \ln 3$$

$$= \ln 3 - 2 \ln 2 - \ln 2 - \ln(3^2) + 2 \ln 3$$

$$= \ln 3 - 2 \ln 2 - \ln 2 - 2 \ln 3 + 2 \ln 3$$

$$= (-2 - 1) \ln 2 + (1 - 2 + 2) \ln 3$$

$$= -3 \ln 2 + \ln 3$$

2. Écrivons

$$\begin{aligned}
A &= \ln\left(\frac{9}{2}\right) - \ln 16 + \ln \sqrt{3} \\
&= (\ln 9 - \ln 2) - \ln(2^4) + \frac{1}{2} \ln 3 \\
&= \ln(3^2) - \ln 2 - 4 \ln 2 + \frac{1}{2} \ln 3 \\
&= 2 \ln 3 - \ln 2 - 4 \ln 2 + \frac{1}{2} \ln 3 \\
&= (-1 - 4) \ln 2 + \left(2 + \frac{1}{2}\right) \ln 3 \\
&= -5 \ln 2 + \frac{5}{2} \ln 3
\end{aligned}$$

3. Ecrivons

$$\begin{aligned}
A &= \ln\left(\frac{1}{8}\right) + \ln 24 - \ln 81 \\
&= -\ln 8 + \ln(8 \times 3) - \ln(3^4) \\
&= -\ln(2^3) + (\ln(2^3) + \ln 3) - 4 \ln 3 \\
&= -3 \ln 2 + 3 \ln 2 + \ln 3 - 4 \ln 3 \\
&= (-3 + 3) \ln 2 + (1 - 4) \ln 3 \\
&= 0 \ln 2 - 3 \ln 3 \\
&= -3 \ln 3
\end{aligned}$$