

I. Dérivabilité en un point

1. Taux d'accroissement

Définition : Taux d'accroissement

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et $x_0 \in I$.

Pour tout $x \in I$ tel que $x \neq x_0$, le **taux d'accroissement** (ou taux de variation) de f entre x_0 et x est défini par :

$$\tau(x) = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \quad \text{ou en posant } x = x_0 + h \ (h \neq 0) : \quad \tau(h) = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

Interprétation géométrique : Le taux d'accroissement représente le **coefficient directeur** de la sécante (AM) passant par $A(x_0; f(x_0))$ et $M(x; f(x))$.

2. Définition de la dérivabilité en un point

Définition : Nombre dérivé

Soit f une fonction définie sur un intervalle I contenant x_0 .

On dit que f est **dérivable en** x_0 s'il existe un nombre réel L tel que :

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = L \quad \text{ou} \quad \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = L$$

Ce réel L est appelé le **nombre dérivé** de f en x_0 et est noté $f'(x_0)$.

Remarque : Si la limite est infinie ($\pm\infty$), la fonction **n'est pas dérivable** en x_0 (la courbe admet une tangente verticale).

3. Dérivabilité à gauche et à droite (Demi-tangentes)

Dans certains cas, la limite du taux d'accroissement dépend du côté où l'on s'approche de x_0 :

— **Dérivabilité à gauche :** $f'_g(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$

— **Dérivabilité à droite :** $f'_d(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$

Théorème : Condition de dérivabilité en x_0

Une fonction f est dérivable en x_0 si et seulement si elle est dérivable à gauche et à droite en x_0 et que ces deux nombres dérivés sont égaux :

$$f'_g(x_0) = f'_d(x_0) = f'(x_0)$$

Si $f'_g(x_0) \neq f'_d(x_0)$, la courbe présente un **point anguleux** en x_0 .

Contre-exemple classique : La fonction valeur absolue en 0

Soit la fonction $f(x) = |x|$ définie sur $\mathbb{R}$. Étudions sa dérivabilité en $x_0 = 0$.

① **À droite** ($x > 0$) : Pour $x > 0$, $f(x) = x$ et $f(0) = 0$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{x} = 1 \implies f'_d(0) = 1$$

② **À gauche** ($x < 0$) : Pour $x < 0$, $f(x) = -x$ et $f(0) = 0$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x}{x} = -1 \implies f'_g(0) = -1$$

Conclusion : Les dérivées à gauche et à droite existent mais sont différentes ($f'_g(0) = -1 \neq 1 = f'_d(0)$). La fonction $f(x) = |x|$ **n'est donc pas dérivable en 0**. Sa courbe possède un point anguleux à l'origine.

Exemples d'étude de la dérivabilité

Exemple 1 : Fonction classique dérivable

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = x^2 + 3x - 1$$

Étudions la dérivabilité de f au point $x_0 = 1$.

Résolution : Calculons le taux d'accroissement de f en 1 pour $h \neq 0$:

$$\tau(h) = \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \frac{((1+h)^2 + 3(1+h) - 1) - (3)}{h} = \frac{1 + 2h + h^2 + 3 + 3h - 1 - 3}{h} = \frac{h^2 + 5h}{h} = h + 5$$

Calculons la limite lorsque $h \rightarrow 0$:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \tau(h) = \lim_{h \rightarrow 0} (h + 5) = 5$$

La limite est réelle et finie, donc f est **dérivable en 1** et son nombre dérivé est $f'(1) = 5$.

Exemple 2 : Fonction définie par morceaux et DÉRIVABLE

Soit la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$g(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x \leq 1 \\ 2x - 1 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

Étudions la dérivabilité de g au point de raccordement $x_0 = 1$.

Résolution : On remarque que $g(1) = 1^2 = 1$. Étudions les limites à gauche et à droite du taux d'accroissement :

— **À gauche** ($x < 1$) :

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{g(x) - g(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{(x-1)(x+1)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} (x+1) = 2 \implies g'_g(1) = 2$$

— **À droite** ($x > 1$) :

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{g(x) - g(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{(2x-1) - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{2x-2}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{2(x-1)}{x-1} = 2 \implies g'_d(1) = 2$$

Puisque $g'_g(1) = g'_d(1) = 2$, la fonction g est **dérivable en 1** et $g'(1) = 2$.

Exemple 3 : Fonction NON DÉRIVABLE (Tangente verticale)

Soit la fonction h définie sur $[0; +\infty[$ par :

$$h(x) = \sqrt{x}$$

Étudions la dérivabilité de h au point $x_0 = 0$.

Résolution : Calculons la limite à droite du taux d'accroissement en 0 pour $x > 0$:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{h(x) - h(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{x} - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{x}}{(\sqrt{x})^2} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sqrt{x}} = +\infty$$

La limite est infinie $(+\infty)$, donc la fonction h **n'est pas dérivable en 0**. La courbe de h admet une demi-tangente verticale au point d'origine.

Exemple 4 : Fonction définie par morceaux et NON DÉRIVABLE (Point anguleux)

Soit la fonction k définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$k(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x < 0 \\ 3x & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

Étudions la dérivabilité de k au point $x_0 = 0$.

Résolution : On a $k(0) = 3(0) = 0$. Étudions les dérivées unilatérales en 0 :

— **À gauche** ($x < 0$) :

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{k(x) - k(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x^2}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} x = 0 \implies k'_g(0) = 0$$

— **À droite** ($x > 0$) :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{k(x) - k(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{3x}{x} = 3 \implies k'_d(0) = 3$$

Les dérivées à gauche et à droite existent mais sont différentes ($k'_g(0) = 0 \neq 3 = k'_d(0)$). La fonction k **n'est donc pas dérivable en 0**. Sa courbe présente un point anguleux en 0.