LE THÉORÈME DE THALÈS


Prof : M. BA **Classe : 3 ème**

Durée : 6 heures **Année scolaire : 2025 – 2026**

I. Le théorème de Thalès direct et sa Conséquence

Activité 1

1. Tracer un triangle **ABCG**.
   - Placer un point **M** sur la droite **(AB)**, n'appartenant pas à la demi-droite **[AB)**.
   - Construire la parallèle à la droite **(BC)** passant par **M** : elle coupe la droite **(AC)** en **N**.
2. Mesurer les segments **AN**, **AM**, **AB**, **AC**, **MN** et **BC**.
3. Comparer les quotients : $\frac{AB}{AM}$, $\frac{AC}{AN}$ et $\frac{BC}{MN}$.
4. Construire une figure semblable avec d'autres dimensions et calculer à nouveau les quotients de la question 3. Que peux-tu conjecturer ?




Remarque : Triangles en position de Thalès

Deux triangles sont dits **en position de Thalès** s'ils sont formés par deux droites sécantes coupées par deux droites **parallèles**.

Autrement dit, il y a une situation de Thalès (et donc égalité des quotients) **si et seulement si le parallélisme est vérifié**.

Trois configurations illustrent ce théorème.



1. Énoncé du théorème

Soit deux droites (BM) et (CN) sécantes en un point A.

Si la droite (MN) est parallèle à la droite (BC), alors on a l'égalité des quotients suivante :

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$$

2. Conséquence du théorème

Soit deux droites (BM) et (CN) sécantes en un point A.
Si la droite (MN) est parallèle à la droite (BC), alors on a l'égalité des quotients suivante :

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$$

Remarque : Théorème de Thalès vs Conséquence

— **Le théorème de Thalès :** On l'utilise lorsque l'on souhaite calculer une longueur située sur les **droites sécantes**.
— **La conséquence du théorème de Thalès :** On l'utilise lorsque la question porte sur le calcul de la longueur de l'un des côtés faisant partie des droites **parallèles**.


Remarque

Le théorème de Thalès permet de calculer une longueur inconnue.
Règle : Pour calculer une longueur :

1. On écrit les conditions (droites sécantes et parallèles).
2. On écrit l'égalité des quotients.
3. On remplace les longueurs connues par leurs valeurs.
4. On calcule la longueur inconnue à l'aide d'un produit en croix.

Exemple 1

Soit un triangle ABC tel que $AM = 2$ cm, $AB = 5$ cm et $AC = 7$ cm.
La droite (MN) est parallèle à (BC). Calculer AN.



Solution 1

— Les droites (AB) et (AC) sont sécantes en A.
— Les droites (MN) et (BC) sont parallèles.

D'après le théorème de Thalès, on a :

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$$

En remplaçant par les valeurs :

$$\frac{2}{5} = \frac{AN}{7}$$


On calcule AN avec le produit en croix :

$$AN = \frac{2 \times 7}{5} = \frac{14}{5} = 2{,}8 \text{ cm}$$

PCB

Exemple 2

Soit un triangle ABC tel que $AM = 2$ cm, $AB = 5$ cm, $AC = 7$ cm et $BC = 6$ cm. La droite (MN) est parallèle à (BC). Calculer la longueur MN.



Solution 2

— Les droites (AB) et (AC) sont sécantes en A.

— Les droites (MN) et (BC) sont parallèles.

D'après la conséquence du théorème de Thalès, on a l'égalité des trois quotients :

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$$

Pour calculer MN, on utilise le rapport contenant MN et un rapport dont toutes les valeurs sont connues ($\frac{AM}{AB}$) :

$$\frac{2}{5} = \frac{MN}{6}$$


On calcule MN à l'aide d'un produit en croix :

$$MN = \frac{2 \times 6}{5} = \frac{12}{5} = 2{,}4 \text{ cm}$$

Application 1

Les points F, G, H sont alignés et les points D, G, E le sont également. Les droites (EF) et (HD) sont parallèles.

On sait que : $GH = 15$ cm ; $GF = 6$ cm ; $GD = 14{,}2$ cm et $HD = 7{,}3$ cm.



Calculer les longueurs EF et EG.

BGB

Correction 1

Rappel des données :

— Les points F, G, H sont alignés et les points D, G, E sont alignés.

— Les droites (EF) et (HD) sont parallèles.

— $GH = 15$ cm ; $GF = 6$ cm ; $GD = 14{,}2$ cm et $HD = 7{,}3$ cm.

Calcul de la longueur EF :

1. Les droites (FH) et (ED) sont sécantes en G.
2. Les droites (EF) et (HD) sont parallèles.
3. D'après le théorème de Thalès (dans sa configuration croisée), on a l'égalité des quotients :

$$\frac{GE}{GD} = \frac{GF}{GH} = \frac{EF}{HD}$$

En utilisant les quotients $\frac{GF}{GH} = \frac{EF}{HD}$ et en remplaçant par les valeurs numériques connues :

$$\frac{6}{15} = \frac{EF}{7{,}3}$$

Par un produit en croix, on obtient :

$$EF = \frac{6 \times 7{,}3}{15} = \frac{43{,}8}{15} = 2{,}92 \text{ cm}$$

Calcul de la longueur EG : En utilisant cette fois les quotients $\frac{GE}{GD} = \frac{GF}{GH}$:

$$\frac{GE}{14{,}2} = \frac{6}{15}$$

Par un produit en croix :

$$GE = \frac{14{,}2 \times 6}{15} = \frac{85{,}2}{15} = 5{,}68 \text{ cm}$$

II. La réciproque du théorème de Thalès

1. Énoncé du théorème

Soit deux droites (AB) et (AC) sécantes en un point A. Si les points A, B, M d'une part et A, C, N d'autre part sont alignés dans le même ordre, et si les rapports $\frac{AM}{AB}$ et $\frac{AN}{AC}$ sont égaux, alors les droites (MN) et (BC) sont parallèles.

2. Montrer que deux droites sont parallèles

Pour démontrer que deux droites sont parallèles à l'aide de la réciproque du théorème de Thalès, on procède en deux étapes distinctes (on ne met jamais les deux fractions égales au départ puisque c'est ce que l'on veut prouver) :

1. **On calcule séparément** le rapport des longueurs d'un côté ($\frac{AM}{AB}$) puis de l'autre ($\frac{AN}{AC}$).
2. **On compare** les deux résultats obtenus : s'ils sont égaux, les droites sont parallèles.

PCB

Attention

Il est impératif de bien vérifier que les points sont alignés dans le **même ordre** sur les deux droites sécantes avant d'appliquer la réciproque.

Exemple

Soit un triangle ABC tel que $AM = 2$ cm, $AB = 5$ cm, $AN = 2{,}8$ cm et $AC = 7$ cm. Les droites (MN) et (BC) sont-elles parallèles ?

— D'une part : $\dfrac{AM}{AB} = \dfrac{2}{5} = 0{,}4$

— D'autre part : $\dfrac{AN}{AC} = \dfrac{2{,}8}{7} = 0{,}4$

On constate que $\dfrac{AM}{AB} = \dfrac{AN}{AC}$ et les points sont alignés dans le même ordre. D'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites (MN) **et** (BC) **sont parallèles**.

Application

Énoncé : Sur une figure, on donne $AE = 3$ cm, $AB = 7$ cm, $AF = 4{,}5$ cm et $AC = 10{,}5$ cm. Les points A, E, B d'une part et A, F, C d'autre part sont alignés. Les droites (EF) et (BC) sont-elles parallèles ?

Correction

1. Calculons les deux rapports séparément :

$$\frac{AE}{AB} = \frac{3}{7} \approx 0{,}428 \quad \text{et} \quad \frac{AF}{AC} = \frac{4{,}5}{10{,}5} = \frac{45}{105} = \frac{3}{7} \approx 0{,}428$$

2. On remarque que $\dfrac{AE}{AB} = \dfrac{AF}{AC} = \dfrac{3}{7}$.
3. De plus, les points A, E, B et A, F, C sont alignés dans le même ordre.

D'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites (EF) **et** (BC) **sont parallèles**.

PCB