

Chapitre II : Fonctions - Applications

I. Notion de fonctions

1) Définitions et exemples

a) Définition :


On appelle **fonction**, toute relation f entre 2 ensembles A et B telle que à tout élément x de A on associe au plus un élément y de B . Cela veut dire 1 image ou pas d'image uniquement.

Si x est associé à y ($x \in A$ et $y \in B$), on note alors :

$$f(x) = y$$

- y est appelé image de x par la fonction f ,
- et x est un antécédent de y par f .
- A est l'ensemble de départ de la fonction f et B son ensemble d'arrivée.

b) Exemples:



$$f(a) = 1$$


$$f(b) = 1$$

$$f(c) = 3$$

$$f(d) = 2$$

e n'a pas d'image par f .

A tout élément de A on associe au plus un élément de B . Donc, la relation f ainsi définie est une fonction.



g n'est pas une fonction car on a associé à $a \in E$, 2 éléments 1 et 3 de F .

Remarque:

- Si $B \subset \mathbb{R}$ alors f est appelée une **fonction numérique**.
- Si $A \subset \mathbb{R}$ alors f est appelée une **fonction à variable réelle**.
- Si $A \subset \mathbb{R}$ et $B \subset \mathbb{R}$ alors f est appelée une **fonction numérique à variable réelle**.

2) Ensemble de définition

Soit f une fonction $f : A \rightarrow B$

$$x \mapsto y = f(x)$$

L'ensemble de définition de f noté $\mathcal{D}_f$ est l'ensemble des éléments de A qui ont une image par f dans B .

Exemple : _____

- Dans le 1^{er} diagramme, l'ensemble de définition de f est : $\mathcal{D}_f = \{a; b; c; d\}$

- $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto 2x^3 - 5x + 3$
 $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}$

- $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto \frac{2x+5}{x^2-4} \implies f \text{ existe ssi } x^2 - 4 \neq 0, \text{ posons } x^2 - 4 = 0$

$$x = \pm 2$$

$$\mathcal{D}_f = \mathbb{R} \setminus \{-2; 2\} =]-\infty; -2[\cup]-2; 2[\cup]2; +\infty[$$

- $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto \sqrt{x-1}$
 $f \text{ existe ssi } x-1 \geq 0 \implies x \geq 1$
 $\mathcal{D}_f = [1; +\infty[$

3) Restriction - prolongement d'une fonction

a) Définition :

Soit f une fonction définie de A vers B .


Étant donné que $D \subset A$, la restriction de f à D notée $f|_D$ est la fonction :


$$f|_D : D \rightarrow B$$
$$x \mapsto y = f(x)$$

f est alors appelée le prolongement de $f|_D$ à A .

Exemple :

Soit f la fonction représentée par le diagramme ci-dessous :





Soit $E = \{1; 2; 3; 5; 6\}$, il est clair que $E \subset A$ donc g est une restriction de f sur E ou f est un prolongement de g à A .

On donne $f(x) = |x - 1|$. Écrire f sans le symbole de la valeur absolue puis donner la restriction de f sur $]1; +\infty[$.

$$f(x) = \begin{cases} -x + 1 & \text{si } x < 1 \\ x - 1 & \text{si } x > 1 \\ 0 & \text{si } x = 1 \end{cases} \implies f(x)|_{]1; +\infty[} = x - 1$$

I. Notion d'application

1. Définition et exemples

a) Définition :


On appelle **application** d'un ensemble A vers un ensemble B toute relation de A vers B telle que **à tout élément de A , on associe un et un seul élément de B** .

Autrement dit, chaque élément de A possède une unique image dans B .

b) Exemple :

La relation qui à chaque élève de la 1^{ère} S₂ du lycée associe son âge est une **application**.

En effet, un élève ne peut avoir qu'un seul et unique âge.




On a :

$$\begin{aligned} f(a) &= 1, \\ f(b) &= 1, \\ f(c) &= 2, \\ f(d) &= 3. \end{aligned}$$

Cependant, un élément de B peut avoir plusieurs antécédents dans A , ou même n'avoir aucun antécédent.

c) Contre-exemple :

f est une application car tout élément de départ est inclus dans son ensemble de définition.
À chaque élément de A on associe un et un seul élément de B .



g n'est pas une application car 3 n'a pas d'image.

Remarque :

Toute **application** est une fonction mais la réciproque n'est pas toujours vraie.
La restriction d'une fonction à son ensemble de définition est une **application**.

2. Application bijective ou bijection

a) Définition :

Une application définie de A vers B est **bijective** si tout élément de B admet un et un seul antécédent dans A .

Ainsi,

$$\forall y \in B, \quad \exists! x \in A \mid f(x) = y.$$


C'est-à-dire que pour tout $y \in B$, l'équation

$$f(x) = y$$


admet une unique solution.

b) Exemple :

Illustration graphique :




Chaque élément de B a un et un seul antécédent par f dans A . Donc f est une application bijective ou une bijection.



2 admet deux antécédents donc g n'est pas une application bijective.

$$\mathbf{M} \xrightarrow{h} \mathbf{N}$$



γ n'a pas d'antécédent par h .
Donc, h n'est pas une bijection.

Applications

- ① Soit f l'application définie par

$$f : [0; +\infty[\longrightarrow [0; +\infty[\\ x \longmapsto f(x) = x^2$$

f est-elle bijective ?

Soit $y \in [0; +\infty[$, résolvons l'équation $f(x) = y$.

$$f(x) = y \implies x^2 = y \implies x = \sqrt{y} \in [0; +\infty[\quad \text{ou} \quad x = -\sqrt{y} \notin [0; +\infty[$$

Donc l'équation $f(x) = y$ admet une unique solution $x = \sqrt{y}$.

Par conséquent, f est une **bijection**.

- ② Soit ℓ la relation définie par :

$$\ell :]-\infty; -2] \longrightarrow [-3; +\infty[\\ x \longmapsto \ell(x) = x^2 + 4x + 1$$

a ℓ est-elle une application ?

b Si oui, est-elle bijective ?

a Soit $x \in]-\infty; -2]$, il est clair que $x^2 + 4x + 1$ est unique car $x^2 + 4x + 1 = (x + 2)^2 - 3$.

De plus, $(x + 2)^2 \geq 0 \implies (x + 2)^2 - 3 \geq -3$.

Ce qui donne $\ell(x) \geq -3 \implies \ell(x) \in [-3; +\infty[$.

Par conséquent, ℓ est une **application**.

OU

Soit $x \in]-\infty; -2]$, il est clair que $x^2 + 4x + 1$ est unique.

Vérifions que si $\ell(x) \geq -3$.

Pour cela, évaluons $\ell(x) + 3$.

$$\ell(x) + 3 = x^2 + 4x + 1 + 3$$

$$= x^2 + 4x + 4$$

$$\ell(x) + 3 = (x + 2)^2 \geq 0$$

$$\ell(x) + 3 \geq 0 \implies \ell(x) \geq -3$$

Donc, $\ell(x) \in [-3; +\infty[$.

Par conséquent, ℓ est une **application**.

b Soit $y \in [-3; +\infty[$, résolvons $\ell(x) = y$.

$$x^2 + 4x + 1 = y \implies x^2 + 4x + 1 - y = 0$$

$$\Delta = 16 - 4(1)(1 - y)$$

$$\Delta = 16 - 4 + 4y$$

$$\Delta = 12 + 4y$$

Posons $\Delta = 0$

$$12 + 4y = 0 \implies y = -3$$

x	$-\infty$	-3	$+\infty$
$4x + 12$		0	+

car $y \in [-3; +\infty[$

Comme $\Delta > 0$, l'équation $\ell(x) = y$ admet 2 solutions.

Si $y = -3$ alors $\Delta = 0$; $x_0 = \frac{-4}{2} = -2$.

Si $y > -3$

$$x_1 = \frac{-4 - \sqrt{12 + 4y}}{2} = \frac{-4 - \sqrt{4(3 + y)}}{2} = -2 - \sqrt{3 + y} < -2$$

$$x_2 = -2 + \sqrt{3 + y} > -2 \quad \text{alors}$$

$$x_2 \notin]-\infty; -2].$$

$$x_1 = -2 - \sqrt{3 + y} \in]-\infty; -2]$$

Conclusion :

$\forall y \in [-3; +\infty[$, l'équation $\ell(x) = y$ admet une unique solution dans $] -\infty; -2]$.

Donc, ℓ est une **application bijective**.

c) Bijections réciproques :

Définition :

f étant une bijection d'un ensemble A dans un ensemble B , on appelle **bijection réciproque de f** , l'application de B dans A notée f^{-1} qui à tout élément de B associe son unique antécédent par f dans A .

L'application réciproque est définie de l'ensemble d'arrivée B vers l'ensemble de départ A .

Propriété :

Si f^{-1} est l'application de f , alors f est aussi l'application réciproque de f^{-1} .

Ex :

On donne :

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} \setminus \{-3\} &\longrightarrow \mathbb{R} \setminus \{2\} \\ x &\longmapsto \frac{2x + 1}{x + 3} \end{aligned}$$

Montrer que f est une bijection puis déterminer sa bijection réciproque.

Résolution :

Montrons que f est une bijection puis déterminons sa bijection réciproque.

Soit $y \in \mathbb{R} \setminus \{2\}$, résolvons $f(x) = y$.