

Td Suites

Exercice 1

Soit (u_n) une suite définie par :

$$u_0 = 1 \quad \text{et} \quad u_{n+1} = \frac{u_n - 1}{3u_n + 1}.$$

- 1 Calculer les 4 premiers termes de la suite (u_n) .
- 2 Représenter graphiquement la suite (u_n) .
- 3 Montrer que (u_n) est périodique de période 3.

Exercice 2 On considère la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie

$$\text{par : } \begin{cases} u_0 = 13, \\ u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 7. \end{cases}$$

- 1 Montrer que : $(\forall n \in \mathbb{N}), u_n < 14$.
- 2 Soit $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par : $v_n = 14 - u_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

a Montrer que la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est géométrique de raison $\frac{1}{2}$, puis écrire v_n en fonction de n .

b En déduire que :

$$(\forall n \in \mathbb{N}), u_n = 14 - \left(\frac{1}{2}\right)^n.$$

Exercice 3 Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite numérique

$$\text{définie par : } \begin{cases} u_0 = 2, \\ (\forall n \in \mathbb{N}), u_{n+1} = \frac{7u_n - 25}{u_n - 3}. \end{cases}$$

- 1 Montrer que : $(\forall n \in \mathbb{N}), u_n \neq 5$.
- 2 On considère la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par : $v_n = \frac{1}{u_n - 5}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

a Montrer que $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite arithmétique.

b Déterminer v_n , puis u_n en fonction de n .

- 3 **a** Calculer : $S_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n$ en fonction de n .

b On pose : $P_n = 2^{v_0} \times 2^{v_1} \times \dots \times 2^{v_n}$. Déterminer P_n en fonction de n .

Exercice 4

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ la suite numérique

$$\text{définie par : } \begin{cases} u_1 = \frac{1}{3}, \\ (\forall n \in \mathbb{N}^*), u_{n+1} = \frac{2u_n}{1 + (n+2)u_n}. \end{cases}$$

Soit $(v_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ la suite numérique définie par :

$$v_n = \frac{1}{u_n} - n.$$

- 1 Montrer que la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est géométrique.

2 a Déterminer v_n et u_n en fonction de n .

b Calculer en fonction de n la somme : $S_n = v_1 + v_2 + \dots + v_n$.

Exercice 5

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite numérique

$$\text{définie par : } \begin{cases} u_0 = 1, \\ (\forall n \in \mathbb{N}), u_{n+1} = \frac{2u_n^3}{3u_n^2 + 1}. \end{cases}$$

- 1 **a** Montrer que : $(\forall n \in \mathbb{N}), u_n > 0$.

b Étudier la monotonie de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

- 2 **a** Montrer que : $(\forall n \in \mathbb{N}), u_{n+1} \leq \frac{1}{2}u_n$.

b En déduire que : $(\forall n \in \mathbb{N}), u_n \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n$.

Exercice 6

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite numérique

$$\text{définie par : } \begin{cases} u_0 = 0, \\ u_{n+1} = \sqrt{3u_n + 4}, \quad \forall n \in \mathbb{N}. \end{cases}$$

- 1 Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}, 0 \leq u_n \leq 4$.

- 2 Montrer que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante.

- 3 **a** Montrer que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, 4 - u_{n+1} \leq \frac{1}{2}(4 - u_n).$$

b En déduire que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, 4 - u_n \leq 4 \left(\frac{1}{2}\right)^n.$$

c Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Exercice 7

- 1 Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite numérique définie par :
- $$\begin{cases} u_0 = \frac{10}{3}, \\ (\forall n \in \mathbb{N}), u_{n+1} = \frac{u_n^2 - 3u_n + 9}{u_n}. \end{cases}$$

a Montrer que : $(\forall n \in \mathbb{N}), u_n \geq 3$.

b En déduire que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante et que :

$$(\forall n \in \mathbb{N}), 3 \leq u_n \leq \frac{10}{3}.$$

- 2 On considère la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par :
- $$\begin{cases} v_0 = \frac{1}{2}, \\ (\forall n \in \mathbb{N}), v_{n+1} = \frac{2v_n^2}{1 + v_n^2}. \end{cases}$$

a Montrer que :

$$(\forall n \in \mathbb{N}), v_n > 0 \text{ et } v_n \leq \frac{1}{2}.$$

b Montrer que : $(\forall n \in \mathbb{N}), \frac{v_{n+1}}{v_n} \leq 1$.

En déduire que $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante.

- 3 Soit $(t_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par :
- $$\begin{cases} t_0 = 1, \\ (\forall n \in \mathbb{N}), t_{n+1} = \sqrt{\frac{1}{2}t_n + \frac{3}{2}}. \end{cases}$$

Montrer que la suite $(t_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est strictement croissante.

- 4 Soit $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par :
- $$\begin{cases} w_0 = 1, \\ (\forall n \in \mathbb{N}), w_{n+1} = f(w_n). \end{cases}$$
- où $f(x) = x^2 - 2x$.

5 Montrer que : $(\forall n \in \mathbb{N}), w_n \geq 3$.

6 Montrer que la suite $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante.

Exercice 8 On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = \frac{x}{1 + x + x^2}$.

1 a Étudier les variations de f .

b Déterminer $f([0, 1])$.

- 2 On considère la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par :
- $$\begin{cases} u_0 = 1, \\ u_{n+1} = f(u_n), \quad \forall n \in \mathbb{N}. \end{cases}$$

a Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}, 0 \leq u_n \leq 1$, puis $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} < u_n$.

b Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}^*, f\left(\frac{1}{n}\right) \leq \frac{1}{n+1}$,
en déduire que : $\forall n \in \mathbb{N}^*, 0 \leq u_n \leq \frac{1}{n}$.

c Montrer que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente, puis calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Exercice 9 Démontrer par récurrence les propriétés suivantes :

1 $3^{2n+1} + 2^{n+2}$ est divisible par 7.

2 $\forall n \in \mathbb{N}, (a+b)^n = \sum_{p=0}^n C_n^p a^p b^{n-p}$.

3 $\forall n \in \mathbb{N}, 0 \leq u_n \leq 2$ où $\begin{cases} u_0 = 1, \\ u_{n+1} = \frac{2u_n + 1}{u_n + 1}. \end{cases}$

4 Soit (u_n) la suite définie par :

$$u_0 = 2 \text{ et } u_{n+1} = 3u_n - 5, \text{ pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

Démontrer sur $\mathbb{N}$ que : $u_n = \frac{1}{2}(3^n - 5)$.

5 Soit la suite définie par $u_1 = 5$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}^*, u_{n+1} = \sqrt{2 + u_n}$.

Démontrer sur $\mathbb{N}^*$ que $u_n \geq 2$.

6 Démontrer que $\forall n \geq 4, 2^n \geq n^2$.

Exercice 10 Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite numérique définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 0, \\ u_{n+1} = \sqrt{3u_n + 4}, \quad \forall n \in \mathbb{N}. \end{cases}$$

1 Montrer que : $(\forall n \in \mathbb{N}), 0 \leq u_n \leq 4$.

2 Montrer que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante.

3 a Montrer que :

$$(\forall n \in \mathbb{N}), 4 - u_{n+1} \leq \frac{1}{2}(4 - u_n).$$

b En déduire que :

$$(\forall n \in \mathbb{N}), 4 - u_n \leq 4 \left(\frac{1}{2}\right)^n.$$

Exercice 11 Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite numérique définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 1, \\ u_{n+1} = \frac{2u_n + 3}{u_n + 2}, \quad \forall n \in \mathbb{N}. \end{cases}$$

1 a Montrer par récurrence que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est strictement croissante.

b Montrer que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est majorée par 2.

2 On pose : $\forall n \in \mathbb{N}, v_n = \frac{u_n - \sqrt{3}}{u_n + \sqrt{3}}$.

a Montrer que $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite géométrique en déterminant sa raison et son premier terme.

b Déterminer u_n en fonction de n .

Exercice 12 Soit $(U_n)_{n \geq 1}$ la suite définie par :

$$U_1 = 1, \quad (U_{n+1})^2 = 4U_n, \quad \forall n \geq 1.$$

1 Calculer U_2, U_3, U_4 et U_5 sous la forme 2^α .

2 Soit (V_n) la suite définie par :

$$V_n = \ln(U_n) - \ln 4, \quad \forall n \geq 1.$$

a Montrer que (V_n) est une suite géométrique ; préciser la raison et le premier terme.

b En déduire l'expression de V_n , puis celle de U_n en fonction de n .

3 Pour quelles valeurs de n a-t-on $U_n > 3,96$?

Exercice 13 On considère les suites (U_n) et (V_n)

définies par : $U_1 = 2, \quad U_{n+1} = \frac{U_n + 2V_n}{3}$

$$V_1 = 8, \quad V_{n+1} = \frac{U_n + 5V_n}{6}, \quad \text{avec } n \in \mathbb{N}^*.$$

1 Soit $a_n = V_n - U_n$ pour tout entier naturel n non nul.

a Démontrer que (a_n) est une suite géométrique.

b Exprimer a_n en fonction de n .

2 a Démontrer que (U_n) est croissante et (V_n) décroissante.

b Démontrer que (U_n) est majorée et (V_n) minorée.

c En déduire que (U_n) et (V_n) ont une limite commune.

3 Soit $w_n = \frac{1}{4}U_n + V_n$ pour tout entier naturel n non nul.

a Montrer que (w_n) est une suite constante.

b En déduire les limites de (U_n) et (V_n) .

Exercice 14 Soit la suite (u_n) définie par :

$$u_0 = 0, \quad u_{n+1} = \sqrt{2 + u_n}.$$

1 Montrer que pour tout entier naturel $n, 0 \leq u_n \leq 2$.

2 Montrer que (u_n) est croissante.

3 En déduire que (u_n) converge vers un réel l à déterminer.

4 Démontrer que $\forall n \in \mathbb{N}, |u_{n+1} - 2| \leq \frac{1}{2}|u_n - 2|$,
puis $|u_n - 2| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n |u_0 - 2|$.

5 Retrouver les résultats de la troisième question.

Exercice 15 On considère les suites (U_n) et (V_n) définies par :

$$\begin{cases} U_1 = 12, \\ U_{n+1} = \frac{U_n + 2V_n}{3}, \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} V_1 = 1, \\ V_{n+1} = \frac{U_n + 3V_n}{4}, \end{cases} \quad n \in \mathbb{N}^*.$$

1 $W_n = U_n - V_n$ pour tout n non nul. Montrer que (W_n) est une suite géométrique convergente.

2 Exprimer W_n en fonction de n .

3 Démontrer que (U_n) est décroissante et (V_n) est croissante.

4 Démontrer que pour tout entier non nul $n, U_n \geq V_n$, et en déduire que $V_1 \leq V_n \leq U_n \leq U_1$. Conclure.

5 $T_n = 3U_n + 8V_n$ avec n entier naturel non nul. Montrer que (T_n) est une suite constante, puis déterminer les limites de (U_n) et (V_n) .

Exercice 16 On considère la fonction f définie par $f(x) = x - \ln|x|$. Soit (C_f) sa courbe représentative dans le plan muni d'un repère orthonormal $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1 Déterminer son ensemble de définition D_f , puis calculer les limites aux bornes de D_f .

2 Calculer sa dérivée, étudier son signe puis dresser son tableau de variation.

3 Montrer que (C_f) coupe l'axe des abscisses en un seul point A d'abscisse α .

4 Établir les inégalités suivantes :

a $\forall x \geq 1, x - \ln x \geq 1$ (on pourra utiliser l'étude de la fonction f de la partie I).

b $0 \leq x \leq 1, x^2 \leq x$.

c $0 \leq x \leq 1, \ln(1+x) - x - \frac{x^2}{2} \geq 0$
(on pourra étudier les variations de $g(x) = \ln(1+x) - x + \frac{x^2}{2}$).

5 On considère la suite (U_n) définie par :

$$U_0 = 2, \quad U_{n+1} = U_n - \ln U_n, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

a Donner une valeur approchée de U_1 à 10^{-2} près et montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, U_n \geq 1$.

b Montrer que la suite (U_n) est décroissante.

6 On pose $\forall n \in \mathbb{N}, V_n = U_n - 1$.

a Calculer V_0 , puis exprimer V_{n+1} en fonction de V_n .

b Préciser le sens de variation de la suite (V_n) .

c Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, 0 \leq V_n \leq 1$. En déduire que (V_n) converge.

d Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, V_{n+1} \leq \frac{1}{2}V_n$ et $0 \leq V_n \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n$. En déduire la limite de (V_n) .

Exercice 17 Les parties A et B sont indépendantes.

Partie A

Un individu décide d'investir dans un plan d'épargne où le capital initial est de 5000 F CFA. Chaque année, le montant investi croît de 5% par rapport à l'année précédente, grâce aux intérêts composés.

1 Déterminer la nature de la suite représentant le capital total après n années.

2 Calculer le premier terme de cette suite.

3 Exprimer le terme général u_n de la suite en fonction de n .

4 Calculer la somme $S_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n$, représentant le capital total accumulé après n années.

5 Calculer la limite de S_n lorsque $n \rightarrow +\infty$, si elle existe.

Partie B

Un individu décide de rembourser une dette de 10 000 € par versements annuels. Chaque année, il augmente son remboursement de 200 € par rapport à l'année précédente.

1 Déterminer la nature de la suite représentant le montant remboursé chaque année.

2 Calculer le premier terme de cette suite.

3 Exprimer le terme général u_n de la suite en fonction de n .

4 Calculer la somme $S_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n$, représentant le total remboursé après n années.

5 Calculer la limite de S_n lorsque $n \rightarrow +\infty$, si elle existe.