

CHAPITRE 6 : FONCTION LOGARITHME NÉPÉRIEN

Prof : M. BA

Classe : Terminale L

Durée : 6 heures

Année scolaire : 2025 – 2026

I. Généralités

Activité 1 Avec la calculatrice remplir le tableau suivant :

a	-2	-1	0	0,25	0,5	0,75	1	2	5
$\ln a$									

1. Définition et notation

Définition

On appelle **fonction logarithme népérien**, notée $\ln$, la primitive sur $]0; +\infty[$ de la fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$ qui s'annule en 1.

$$\ln(1) = 0 \quad \text{et pour tout } x \in]0; +\infty[, \quad (\ln x)' = \frac{1}{x}$$

2. Remarques

Remarque 1

- La fonction $\ln x$ n'est définie que pour des nombres ****strictement positifs**** ($x > 0$).
- Pour tout $x > 0$, $(\ln x)' = \frac{1}{x} > 0$, la fonction $\ln$ est donc ****strictement croissante**** sur $]0; +\infty[$.
- Il existe un unique nombre réel noté e (base du logarithme) tel que :

$$\ln(e) = 1 \quad \text{avec } e \approx 2,718$$

Remarque 2

- Si $a \in]-\infty; 0]$ alors $\ln a$ n'existe pas.
- Si $a \in]0; 1[$ alors $\ln a < 0$
- Si $a \in]1; +\infty[$ alors $\ln a > 0$

3. Propriétés algébriques

Propriété fondamentale (Produit)

Pour tous réels $a > 0$ et $b > 0$:

$$\ln(a \times b) = \ln(a) + \ln(b)$$

Conséquences des propriétés : Pour tous réels $a > 0$ et $b > 0$, et pour tout $n \in \mathbb{Z}$:

- a) **Inverse** : $\ln\left(\frac{1}{a}\right) = -\ln(a)$
- b) **Quotient** : $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln(a) - \ln(b)$
- c) **Puissance** : $\ln(a^n) = n \ln(a)$
- d) **Racine carrée** : $\ln(\sqrt{a}) = \frac{1}{2} \ln(a)$

Exemple :

Simplifier

$$A = \ln(6) - \ln(2) + \ln(e^3) :$$

Solution :

$$A = \ln\left(\frac{6}{2}\right) + 3\ln(e) = \ln(3) + 3(1) = \ln(3) + 3$$

Application :

- 1. Écrire $A = \ln\left(\frac{3}{4}\right) - \ln 18 + \ln 9$ en fonction de $\ln 2$ et $\ln 3$.
- 2. Écrire $A = \ln\left(\frac{9}{2}\right) - \ln 16 + \ln \sqrt{3}$ en fonction de $\ln 2$ et $\ln 3$.
- 3. Écrire $A = \ln\left(\frac{1}{8}\right) + \ln 24 - \ln 81$ en fonction de $\ln 2$ et $\ln 3$.

Correction :

1. Écrivons

$$A = \ln\left(\frac{3}{4}\right) - \ln 18 + \ln 9$$

$$= (\ln 3 - \ln 4) - \ln(2 \times 9) + \ln(3^2)$$

$$= \ln 3 - \ln(2^2) - (\ln 2 + \ln 9) + 2 \ln 3$$

$$= \ln 3 - 2 \ln 2 - \ln 2 - \ln(3^2) + 2 \ln 3$$

$$= \ln 3 - 2 \ln 2 - \ln 2 - 2 \ln 3 + 2 \ln 3$$

$$= (-2 - 1) \ln 2 + (1 - 2 + 2) \ln 3$$

$$= -3 \ln 2 + \ln 3$$

2. Écrivons

$$\begin{aligned}
A &= \ln\left(\frac{9}{2}\right) - \ln 16 + \ln \sqrt{3} \\
&= (\ln 9 - \ln 2) - \ln(2^4) + \frac{1}{2} \ln 3 \\
&= \ln(3^2) - \ln 2 - 4 \ln 2 + \frac{1}{2} \ln 3 \\
&= 2 \ln 3 - \ln 2 - 4 \ln 2 + \frac{1}{2} \ln 3 \\
&= (-1 - 4) \ln 2 + \left(2 + \frac{1}{2}\right) \ln 3 \\
&= -5 \ln 2 + \frac{5}{2} \ln 3
\end{aligned}$$

3. Ecrivons

$$\begin{aligned}
A &= \ln\left(\frac{1}{8}\right) + \ln 24 - \ln 81 \\
&= -\ln 8 + \ln(8 \times 3) - \ln(3^4) \\
&= -\ln(2^3) + (\ln(2^3) + \ln 3) - 4 \ln 3 \\
&= -3 \ln 2 + 3 \ln 2 + \ln 3 - 4 \ln 3 \\
&= (-3 + 3) \ln 2 + (1 - 4) \ln 3 \\
&= 0 \ln 2 - 3 \ln 3 \\
&= -3 \ln 3
\end{aligned}$$

II. Équations-Inéquations

Grâce à la stricte croissance de la fonction $\ln$ sur $]0; +\infty[$, pour tous réels $a > 0$ et $b > 0$:

- $\ln(a) = \ln(b) \iff a = b$
- $\ln(a) < \ln(b) \iff a < b$
- $\ln(x) > 0 \iff x > 1$
- $\ln(x) < 0 \iff 0 < x < 1$

1. Équations

Exemple 1 : Équation du type $\ln(A) = \ln(B)$

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $(E_1) : \ln(2x - 3) = \ln(x + 1)$.

— **Domaine de validité :**

$$D_E = \{x \in \mathbb{R} \mid 2x - 3 > 0 \text{ et } x + 1 > 0\} =]\frac{3}{2}; +\infty[\cap]-1; +\infty[=]\frac{3}{2}; +\infty[.$$

— **Résolution :**

Pour $x \in D_E$:

$$\ln(2x - 3) = \ln(x + 1) \iff 2x - 3 = x + 1 \iff x = 4$$

- **Conclusion :**
 $4 \in]\frac{3}{2}; +\infty[$, donc $\mathbf{S} = \{4\}$.

Exemple 2 : Équation se ramenant au second degré

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $(E_2) : (\ln x)^2 - 3 \ln x + 2 = 0$.

- **Domaine de validité :**
 $D_E =]0; +\infty[$.
- **Changement de variable :**
 Posons $X = \ln x$. L'équation devient :

$$X^2 - 3X + 2 = 0$$

$$\Delta = (-3)^2 - 4(1)(2) = 1 > 0 \implies X_1 = 1 \quad \text{et} \quad X_2 = 2.$$

- **Retour à x :**
 - $\ln x = 1 \iff x = e$
 - $\ln x = 2 \iff x = e^2$
- **Conclusion :** $e \in D_E$ et $e^2 \in D_E$, donc $\mathbf{S} = \{e; e^2\}$.

2. Inéquations

Exemple 3 :

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $(I_1) : \ln(x - 2) \leq 0$.

- **Domaine de validité :**
 $D_I = \{x \in \mathbb{R} \mid x - 2 > 0\} =]2; +\infty[$.
- **Résolution :**
 Comme $0 = \ln(1)$, l'inéquation s'écrit :
 $\ln(x - 2) \leq \ln(1) \iff x - 2 \leq 1 \iff x \leq 3$
- **Intersection avec D_I :**
 $x \in]2; +\infty[\text{ et } x \in]-\infty; 3] \implies x \in]2; 3]$.
- **Conclusion :**
 $\mathbf{S} =]2; 3]$.

Exercice d'application : Équations et inéquations

Exercice d'application

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et inéquations suivantes :

1. $\ln x = 0$
2. $\ln x < 0$
3. $\ln(x + 3) = 0$

1. Résolution de $\ln x = 0$:

— **Domaine de définition :**

L'expression $\ln x$ est définie sur $D =]0; +\infty[$.

— **Résolution :**

$$\ln x = 0 \iff \ln x = \ln(\mathbf{1})$$

$$\iff x = \mathbf{1}$$

— **Conclusion :**

Comme $1 \in]0; +\infty[$, l'ensemble des solutions est $\mathbf{S_1 = \{1\}}$.

2. Résolution de $\ln x < 0$:

— **Domaine de définition :**

L'expression $\ln x$ exige $x > 0$, donc $D =]0; +\infty[$.

— **Résolution :**

La fonction logarithme népérien étant strictement croissante sur $]0; +\infty[$:

$$\ln x < 0 \iff \ln x < \ln(\mathbf{1})$$

$$\iff x < 1$$

— **Conclusion :** En tenant compte de la condition d'existence $x > 0$, on cherche les x tels que $0 < x < 1$.

L'ensemble des solutions est $\mathbf{S_2 =]0; 1[}$.

3. Résolution de $\ln(x + 3) = 0$:

— **Domaine de définition :**

L'expression est définie si $x + 3 > 0 \iff x > -3$.

Le domaine de définition est $D =]-3; +\infty[$.

— **Résolution :**

$$\ln(x + 3) = 0 \iff \ln(x + 3) = \ln(\mathbf{1})$$

$$\iff x + 3 = 1$$

$$\iff x = 1 - 3$$

$$\iff x = \mathbf{-2}$$

— **Conclusion :**

La valeur -2 appartient bien à $] -3; +\infty[$.

L'ensemble des solutions est $\mathbf{S_3 = \{-2\}}$.

Devoir à la maison : Équations et inéquations logarithmiques

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et inéquations suivantes :

1. $\ln(2x - 1) = 0$

2. $2 \ln x - 3 \ln 2 \leq 0$

3. $\ln(x - 4) = \ln(2x - 3)$

4. $\ln(x^2 + 5x + 6) \geq 0$

5. $3(\ln x)^2 - 2 \ln x - 1 = 0$

6. $\ln(2x - 1) - \ln(1 + x) < \ln 3$