

I. Angles orientés et mesures

1. Cercle trigonométrique et angle orienté

a. Définition

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs non nuls du plan O , A et B trois points tel que $\overrightarrow{OA} = \vec{u}$ et $\overrightarrow{OB} = \vec{v}$.

On considère les vecteurs $\vec{u}_1$ et $\vec{v}_1$ des vecteurs unitaires de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ respectivement et k_1 et k_2 deux réels $\in \mathbb{R}_+^*$.

L'angle orienté du couple de vecteurs $\vec{v}$ et $\vec{u}$ est noté $(\vec{v}, \vec{u})$ et est défini par :

- L'angle orienté de deux demi-droites noté $([OB], [OA])$.
- L'angle orienté du couple de vecteurs $k_2\vec{v}_1$ et $k_1\vec{u}_1$ que l'on note $(k_2\vec{v}_1, k_1\vec{u}_1)$.
- L'angle orienté du couple de vecteurs $\overrightarrow{OB}$ et $\overrightarrow{OA}$ que l'on note $(\overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OA})$.
- L'angle orienté du couple des vecteurs unitaires $\vec{v}_1$ et $\vec{u}_1$ que l'on note $(\vec{v}_1, \vec{u}_1)$.

Ainsi on a : $(\vec{v}, \vec{u}) = (k_2\vec{v}_1, k_1\vec{u}_1) = (\vec{v}_1, \vec{u}_1) = (\overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OA}) = ([OB], [OA])$

b. Mesure d'un angle orienté

Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs non nuls du plan.

Si θ est une mesure de l'angle orienté $(\vec{u}, \vec{v})$ alors les autres mesures des autres angles sont de la forme $\theta + 2k\pi$ ou $\theta[2\pi]$ avec $k \in \mathbb{Z}$.

c. Mesure principale

Parmi toutes les mesures de l'angle orienté $(\vec{u}, \vec{v})$ un et un seul angle $\in]-\pi, \pi]$ ainsi la mesure principale de l'angle $(\vec{u}, \vec{v})$ est noté $\alpha/\alpha \in]-\pi, \pi]$ d'où $(\vec{u}, \vec{v}) = \alpha + 2k\pi = \alpha[2\pi]/\alpha \in]-\pi, \pi]$ avec $k \in \mathbb{Z}$.

Si deux angles orientés ont même mesure alors ils se différencient d'un multiple de 2π ainsi on a $\theta' = \theta + 2k\pi$ ou $\theta' = \theta[2\pi]$.

Exemple : Dans chacun des cas suivants, détermine la mesure principale de l'angle $(\vec{u}, \vec{v})$.

$$\alpha = \frac{89\pi}{7} \quad ; \quad \beta = \frac{229\pi}{12}$$

Correction :

1. Pour $\alpha = \frac{89\pi}{7}$:

Méthode 1 : Méthode algébrique (Encadrement) La mesure principale est de la forme $\alpha + 2k\pi$ avec $k \in \mathbb{Z}$ telle que $-\pi < \alpha + 2k\pi \leq \pi$.

$$\begin{aligned} -\pi < \frac{89\pi}{7} + 2k\pi \leq \pi &\iff -1 < \frac{89}{7} + 2k \leq 1 \\ &\iff -1 - \frac{89}{7} < 2k \leq 1 - \frac{89}{7} \\ &\iff -\frac{96}{7} < 2k \leq -\frac{82}{7} \\ &\iff -\frac{48}{7} < k \leq -\frac{41}{7} \\ &\iff -6,85 < k \leq -5,85 \end{aligned}$$

Comme $k \in \mathbb{Z}$, on obtient $k = -6$.

Calcul de la mesure principale :

$$\text{Mes}_{\text{principale}}(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{89\pi}{7} + 2(-6)\pi = \frac{89\pi}{7} - 12\pi = \frac{89\pi - 84\pi}{7} = \frac{5\pi}{7}$$

Méthode 2 : Méthode pratique (Division euclidienne) On effectue la division euclidienne de 89 par 7 :

$$\begin{array}{r|l} 89 & 7 \\ 19 & 12 \\ 5 & \end{array}$$

D'où :

$$\frac{89\pi}{7} = 12\pi + \frac{5\pi}{7}$$

Comme 12π est un nombre pair de π (c'est-à-dire $2 \times 6\pi$) et que $\frac{5\pi}{7} \in]-\pi, \pi]$, la mesure principale est $\frac{5\pi}{7}$.

Méthode 3 : Méthode arithmétique (Valeur approchée) On calcule la valeur approchée :

$$\frac{89}{7} \approx 12,71$$

Le nombre entier pair le plus proche de 12,71 est 12. On décompose alors α :

$$\alpha = \frac{89\pi}{7} = \frac{84\pi + 5\pi}{7} = \frac{84\pi}{7} + \frac{5\pi}{7} = 12\pi + \frac{5\pi}{7}$$

D'où $\text{Mes}_{\text{principale}}(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{5\pi}{7}$.

2. Pour $\beta = \frac{229\pi}{12}$:

On calcule la valeur approchée :

$$\frac{229}{12} \approx 19,08$$

Le nombre entier pair le plus proche de 19,08 est 20.

Décomposons β :

$$\beta = \frac{229\pi}{12} = \frac{240\pi - 11\pi}{12} = \frac{240\pi}{12} - \frac{11\pi}{12} = 20\pi - \frac{11\pi}{12}$$

Comme $20\pi = 2 \times 10\pi$ et que $-\frac{11\pi}{12} \in]-\pi, \pi]$, la mesure principale de $(\vec{u}, \vec{v})$ est :

$$\text{Mes}_{\text{principale}}(\vec{u}, \vec{v}) = -\frac{11\pi}{12}$$

2. Colinéarité et Orthogonalité

Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs non nuls du plan.

- si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires et de même sens alors l'angle orienté $(\vec{u}, \vec{v}) = [2\pi]$
- si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires et de sens opposé alors $(\vec{u}, \vec{v}) \equiv \pi[2\pi] = (2k+1)\pi$ ou $(\vec{u}, \vec{v}) = -\pi[2\pi] = (2k-1)\pi$.
- si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux : $(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{\pi}{2}[2\pi] = -\frac{\pi}{2}[2\pi]$

3. Propriétés :

- P_1 : Égalité :

Deux couples d'angle orienté sont égaux si la mesure respective de leur angles diffèrent de $2k\pi$ c.à.d la mesure de l'un égale à la mesure de l'autre ainsi on a :

$$(\vec{u}, \vec{v}) = (\vec{u}', \vec{v}') + 2k\pi \Rightarrow \theta = \theta' + 2k\pi$$

- P_2 : Relation de Chasles :

$$(\vec{u}, \vec{v}) = (\vec{u}, \vec{w}) + (\vec{w}, \vec{v}) + 2k\pi$$

- P_3 Angles associés :

- $(\vec{u}, \vec{v}) = -(\vec{v}, \vec{u})$ d'où $(\vec{u}, \vec{v})$ et $-(\vec{v}, \vec{u})$ sont opposés

- $(\vec{u}, \vec{w}) + (\vec{w}, \vec{v}) \equiv \frac{\pi}{2}[2\pi]$ d'où $(\vec{u}, \vec{w})$ et $(\vec{w}, \vec{v})$ complémentaire.

- $(\vec{u}, \vec{w}) + (\vec{w}, \vec{v}) \equiv \pi[2\pi]$ d'où $(\vec{u}, \vec{w})$ et $(\vec{w}, \vec{v})$ sont supplémentaires.

- $(\vec{u}, \vec{v}) = (-\vec{u}, -\vec{v})[2\pi]$ d'où $(\vec{u}, \vec{v})$ et $(-\vec{u}, -\vec{v})$ sont opposés par le même sommet.

II. Trigonométrie

1. Formule d'addition

Propriétés : $\forall a, b$ on a :

$$\cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$$

$$\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$$

$$\sin(a - b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b$$

$$\sin(a + b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$$

$$\tan(a - b) = \frac{\tan a - \tan b}{1 + \tan a \tan b}$$

$$\tan(a + b) = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b}$$