

Objectifs spécifiques

- ✓ Calculer des limites

Prérequis

- ✓ Limites (vues en 1ère)

Supports didactiques

- ✓ Cours limite et continuité de Bousso TS2 ;
- ✓ Mon cours de limite et continuité de TS2 ;
- ✓ CIAM 1ère L ;
- ✓ Dimathème Terminale A1 et A2.

Plan du chapitre

I. Limites de fonctions usuelles

- a** Théorème 1
- b** Théorème 2
- c** Théorème 3

II. Opérations sur les limites

- a** Limite d'une somme
- b** Limite d'un produit
 - i. Limite à l'infini d'un polynôme
- c** Limite d'un quotient
 - i. Limite à l'infini d'une fraction rationnelle
 - ii. Exemples de calculs de limites à gauche et à droite en un réel

I. Limites de fonctions usuelles

1. Théorème 1

Soit a un réel constant ou $a = \pm\infty$ et c est un réel constant. On a alors : $\lim_{x \rightarrow a} c = c$

Exemples : $\lim_{x \rightarrow 2} 3 = 3$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} -5 = -5$

2. Théorème 2

Soit n un entier naturel non nul, on a alors :

i. $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^n = +\infty$

Exemples : $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^5 = +\infty$

ii. $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n = \begin{cases} +\infty & \text{si } n \text{ est pair,} \\ -\infty & \text{si } n \text{ est impair.} \end{cases}$

Exemples : $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^7 = -\infty$

iii. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^n} = 0$

Exemples : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^4} = 0$

3. Théorème 3

Si $P(x)$ est une fonction polynôme et a est un réel constant alors : $\lim_{x \rightarrow a} P(x) = P(a)$

Exemple : $\lim_{x \rightarrow -1} (x^3 - 2x^2 + 3x + 7) = 1$

II. Opérations sur les limites

Dans les tableaux suivants, $f(x)$ et $g(x)$ sont des fonctions, a est un réel constant ou bien $a = \pm\infty$, L et L' sont des réels constants.

1. Limite d'une somme

$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$	L	L	L	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$
$\lim_{x \rightarrow a} g(x)$	L'	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
$\lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x))$	$L + L'$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	Forme indéterminée

Exemples :

— $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x^3 + \frac{1}{x^2} \right) = +\infty$

— $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(x^5 + \frac{1}{x^4} \right) = -\infty$

2. Limite d'un produit

a. Limites de $\alpha \times f(x)$

α est un réel constant, on a le tableau suivant :

$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$	L	$+\infty$	$-\infty$
$\lim_{x \rightarrow a} (\alpha \times f(x))$	$\alpha \times L$	$+\infty$ si $\alpha > 0$ $-\infty$ si $\alpha < 0$	$-\infty$ si $\alpha > 0$ $+\infty$ si $\alpha < 0$

Exemples :

— Calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} 2x^2$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty \text{ et } 2 > 0 \text{ donc } \lim_{x \rightarrow +\infty} 2x^2 = +\infty$$

— Calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} -2x^2$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty \text{ et } -2 < 0 \text{ donc } \lim_{x \rightarrow +\infty} -2x^2 = -\infty$$

b. Théorème

La limite à l'infini d'un polynôme est égale à la limite à l'infini de son monôme de plus haut degré.

Exemples :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (-3x^4 - 2x + 7) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (-3x^4) = -\infty$$

et

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (2x^3 - 5x + 1) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (2x^3) = +\infty$$

c. Limites de $f(x) \times g(x)$

$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$	0	> 0	> 0	< 0	< 0	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	0
$\lim_{x \rightarrow a} g(x)$	L'	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	∞
$\lim_{x \rightarrow a} (f(x) \times g(x))$	0	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	F.I.

3. Limites d'un quotient

a. Cas où la limite du dénominateur est non nulle

$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$	L	L	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	∞
$\lim_{x \rightarrow a} g(x)$	$L' \neq 0$	∞	$L' > 0$	$L' < 0$	$L' > 0$	$L' < 0$	∞
$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$	$\frac{L}{L'}$	0	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$	F.I.

Limite à l'infini d'une fraction rationnelle

La limite à l'infini d'une fraction rationnelle est égale à la limite à l'infini du quotient du monôme de plus haut degré de son numérateur par le monôme de plus haut degré de son dénominateur.

Exemple :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 + x + 6}{x^2 + x - 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$$

b. Cas où la limite du dénominateur est nulle

$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$	$L \neq 0$	∞	0
$\lim_{x \rightarrow a} g(x)$	0	0	0
$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$	∞	∞	F.I.

Dans les deux premiers cas, pour savoir de quel infini il s'agit, on doit étudier le signe du dénominateur.

Exemples :

Exemple 1 Étudions

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{3x - 2}{2x - 4}$$

Exemple 2 Étudions

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + x + 6}{2x^2 + x - 1}$$