MotzMex 01-403

(Progenitores: MY 54-64 X Co 467)

Campo Experimental Regional
Motzorongo, A.C.

Directrices de la Distinción, Homogeneidad y Estabilidad (UPOV / DHE)

1.- ASPECTO DE LA PLANTA: Porte semierecto (10-20% de inclinación), de copa abierta y medianamente densa, follaje de color verde obscuro.
2.- ENTRENUDO: Cilíndricos, muy ligeramente dispuestos en zigzag, color verde-claro cuando están cubiertos por la vaina y café amarillo cuando están expuestos al sol, capa fuerte de cera, longitud 12-16 cm y diámetro 2.5-3.0 cm. Puede presentar grietas en el primer tercio del tallo, canal de yema ancha y corta.
3.- NUDO: Delgado, banda de raíz obcónica, yema de forma ovalada abultada con alas, ligeramente pegada al anillo de crecimiento y despegada de la cicatriz foliar, de color amarillo-verdoso
4.- VAINA: Color verde con tintes morados, capa delgada de cera y pubescencia regular.
5.- LÁMINA FOLIAR: Conformación erecta con ápice curvado, con una longitud de 1.40-1.60 m y ancho de 4.0-6.0 cm, hojas de color verde obscuro.
6.- AURÍCULA: Deltoide, con pubescencia entre la unión de la lámina foliar y el collar.
7.- LÍGULA: En forma de cuarto creciente.
8.- COLLAR: Color verde, tipo cuadrada ligulada.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES: Rápida brotación, buen amacollamiento. De madurez media-tardía, no florece, resiste la sequía y suelos pobres (delgados). Se recomienda sembrarla desde junio-enero, ya que no sufre deterioro en cuanto a rendimiento de campo y fábrica. Se adapta a todo tipo de suelo y condiciones tanto húmeda como seca. Se recomienda cosechar de febrero en adelante. Llega a presentar una ligera susceptibilidad a la roya común en condiciones de sequía y también la mancha de anillo.



Comportamiento Agroindustrial


Zona Húmeda. Suelos ácidos acrisoles y nitosoles, con una precipitación media anual de 1,800 a 2,000 mm y a una altitud de 275 a 300 msnm.

Ciclo	Ton. Caña ha^{-1}	Ton. Azúcar h^{-1}	Sacarosa %	Fibra %
Planta	97.46	15.61	16.02	12.20
Soca	87.34	14.52	16.62	12.82
Resoca 1	77.85	12.92	16.64	11.83
Promedio	**87.55**	**14.36**	**16.43**	**12.28**

Zona Seca. Suelos feozem, arcillosos, con una precipitación media anual de 1,800 a 2,000 mm y a una altitud de 275 a 300 msnm.

Ciclo	Ton. Caña ha^{-1}	Ton. Azúcar h^{-1}	Sacarosa %	Fibra %
Planta	110.38	17.47	15.83	13.27
Soca	85.04	14.08	16.56	11.75
Resoca 1	97.15	16.10	16.57	12.35
Promedio	**97.52**	**15.88**	**16.32**	**12.46**

Curva de Madurez



NOTA. Curva de madurez obtenida por Pol-Ratio

Técnico De Campo

*M.C. Genaro Pantaleón Paulino

Mex 95-59


(Progenitores: SP 72-4790 X ?)

Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico
Para la Agroindustria Cañera de la Huasteca Potosina, A.C.
Campo Experimental El Estribo

Directrices de la Distinción, Homogeneidad y Estabilidad (UPOV / DHE)

1.- ASPECTO DE LA PLANTA: Porte abierto, con una inclinación de 10 a 20%, con un follaje medio de color obscuro.
2.- ENTRENUDO: Cóncavo convexo, débil, color verde obscuro cuando los entrenudos están expuestos al sol y verde obscuro cuando están protegidos por la vaina, con una longitud y diámetro promedio de 16.0 cm y 2.9 cm respectivamente.
3.- NUDO: La anchura de la zona radicular es mediana con un promedio de 8 mm, tipo de yema romboide, con una prominencia de la yema media, con una posición del ápice de la yema clasificado como intermedio.
4.- VAINA: Color del collar de la vaina es verde claro, longitud de la vaina mediana con un promedio de 36 cm, la lígula del tipo deltoide.
5.- LÁMINA FOLIAR: Presenta una curvatura con los ápices curvados, anchura del limbo en el punto medio considerado como mediano con 4.1 cm promedio, una longitud promedio del limbo de 1.45 m.
6.- AURÍCULA: La subyacente es del tipo transicional y la superpuesta lanceolada.
7.- LÍGULA: Tipo deltoide.
8.- COLLAR: Color verde claro.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES: Es una variedad rústica para condiciones de temporal y riego, responde bien bajo condiciones de temporal en la región de la Huasteca Potosina. Buen amacollo en plantas, socas y resocas, buen despaje natural, erecta, de maduración tardía, para cosecharse de marzo a abril, sin floración, con fecha de siembra adecuada en septiembre y octubre, buen rendimiento en campo de 131 a 108 ton/ha, y potencial 19.0 %de sacarosa.



Comportamiento Agroindustrial


Zona Húmeda: Suelos ácidos acrisoles, vertisoles y regosoles; a una altitud de 50 a 500 msnm, con una precipitación anual de 1424 mm, con variaciones de 975 a 1635 mm.

Ciclo	Ton. Caña ha^{-1}	Ton. Azúcar h^{-1}	Sacarosa %	Fibra %
Planta	131.53	19.14	16.69	11.41
Soca	108.86	17.22	16.81	12.13
Resoca 1	92.53	12.67	15.77	11.69
Promedio	**110.97**	**16.34**	**16.42**	**11.74**

Zona Seca: Suelos arcillosos, vertisoles y regosoles; a una altitud de 50 a 500 msnm, con una precipitación anual promedio de 1,100 mm, con variaciones de 975 a 1,200 mm.

Ciclo	Ton. Caña ha^{-1}	Ton. Azúcar h^{-1}	Sacarosa %	Fibra %
Planta	118.20	17.20	16.69	11.96
Soca	97.97	15.50	16.81	13.09
Resoca 1	83.28	13.41	15.77	12.32
Promedio	**97.97**	**15.37**	**16.42**	**12.46**

Curva de Madurez



NOTA. Curva de madurez obtenida por Pol-Ratio.

Técnicos De Campo

*Ing. Enrique López Rubio
*Ing. Iraís Salazar Gómez

Mex 94-8

(Progenitores: L 57-7 X SP 71-5574)

Campo Experimental Regional
INIFAP, Tecomán, Colima.

Directrices de la Distinción, Homogeneidad y Estabilidad (UPOV / DHE)

1.- ASPECTO DE LA PLANTA: Porte erecto, follaje abierto y copa ligeramente densa, de color verde fuerte, altura de tallo media (236-313 cm) y diámetro delgado (<2.94 cm), algunos tallos presentan estrías acorchadas bajo la cicatriz foliar y rajadura de crecimiento ausente o muy poca.
2.- ENTRENUDO: De forma cóncavo-convexo, expresión de la alineación en zigzag débil, color verde claro cuando están expuestos al sol y cuando están protegidos por la vaina, con una capa media de cera y rugosidad media.
3.- NUDO: Anchura de la zona radicular estrecha (<7.75 mm), de color amarillo verde, yema de forma ovada y prominencia media, con posición claramente por encima del anillo de crecimiento, su cojín estrecho.
4.- VAINA: De longitud mediana, con numerosos pelos de tamaño mediano, distribuidos en la parte dorsal y lateral.
5.- LÁMINA FOLIAR: De forma arqueada, longitud corta y anchura mediana, nervadura principal estrecha.
6.- AURÍCULA: La subyacente de tipo lanceolada y tamaño medio; la superpuesta de forma transicional y tamaño mediano aun que presenta algunas deltoides, pubescencia en la unión de la vaina con la lámina foliar.
7.- LÍGULA: De forma deltoide de tamaño ancho y con pubescencia densa y vellos cortos.
8.- COLLAR: Color café-amarillo.
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES: Variedad con excelente amacollamiento, muy buena población de tallos y buen soqueo, escasa floración; en siembra de otoño-invierno de ciclo planta puede cosecharse entre los 13 y 14 meses y de 16 a 18 en siembras de primavera-verano, se adapta a zonas con alturas de los 20 a 1200 msnm, con riego o temporal mayor a los 1100 mm anuales de lluvia bien distribuidos, pudiendo mejorar la producción con riegos de auxilio.



Producción Agroindustrial de la variedad Mex 94-8

Zona de Riego: Suelos arcillosos, arcillo-arenosos, y francos; riego rodado o de gravedad, a una altitud de a 900 msnm


Ciclo	Ton. Caña ha^{-1}	Ton. Azúcar h^{-1}	Sacarosa %	Fibra %
Planta	143.00	23.59	16.50	12.30
Soca	138.00	21.43	15.53	12.90
Resoca 1	116.00	19.55	16.86	12.40
Promedio	**132.00**	**21.52**	**16.29**	**12.53**

Zona Seca: Suelos arcillosos, arcillo-arenoso y francos; temporal mayor a 1100 mm, con riego de auxilio una altitud de 300 msnm;

Ciclo	Ton. Caña ha^{-1}	Ton. Azúcar h^{-1}	Sacarosa %	Fibra %
Planta	120.00	18.54	15.45	12.50
Soca	100.00	15.22	15.22	12.40
Resoca 1	95.00	14.47	15.24	12.76
Promedio	**105.00**	**16.07**	**15.30**	**12.55**

Contenido de sacarosa en caña, ciclo planta entre los 12 y 17 meses de edad, con riego a 900 msnm.

Curva de Madurez



NOTA. Curva de madurez obtenida por Pol-Ratio.

Técnicos De Campo

*M.C. Marcelino Álvarez Cilva
*M.C. Arturo Vizcaíno Guardado
*M.C. Jeovani Francisco Cervantes Preciado

Mex 96-35


(Progenitores: Mex 64-649 X Mex 79-431)

Centro Regional Tecnológico
de la Caña de Azúcar, ISP. A.C.

Directrices de la Distinción, Homogeneidad y Estabilidad (UPOV / DHE)

1.- ASPECTO DE LA PLANTA: Porte semierecto, follaje abierto y copa densa, color verde pálido.
2.- ENTRENUDO: Presenta algunas estrías en el tercio inferior, el color es amarillento verdoso, expuesta al sol es completamente amarillento, longitud 13 cm, diámetro 3.0 cm, ceroso opaco, negro, su forma es cilíndrica.
3.- NUDO: Banda de raíces abobinada, anillo ceroso delgado, yema separada de la cicatriz foliar, su forma es redonda con alas cangrejo, color amarillento, su tamaño es mediana abultada ocasionalmente toca el anillo de crecimiento.
4.- VAINA: Ligeramente verde, depósitos de cera delgados.
5.- LÁMINA FOLIAR: Erecta con el ápice curvado, tamaño medio 5.4 cm, color verde pálido.
6.- AURÍCULA: Lanceolada larga, presenta pubescencia o pelos entre la aurícula y la lámina.
7.- LÍGULA: Deltoide.
8.- COLLAR: Deltoide.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES: Es de buena germinación, amacollamiento temprano, excelente despaje, por lo que los tallos son amarillentos, dureza cortical media, floración escasa en plantilla floreció un 10% y en soca 7%, se adapta bien a los suelos areno arcillosos muy húmedos, se acama un poco con los vientos fuertes del norte propios de la región. Se clasifico como de maduración media. No se evaluó en zona seca por cambio de estrategia en la conducción del programa de variedades a la zona húmeda.




Comportamiento Agroindustrial

Zona Húmeda: Suelos areno-arcillosos, gleysoles, moderadamente ácidos, precipitación pluvial 2000 a 2500 mm.

Ciclo	Ton. Caña ha^{-1}	Ton. Azúcar h^{-1}	Sacarosa %	Fibra %
Planta	163.00	22.57	13.85	10.70
Soca	101.00	15.11	14.97	11.40
Resoca 1	125.00	17.84	13.87	12.90
Promedio	**129.60**	**18.51**	**14.23**	**11.66**

Curva de Madurez



NOTA. Curva de madurez obtenida por Pol-Ratio, ajustada con la fórmula Rendimiento de Azúcar Teórico (RAT).

Técnico De Campo

*T.A. Virgilio Alvarado Mondragón

Mex 91-662

(Progenitores: Mex 74-1903 X ?)

Asociación para la Mejora de la Caña de Azúcar, La Gloria, A.C.

Directrices de la Distinción, Homogeneidad y Estabilidad (UPOV / DHE)

1.- ASPECTO DE LA PLANTA: El porte de la planta es semipostrado (>30° y <45° de inclinación), con el follaje abierto, denso y de color verde medio.
2.- ENTRENUDO: De forma cóncavo-convexo, moderadamente dispuestos en zigzag. Color amarillo verde cuando no están expuestos al sol (cubiertos por las vainas) y verde obscuro cuando están expuestos, con una fuerte presencia de cera de color negro y blanco, de longitud y diámetro promedio 10-12 cm y 2.5-3.0 cm respectivamente, los entrenudos presentan poca protuberancia, rajaduras de crecimiento poco profundas y el canal de la yema poco profundo y corto.
3.- NUDO: Tamaño mediano, banda de raíz cilíndrica, yema oval, con el poro germinal central abultado, ocasionalmente toca el anillo de crecimiento.
4.- VAINA: Color verde, capa delgada de cera y pocos ahuates. Presenta despaje regular.
5.- LÁMINA FOLIAR: Hojas rectas, de anchura media y de color verde medio o normal.
6.- AURÍCULA: Forma transicional, con pubescencia media en la unión de la vaina con la lámina foliar.
7.- LÍGULA: Simétrica horizontal.
8.- COLLAR: Color verde café, del tipo deltoide descendente.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES: Durante el proceso de selección supero al testigo (CP 72-2986) en sacarosa. Es de regular germinación, excelente amacollamiento en plantilla, soca y resocas. Es de madurez media-tardía y no florece. Se adapta a condiciones de riego y de temporal en todos los tipos de suelos y clima. La mejor época de siembra es de julio-octubre, para cosechar de 15 a 16 meses, de enero en adelante. Es muy susceptible a la enfermedad mancha de ojo en las zonas húmedas.




Comportamiento Agroindustrial

Zona Húmeda: Suelos franco-arenoso, precipitaciones de los 900 a los 1,000 mm/año. Seleccionada a 54 msnm.

Ciclo	Ton. Caña ha^{-1}	Ton. Azúcar h^{-1}	Sacarosa %	Fibra %
Planta	136.78	18.11	15.08	15.39
Soca	100.90	12.90	14.48	15.07
Resoca 1	94.06	12.66	15.05	14.76
Promedio	**110.58**	**14.55**	**14.87**	**15.07**


Curva de Madurez



Zona Seca: Suelos arcillosos, precipitaciones de los 900 a los 1,000 mm/año. Se selecciona a 54 msnm.

Ciclo	Ton. Caña ha^{-1}	Ton. Azúcar h^{-1}	Sacarosa %	Fibra %
Planta	133.97	15.70	13.31	15.62
Soca	101.10	13.29	14.77	14.99
Resoca 1	94.69	12.56	14.83	14.79
Promedio	**109.62**	**13.97**	**14.31**	**15.13**

Curva de Madurez



NOTA. Curvas de madurez obtenidas por Pol-Ratio, ajustadas con la fórmula Rendimiento de Azúcar Teórico (RAT).

Técnicos De Campo

*Ing. José Francisco Rubio Ibarra
*Ing. Diego Raúl Benita Torres

LTMex 94-2


(Progenitores: CP 72-2086 X ?)

Centro Regional Tecnológico
de la Caña de Azúcar, ISP. A.C.

Directrices de la Distinción, Homogeneidad y Estabilidad (UPOV / DHE)

1.- ASPECTO DE LA PLANTA: Porte semierecto, con el follaje erecto y copa poco densa. Hojas de color poco pálido.
2.- ENTRENUDO: Banda de raíces cilíndrica, color morado verduzco expuesto al sol, longitud promedio 11.3 cm, diámetro medio a grueso 2.9 cm., capa delgada de cera con tintes obscuros-blanquizcos.
3.- NUDO: Es medio a grueso. Yema de forma ovalada a angosta, color amarillo verdusco, con alas, poco abultada tamaño pequeñas.
4.- VAINA: Ligera morada. Cera depósitos delgados.
5.- LÁMINA FOLIAR: Erectas, de anchura media 5.2 cm. Color Pálido.
6.- AURÍCULA: Transitoria ascendente, ocasionalmente lanceolada corta.
7.- LÍGULA: Tipo deltoide.
8.- COLLAR: Color café obscuro, deltoide.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES: Presenta buena germinación, es un poco tardía cuando no se pela la semilla, cierre de campo tardío por lo erecto de las hojas, los fuertes vientos la inclinan pero no se quiebran los tallos, floración ausente, es de maduración media, se adapta mejor en suelos bajos y húmedos con precipitaciones entre los 2000 a 2500 mm anuales. Por lo que se recomienda sembrarla en este mismo tipo de suelos, fecha de siembra debe de ser entre Noviembre y Diciembre.



Técnico De Campo


*T.A. Virgilio Alvarado Mondragón

Comportamiento Agroindustrial

Zona Húmeda: Suelos areno-arcillosos, gleysoles, moderadamente ácidos precipitación pluvial 2000 a 2500 mm.

Ciclo	Ton. Caña ha^{-1}	Ton. Azúcar h^{-1}	Sacarosa %	Fibra %
Planta	150.00	18.36	12.24	11.63
Soca	117.00	14.51	12.40	12.40
Resoca 1	113.00	14.24	12.61	13.89
Promedio	**131.50**	**16.30**	**12.42**	**12.76**


Curva de Madurez



Zona Seca: Suelos arcillosos, vertisoles, ligeramente ácidos, precipitación pluvial 1000 a 1500 mm.

Ciclo	Ton. Caña ha^{-1}	Ton. Azúcar h^{-1}	Sacarosa %	Fibra %
Planta	84.00	11.25	13.39	13.56
Soca	79.00	11.21	14.20	14.20
Resoca 1	73.00	10.13	13.88	13.30
Promedio	**78.60**	**10.86**	**13.82**	**13.68**

Curva de Madurez



NOTA. Curvas de madurez obtenidas por Pol-Ratio, ajustadas con la fórmula Rendimiento de Azúcar Teórico (RAT).

Mex 97-20

(Progenitores: Mex 65-1418 X CP 72-2086)

Centro Experimental Regional
San Cristóbal, A.C.

Directrices de la Distinción, Homogeneidad y Estabilidad (UPOV / DHE)

1.- ASPECTO DE LA PLANTA: Porte recto, follaje cerrado y denso, de color verde claro.
2.- ENTRENUDO: Cilíndrico arreglados en zigzag color verde con matices negros y capa delgada de cera, de longitud y diámetro promedio entre 11-12 y 2.9 cm., respectivamente. Presenta grietas a lo largo del entrenudo. No presenta canal de la yema.
3.- NUDO: Obcónico, con la banda de raíz de forma obcónica, la yema es redonda con poro germinal ligeramente abultado, no rebasa el anillo de crecimiento, tamaño pequeño, despegada de la cicatriz foliar y color verde intenso.
4.- VAINA: Color verde pálido con tintes violáceos, capa delgada de cera y regular pubescencia.
5.- LÁMINA FOLIAR: Conformación erecta con una longitud y ancho de 1.51 m y 6.6 cm., respectivamente, color verde intenso, ligeramente erectas que doblan en la punta.
6.- AURÍCULA: Es del tipo dental, con pubescencia en la unión de la vaina con la lámina foliar.
7.- LÍGULA: Tipo arqueada.
8.- COLLAR: Color verde cafesoso del tipo deltoide rectangular.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES: Buen amacollamiento en plantilla y regular en socas y resocas,. Es de madurez media y florece muy poco. Esta variedad se recomienda sembrarla en el área de abastecimiento del ingenio, debido a que se despobla y en algunas zonas presenta grietas a lo largo del entrenudo. En el transcurso de 4 cosechas su despoblación es de un 50 %.




Comportamiento Agroindustrial

Zona Seca; bajo condiciones de temporal de clima cálido húmedo, con una temperatura media anula de 25°C y una máxima de 40°C. Suelos vertisoles, gleysoles, luvisoles y feozem.

Variedad	Ciclo	Ton. ha^{-1}	Ton. Azúcar h^{-1}	Sacarosa %	Fibra %
Mex 97-20	Resoca	57.40	6.518	15.85	14.94
	Promedio	**57.40**	**6.518**	**15.85**	**14.94**

Curva de Madurez



NOTA. Curva de madurez obtenida por Pol-Ratio, ajustada con la fórmula Rendimiento de Azúcar Teórico (RAT).

Técnicos De Campo

*Ing. G. Ignacio Canseco Aguilar †
*Ing. Gilberto González González
*Ing. Manuel Castillo Mora
*M.C. Eligio Nieto Pesellín

ICPMex 92-1420

(Progenitores: CP 59-22 x ?)

Centro Experimental Regional
San Cristóbal, A. C.

Directrices de la Distinción, Homogeneidad y Estabilidad (UPOV / DHE)

1.- ASPECTO DE LA PLANTA: Porte semierecto (10-45% de inclinación), follaje semi-abierto, copa densa, de color verde obscuro.
2.- ENTRENUDO: Cilíndricos, de color verde con una capa de cera, expuestos al sol los entrenudos se tornan de color amarillo. Longitud de 14 a 15 cm y diámetro entre y 2.8 a 3.0 cm. No presenta grietas ni canal de la yema.
3.- NUDO: Mediano, con la banda de raíz obcónica. Yema de forma redonda, pequeña y abultada, pegada a la cicatriz foliar sin tocar el anillo de crecimiento, es de color verde obscuro.
4.- VAINA: Color verde claro con tintes morados, presenta una capa delgada de cera y sin ahuates o pubescencia.
5.- LÁMINA FOLIAR: Conformación decumbente (arqueada), con una longitud promedio de 1.53 m y anchura de 5.1 cm y color verde claro.
6.- AURÍCULA: Es del tipo lanceolada corta, con pubescencia entre la unión de la vaina con la lámina foliar.
7.- LÍGULA: Del tipo creciente.
8.- COLLAR: Color verde claro y de forma rectangular obcónica.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

Excelente amacollamiento en plantilla, soca y resocas. Es de madurez media y florece poco. En zonas altas e intermedias sembrar en noviembre y diciembre, para cosecharse en marzo o abril de 15-16 meses para lograr su mejor potencial de rendimiento agroindustrial. Esta variedad se recomienda sembrarla en suelos con buen drenaje y disponibilidad de agua. No ubicar esta variedad en suelos de mal drenaje y alta humedad relativa, ya que pueden ocasionar la aparición de carbón.




Comportamiento Agroindustrial

Condiciones de temporal, clima cálido sub-húmedo, suelos vertisoles, gleysoles, luvisoles y feozem. Precipitación anual de 1,500 mm, a una altitud de 6 a 20 msnm.

Ciclo	Ton. Caña ha^{-1}	Ton. Azúcar h^{-1}	Sacarosa %	Fibra %
Planta	72.20	11.17	15.47	14.87
Soca	62.75	9.41	15.00	14.29
Resoca 1	52.97	8.00	15.10	14.36
Promedio	**62.64**	**9.52**	**15.19**	**14.50**

La justificación de su liberación en su momento, es debido a su altura 3.0 a 3.5 mts., diámetro de 2.5 a 3.0 cms., erecta, de buen despaje, oquedad de consistencia solida., alto contenido de sacarosa, muy buena pureza, Tolerante a la cosecha manual y mecánica.

Curva de Madurez



NOTA. Curva de madurez obtenida por Pol-Ratio, ajustada con la fórmula Rendimiento de Azúcar Teórico (RAT).

Técnicos de Campo

*Ing. G. Ignacio Canseco Aguilar †
*Ing. Gilberto González González
*Ing. Manuel Castillo Mora
*M. C. Eligio Nieto Pesellín