

# Logika pre informatikov a Úvod do matematickej logiky

Poznámky z prednášok

Ján Kl'uka, Ján Mazák

Letný semester 2022/2023

Posledná aktualizácia: 13. marca 2023

## Obsah

<b>P1 Úvod. Atomické formuly</b>	<b>3</b>
<b>0 Úvod</b>	<b>3</b>
0.1 O logike . . . . .	3
0.2 O kurze . . . . .	11
<b>1 Atomické formuly</b>	<b>11</b>
1.1 Syntax atomických formúl . . . . .	16
1.2 Sémantika atomických formúl . . . . .	19
1.3 Zhrnutie . . . . .	24

<b>P2</b>	<b>Výrokovologické spojky</b>	<b>25</b>
<b>2</b>	<b>Výrokovologické spojky</b>	<b>25</b>
2.1	Boolovské spojky . . . . .	26
2.2	Implikácia . . . . .	31
2.3	Ekvivalencia . . . . .	34
2.4	Syntax výrokovologických formúl . . . . .	35
2.5	Sémantika výrokovologických formúl . . . . .	43
2.6	Teórie a ich modely . . . . .	45
2.7	Správnosť a vernosť formalizácie . . . . .	47
<b>P3</b>	<b>Výrokovologické vyplývanie</b>	<b>49</b>
<b>3</b>	<b>Výrokovologické vyplývanie</b>	<b>49</b>
3.1	Výrokovologické ohodnotenia . . . . .	50
3.2	Výrokovologické teórie a modely . . . . .	55
3.3	Vyšplývanie, nezávislosť a nesplniteľnosť . . . . .	56
<b>P4</b>	<b>Vlastnosti a vzťahy výrokovologických formúl</b>	<b>65</b>
<b>4</b>	<b>Vlastnosti a vzťahy výrokovologických formúl</b>	<b>65</b>
4.1	Tautológie, splniteľné, falzifikovateľné a nesplniteľné formuly . . . . .	65
4.2	Ekvivalencia . . . . .	72
4.3	Vzťah tautológií, vyplývania a ekvivalencie . . . . .	76
4.4	Ekvivalentné úpravy a CNF . . . . .	78
<b>P5</b>	<b>Dôkazy a výrokovologické tablá</b>	<b>84</b>
<b>5</b>	<b>Dôkazy a výrokovologické tablá</b>	<b>84</b>
5.1	Druhy dôkazov . . . . .	87
5.2	Výrokovologické tablá . . . . .	89

## 1. prednáška

# Úvod

## Atomické formuly

---

### 0 Úvod

#### 0.1 O logike

##### Čo je logika

Logika je vedná disciplína, ktorá študuje usudzovanie.

Správne, racionálne usudzovanie je základom vedy a inžinierstva.

Vyžaduje rozoznať správne úsudky z predpokladaných princípov a pozorovania od chybných úvah a špekulácií.

Správnosť úsudkov, zdá sa, nie je iba vec konvencie a dohody.

Logika skúma, *aké* sú zákonitosti správneho usudzovania a *prečo* sú zákonitosťami.

##### Ako logika študuje usudzovanie

Logika má dva hlavné predmety záujmu:

**Jazyk** zápis pozorovaní, definície pojmov, formulovanie teórií

*Syntax* pravidlá zápisu tvrdení

*Sémantika* význam tvrdení

**Usudzovanie (inferencia)** odvodzovanie nových *logických dôsledkov* z doterajších poznatkov. Aký má vzťah s jazykom, štruktúrou tvrdení?

##### Jazyk, poznatky a teórie

*Jazyk* slúži na formulovanie tvrdení, ktoré vyjadrujú poznatky o svete (princípy jeho fungovania aj pozorované fakty).

Súboru poznatkov, ktoré považujeme za pravdivé, hovoríme *teória*.

*Príklad 0.1 (Party time!).* Máme troch nových známych — Kim, Jima a Sarah. Organizujeme párty a P0: chceme na ňu pozvať niekoho z nich. Od spoločných kamarátov sme sa ale dozvedeli o ich požiadavkách:

P1: Sarah nepôjde na párty, ak pôjde Kim.

P2: Jim pôjde na párty, len ak pôjde Kim.

P3: Sarah nepôjde bez Jima.

### Možné stavy sveta a modely

Jedna z otázok, ktoré si o teórii o party môžeme položiť, je: „V akých zostavách môžu noví známi prísť na párty tak, aby boli všetky podmienky splnené?“

Priamočiaro (aj keď pracne) to zistíme tak, že:

1. vymenujeme *všetky možné stavy sveta* (účasti nových známych),
2. zistíme, v ktorých sú všetky podmienky splnené.

K	J	S	P0	P1	P2	P3	
n	n	n	n				P0: Niekoľko z Kim, Jima, Sarah príde na párty.
n	n	p	p	p	p	n	P1: Sarah nepôjde na párty, ak pôjde Kim.
n	p	n	p	p	n		
n	p	p	p	p	n		P2: Jim pôjde na párty, len ak pôjde Kim.
p	n	n	p	p	p	p	
p	n	p	p	n			
p	p	n	p	p	p	p	P3: Sarah nepôjde bez Jima.
p	p	p	p	n			

### Možné stavy sveta a modely


Teória rozdeľuje *možné stavy sveta* (interpretácie) na:

✔ stavy, v ktorých je pravdivá — *modely* teórie,

✘ stavy, v ktorých je nepravdivá.

Tvrdenie aj teória môžu mať viacero modelov, ale aj žiaden.


*Príklad 0.2.* Modelmi teórie P0, P1, P2, P3 sú dve situácie: keď Kim príde na párty a ostatní noví známi nie, a keď Kim a Jim prídu na párty a Sarah nie.



## Logické dôsledky

Často je zaujímavá iná otázka o teórii — musí byť nejaké tvrdenie pravdivé vždy, keď je pravdivá teória?

V našom prípade: Kto *musí* a kto *nesmie* prísť na párty, aby boli podmienky  $P_0, \dots, P_3$  splnené?



## Logické dôsledky

Logickými dôsledkami teórie sú tvrdenia, ktoré sú pravdivé vo všetkých modeloch teórie.

Príklad 0.3. Logickými dôsledkami teórie  $P_0, P_1, P_2, P_3$  sú napríklad:

- *Kim príde na párty.*
- *Sarah nepríde na párty.*

Logických dôsledkov je nekonečne veľa, môžu nimi byť ľubovoľne zložité tvrdenia:

- Na party príde Kim alebo Jim.

- Ak príde Sarah, tak príde aj Jim.
- Ak príde Jim, tak nepríde Sarah.
- 

### Logické usudzovanie

Preskúmať všetky stavy sveta je často nepraktické až nemožné.

Logické dôsledky ale môžeme *odvodzovať usudzovaním (inferovať)*.

Pri odvodení vychádzame z *premís* (predpokladov) a postupnosťou *správnych úsudkov* dospievame k *záverom*.

*Príklad 0.4.* Vieme, že ak na párty pôjde Kim, tak nepôjde Sarah (P1), a že ak pôjde Jim, tak pôjde Kim (P2).

1. Predpokladajme, že na párty pôjde Jim.
2. Podľa 1. a P2 pôjde aj Kim.
3. Podľa 2. a P1 nepôjde Sarah.

Teda podľa uvedenej úvahy: Ak na párty pôjde Jim, tak nepôjde Sarah.

### Dedukcia

Úsudok je správny (*korektný*) vtedy, keď *vždy*, keď sú pravdivé jeho premisy, je pravdivý aj jeho záver.

Ak sú všetky úsudky v odvodení správne, záver *je logickým dôsledkom* premís a odvodenie je jeho *dôkazom* z premís.

*Dedukcia* je usudzovanie, pri ktorom sa používajú iba správne úsudky.

Logika študuje dedukciu, ale aj niektoré nededuktívne úsudky, ktoré sú *vo všeobecnosti* nesprávne, ale sú správne v *špeciálnych* prípadoch alebo sú *užitočné*:

- indukcia — zovšeobecnenie;
- abdukcia — odvodzovanie možných príčin z následkov;
- usudzovanie na základe analógie (podobnosti).

## Kontrapríklady

Ak úsudok nie je správny, vieme nájsť *kontrapríklad* — stav sveta, v ktorom sú *predpoklady pravdivé*, ale *záver je nepravdivý*.

*Príklad 0.5.* Nesprávny úsudok: Ak platia tvrdenia teórie o party, na party príde Jim.

Kontrapríklad: Stav, kedy príde Kim, nepríde Jim, nepríde Sarah.

Teória je pravdivá, výrok „na party príde Jim“ nie je pravdivý.

## Matematická logika

### *Matematická logika*

- modeluje jazyk, jeho sémantiku a usudzovanie ako matematické objekty (množiny, postuposti, zobrazenia, stromy);
- rieši logické problémy matematickými metódami.

Rozvinula sa koncom 19. a v prvej polovici 20. storočia vďaka snahám vybudovať základy matematiky bez sporov a paradoxov, mechanizovať overovanie dôkazov alebo priamo matematických viet.

## Matematická logika a informatika

Informatika sa vyvinula z matematickej logiky (von Neumann, Turing, Church, ...)

Väčšina *programovacích jazykov* obsahuje logické prvky:

- $\text{all}(x > m \text{ for } x \text{ in } \text{arr})$ ,

fragmenty niektorých sú priamo preložiteľné na logické formuly:

- $\text{select } T1.x, T2.y \text{ from } T1 \text{ inner join } T2 \text{ on } T1.z = T2.z \text{ where } T1.z > 25$ ,

niektoré (Prolog) sú podmnožinou logických jazykov.

Metódami logiky sa dá *presne špecifikovať*, čo má program robiť, *popísať*, čo robí, a *dokázať*, že robí to, čo bolo špecifikované.

Vo *výpočtovej logike* a umelej inteligencii sa metódy logiky používajú na riešenie rôznych ťažkých problémov (plánovanie, rozvrh, hľadanie a overovanie dôkazov matematických tvrdení, hľadanie vysvetlení, ...).

## Matematická logika a informatika

Veľa otázok v logike je *algoritmických*.

- Možno usudzovanie pre danú triedu jazykov automatizovať?
- Dá sa nájsť dôkaz pre tvrdenia s takouto štruktúrou dostatočne rýchlym algoritmom?

Logika umožňuje hľadať všeobecné odpovede.

- Ak možno vlastnosť grafu popísať *prvorádovou formulou s najviac dvomi kvantifikátormi* a zároveň ..., existuje pomerne rýchly algoritmus, ktorý rozhodne, či daný graf túto vlastnosť má.

*Automatizované dokazovače*: napr. v r. 1996 počítač dokázal Robbins Conjecture, ktorá odolávala ľudskej snahe 60 rokov.

## Formálne jazyky a formalizácia

Matematická logika nepracuje s prirodzeným jazykom, ale s jeho zjednodušenými modelmi — *formálnymi jazykmi*.

- Presne definovaná, zjednodušená syntax a sémantika.
- Obchádzajú problémy prirodzeného jazyka:  
viacznačnosť slov, nejednoznačné syntaktické vzťahy, zložitá syntaktickú analýzu, výminky, obraty s ustáleným významom, ...
- Niekoľko formálnych jazykov už poznáte: aritmetika, jazyky fyzikálnych a chemických vzorcov, programovacie jazyky, ...

Problémy z reálneho sveta opísané v prirodzenom jazyku musíme najprv *sformalizovať*, a potom naň môžeme použiť aparát matematickej logiky.

Formalizácia vyžaduje cvik — trocha veda, trocha umenie.

## Ťažkosti s prirodzeným jazykom

*Prirodzený jazyk* je problematický:

- Viacznačné slová: Milo *je* v posluchárni A.



- Viacznačné tvrdenia: Videl som dievča v sále s *d'alekohl'adom*.
- Ťažko syntakticky analyzovateľné tvrdenia:

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome prijímajú rozhodnutia na schôdzi vlastníkov dvojtreťinovou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak hlasujú o zmluve o úvere a o každom dodatku k nej, o zmluve o zabezpečení úveru a o každom dodatku k nej, o zmluve o nájme a kúpe veci, ktorú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome užívajú s právom jej kúpy po uplynutí dojednaného času užívania a o každom dodatku k nej, o zmluve o vstavbe alebo nadstavbe a o každom dodatku k nim, o zmene účelu užívania spoločných častí domu a spoločných zariadení domu a o zmene formy výkonu správy; ...

— Zákon č. 182/1993 Z. z. SR v znení neskorších predpisov

- Výnimky a obraty so špeciálnym ustáleným významom: *Nikto nie je dokonalý*.

### Formalizácia poznatkov

S formalizáciou ste sa už stretli — napríklad pri riešení slovných úloh:

Karol je trikrát starší ako Mária.

Súčet Karolovho a Máriinho veku je 12 rokov.

Koľko rokov majú Karol a Mária?

$$\rightsquigarrow k = 3 \cdot m$$

$$k + m = 12$$

Stretli ste sa už aj s formálnym jazykom výrokovej logiky.

*Príklad 0.6.* Sformalizujme náš párty príklad:


P0: Nieкто z trojice Kim, Jim, Sarah pôjde na párty.

P1: Sarah nepôjde na párty, ak pôjde Kim.

P2: Jim pôjde na párty, len ak pôjde Kim.

P3: Sarah nepôjde bez Jima.

### Schéma riešenia problémov pomocou logiky



## Logika prvého rádu

*Jazyk logiky prvého rádu* (FOL) je jeden zo základných formálnych jazykov, ktorým sa logika zaoberá.

Do dnešnej podoby sa vyvinul koncom 19. a v prvej polovici 20. storočia — G. Frege, G. Peano, C. S. Peirce.

Výrokové spojky + *kvantifikátory*  $\forall$  a  $\exists$ .

Dá sa v ňom vyjadriť veľa zaujímavých tvrdení, bežne sa používa v matematike.

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \dots$$

## Kalkuly — formalizácia usudzovania

Pre mnohé logické jazyky sú známe *kalkuly* — množiny usudzovacích pravidiel, ktoré sú

**korektné** — odvodzujú iba logické dôsledky,

**úplné** — umožňujú odvodiť všetky logické dôsledky.

Kalkuly sú bežné v matematike

- na počítanie s číslami, zlomkami (kalkul elementárnej aritmetiky),
- riešenie lineárnych rovníc (kalkul lineárnej algebry),
- derivovanie, integrovanie, riešenie diferenciálnych rovníc (kalkul matematickej analýzy)

⋮

Sú korektné, ale nie vždy úplné.

Poznáte už aj jeden logický kalkul — ekvivalentné úpravy.

## 0.2 O kurzoch LPI a UdML

### Prístup k logike na tomto predmete

Stredoškolský prístup príliš *neoddeľuje jazyk* výrokov od jeho *významu* a vlastne ani jednu stránku *redefinuje jasne*.

Prevedieme vás základmi matematickej a výpočtovej logiky pre (postupne čoraz zložitejšie) fragmenty jazykov logiky prvého rádu.

Pojmy z logiky (výrok, model, logický dôsledok, dôkaz, ...) budeme *definovať matematicky* (ako množiny, postupnosti, funkcie, ...) *zdanlivo* budeme o jednoduchých veciach hovoriť zložito, na praktických cvičeniach ako *dátové štruktúry*.

Budeme *dokazovať* ich vlastnosti a *programovať* algoritmy podľa konštruktívnych dôkazov.

Budeme vyjadrovať výpočtové problémy v logických jazykoch a hľadať ich riešenia pomocou hotových nástrojov na riešenie logických problémov.

### Organizácia kurzu — rozvrh, kontakty, pravidlá

Organizácia predmetu — rozvrh, kontakty a pravidlá absolvovania — sú popísané na oficiálnej webovej stránke predmetov:

**1-AIN-412** [https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Logic\\_for\\_CS](https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Logic_for_CS)

**1-INF-210** <http://www.dcs.fmph.uniba.sk/~mazak/vyucba/udml/>

## 1 Atomické formuly

### Jazyky logiky prvého rádu

Logika prvého rádu je trieda (rodina) formálnych jazykov.

Zdieľajú:

- časti abecedy — *logické symboly* (spojky, kvantifikátory)

- pravidlá tvorby *formúl* (slov)

Líšia sa v *mimologických symboloch* — časť abecedy, pomocou ktorej sa tvoria najjednoduchšie — *atomické formuly* (*atómy*).

### Atomické formuly a výroky v prirodzenom jazyku

Atomické formuly logiky prvého rádu zodpovedajú *pozitívnym jednoduchým vetám* o vlastnostiach, stavoch, vzťahoch a rovnosti *jednotlivých pomenovaných objektov*.

*Príklady 1.1.*

- ✓ Milo beží.
- ✓ Jarka vidí Mila.
- ✗ Milo beží, ale Jarka ho nevidí.
- ✗ Jarka vidí všetkých.
- ✓ Jarka dala Milovi Bobíka v sobotu.
- ✗ Jarka nie je doma.
- ✗ Nieкто je doma.
- ✓ Súčet 2 a 2 je 3.
- ✓ Prezidentkou SR je Zuzana Čaputová.

### Individuové konštanty

*Individuové konštanty* sú symboly jazyka logiky prvého rádu, ktoré pomenúvajú jednotlivé, pevne zvolené objekty.

Zodpovedajú *približne* vlastným menám, jednoznačným pomenovaniám, niekedy zámenám; konštantám v matematike a programovacích jazykoch.

*Príklady 1.2.* Jarka, 2, Zuzana\_Čaputová, sobota,  $\pi$ , ...

## Individuové konštanty a objekty

### Individuová konštantá

- vždy pomenúva skutočný, existujúci objekt (na rozdiel od vlastného mena *Zeus*);
- nikdy nepomenúva viac objektov (na rozdiel od vlastného mena *Jarka*).

### Objekt

- *môže* byť pomenovaný aj *viacerými* individuovými konštantami (napr. Prezidentka\_SR a Zuzana\_Čaputová);
- *nemusí* mať žiadne meno.

## Predikátové symboly

*Predikátové symboly* sú symboly jazyka logiky prvého rádu, ktoré vyjadrujú vlastnosti alebo vzťahy.

Jednoduché vety v slovenčine majú *podmetovú* (*subjekt*) a *prísudkovú* časť (*predikát*):

Jarka	vidí	Mila.
podmet	prísudok	predmet
podmetová časť	prísudková časť	

Do logiky prvého rádu prekladáme takéto tvrdenie pomocou predikátového symbolu *vidí*, ktorý má dva *argumenty* („podmety“): individuové konštanty Jarka a Milo.

Úloha argumentu v predikáte je daná jeho poradím (podobne ako poziché argumenty funkcií/metód v prog. jazykoch).

## Arita predikátového symbolu

Predikátový symbol má pevne určený počet argumentov — *aritu*.

*Vždy* musí mať práve toľko argumentov, aká je jeho arita.

*Dohoda 1.3.* Aritu budeme *niekedy* písať ako horný index symbolu. Napríklad  $beží^1$ ,  $vidí^2$ ,  $dal^4$ ,  $<^2$ .

## Zamýšľaný význam predikátových symbolov

Unárny predikátový symbol (teda s aritou 1) zvyčajne označuje *vlastnosť*, druh, rolu, stav.

Príklady 1.4.     $\text{pes}(x)$      $x$  je pes  
                   $\text{čierne}(x)$      $x$  je čierne  
                   $\text{beží}(x)$      $x$  beží

Binárny, ternárny, ... predikátový symbol (s aritou 2, 3, ...) zvyčajne označuje *vzťah* svojich argumentov.

Príklady 1.5.     $\text{vidí}(x, y)$              $x$  vidí  $y$   
                   $\text{dal}(x, y, z, t)$      $x$  dal(a/o) objektu  $y$  objekt  $z$  v čase  $t$

## Kategorickosť významu predikátových symbolov

V bežnom jazyku často nie je celkom jasné, či objekt má alebo nemá nejakú vlastnosť — kedy je niekto *mladý*?

Predikátové symboly predstavujú *kategorické* vlastnosti/vzťahy — pre každý objekt sa dá *jednoznačne rozhodnúť*, či má alebo nemá túto vlastnosť/vzťah s iným objektom či inými objektmi.

Význam predikátového symbolu preto často zodpovedá rovnakému slovenskému predikátu iba približne.

Príklad 1.6. Predikát mladší<sup>2</sup> môže označovať vzťah „ $x$  je mladší ako  $y$ “ presne.

Predikát mladý<sup>1</sup> zodpovedá vlastnosti „ $x$  je mladý“ iba približne.

Nekategorickými vlastnosťami sa zaoberajú *fuzzy* logiky. Predikáty v nich zachytávajú význam týchto vlastností presnejšie.

## Atomické formuly

Atomické formuly majú tvar

$$\text{predikát}(\text{argument}_1, \text{argument}_2, \dots, \text{argument}_k),$$

alebo

$$\text{argument}_1 \doteq \text{argument}_2,$$

pričom  $k$  je arita predikátu, a  $\text{argument}_1, \dots, \text{argument}_k$  sú (nateraz) individuové konštanty.

Atomická formula zodpovedá (jednoduchému) výroku v slovenčine, t.j. tvrdeniu, ktorého *pravdivostná hodnota* (pravda alebo nepravda) sa dá jednoznačne určiť, lebo predikát označuje kategorickú vlastnosť/vzťah a individuové konštanty jednoznačne označujú objekty.

### Formalizácia jednoduchých výrokov

*Formalizácia* je preklad výrokov z prirodzeného jazyka do formálneho logického jazyka.

*Nie je to jednoznačný proces.*

*Vopred daný* prvorádový jazyk (konštanty a predikáty) sa snažíme využiť čo najlepšie.

*Príklad 1.7.* Sformalizujme v jazyku s konštantami Evka, Jarka a Milo a predikátom vyšší<sup>2</sup> výroky:

$A_1$ : Jarka je vyššia ako Milo.  $\rightsquigarrow$  vyšší(Jarka, Milo)

$A_2$ : Evka je nižšia ako Milo.  $\rightsquigarrow$  vyšší(Milo, Evka)

Zanedbávame nepodstatné detaily — pomocné slovesá, predložky, skloňovanie, rod, ...:  $x$  je vyšší/vyššia/vyššie ako  $y \rightsquigarrow$  vyšší( $x, y$ ).

### Návrh jazyka pri formalizácii

Formalizácia spojená s *návrhom vlastného jazyka* je *iteratívna*: Postupne zisťujeme, aké predikáty a konštanty potrebujeme, upravujeme predchádzajúce formalizácie.

*Príklady 1.8.*  $A_1$ : Jarka dala Milovi Bobíka.

$\rightsquigarrow$  ~~d(Jarka)~~ ~~dalBobíka(Jarka, Milo)~~ dal(Jarka, Milo, Bobík)

$A_2$ : Evka dostala Bobíka od Mila.

$\rightsquigarrow$  ~~dalBobíka(Milo, Evka)~~ dal(Milo, Evka, Bobík)

$A_3$ : Evka dala Jarke Cilku.

$\rightsquigarrow$  ~~dalCilku(Evka, Jarka)~~ dal(Evka, Jarka, Cilka)

$A_4$ : Bobík je pes.

$\rightsquigarrow$  pes(Bobík)

## Návrh jazyka pri formalizácii

Minimalizujeme počet predikátov, uprednostňujeme flexibilnejšie, viacúčelovejšie (dal<sup>3</sup> pred dalBobíka<sup>2</sup> a dalCilkú<sup>2</sup>).

Dosiahneme

- expresívnejší jazyk (vyjadrí viac menším počtom prostriedkov),
- zrejmejšie logické vzťahy výrokov.

Podobné normalizácii databázových schém.

### 1.1 Syntax atomických formúl

#### Presné definície

Cieľom logiky je uvažovať o jazyku, výrokoch, vyplývaní, dôkazoch.

Výpočtová logika sa snaží automaticky riešiť konkrétne problémy vyjadrené v logických jazykoch.

Spôľahlivé a overiteľné úvahy a výpočty vyžadujú *presnú* dohodu na tom, o čom hovoríme — *definíciu* logických pojmov (jazyk, výrok, pravdivosť, ...).

Pojmy (napr. *atomická formula*) môžeme zdefinovať napríklad

- *matematicky* ako množiny,  $n$ -tice, relácie, funkcie, postupnosti, ...;
- *informaticky* tým, že ich *naprogramujeme*, napr. zdefinujeme triedu `AtomickaFormula` v Pythone.

Matematický jazyk je univerzálnejší ako programovací — abstraktnejší, menej nie až tak podstatných detailov.

#### Syntax atomických formúl logiky prvého rádu

Najprv sa musíme dohodnúť na tom, aká je *syntax* atomických formúl logiky prvého rádu:

- z čoho sa skladajú,
- čím vlastne sú,
- akú majú štruktúru.



## Symbody jazyka atomických formúl logiky prvého rádu

Z čoho sa skladajú atomické formuly?

**Definícia 1.9.** *Symbolmi jazyka  $\mathcal{L}$  atomických formúl logiky prvého rádu sú mimologické, logické a pomocné symboly, pričom:*

*Mimologickými symbolmi sú*

- *individuové konštanty* z nejakej neprázdnej spočítateľnej množiny  $\mathcal{C}_{\mathcal{L}}$
- *a predikátové symboly* z nejakej spočítateľnej množiny  $\mathcal{P}_{\mathcal{L}}$ .

Jediným *logickým symbolom* je  $\doteq$  (symbol rovnosti).

*Pomocnými symbolmi* sú  $(, )$  a  $,$  (ľavá, pravá zátvorka a čiarka).

Množiny  $\mathcal{C}_{\mathcal{L}}$  a  $\mathcal{P}_{\mathcal{L}}$  sú disjunktné. Pomocné symboly sa nevyskytujú v symboloch z  $\mathcal{C}_{\mathcal{L}}$  ani  $\mathcal{P}_{\mathcal{L}}$ . Každému symbolu  $P \in \mathcal{P}_{\mathcal{L}}$  je priradená *arita*  $\text{ar}_{\mathcal{L}}(P) \in \mathbb{N}^+$ .

## Abeceda jazyka atomických formúl logiky prvého rádu

Na Úvode do teoretickej informatiky/Formálnych jazykoch a automatoch by ste povedali, že *abecedou* jazyka  $\mathcal{L}$  atomických formúl logiky prvého rádu je  $\Sigma_{\mathcal{L}} = \mathcal{C}_{\mathcal{L}} \cup \mathcal{P}_{\mathcal{L}} \cup \{\doteq, (, ), ,\}$ .

V logike sa väčšinou pojem *abeceda* nepoužíva, pretože potrebujeme rozlišovať *rôzne druhy* symbolov.

Namiesto *abeceda jazyka  $\mathcal{L}$*  hovoríme *množina všetkých symbolov jazyka  $\mathcal{L}$*  alebo len *symboly jazyka  $\mathcal{L}$* .

Na zápise množiny  $\Sigma_{\mathcal{L}}$  však ľahko vidíme, čím sa rôzne jazyky atomických formúl logiky prvého rádu od seba líšia a čo majú spoločné.

## Príklady symbolov jazykov atomických formúl logiky prvého rádu

*Príklad 1.10.* Príklad o deťoch a zvieratkách sme sformalizovali v jazyku  $\mathcal{L}_{\text{dz}}$ , v ktorom

$$\mathcal{C}_{\mathcal{L}_{\text{dz}}} = \{\text{Bobík, Cilka, Evka, Jarka, Milo}\},$$

$$\mathcal{P}_{\mathcal{L}_{\text{dz}}} = \{\text{dal, pes}\}, \quad \text{ar}_{\mathcal{L}_{\text{dz}}}(\text{dal}) = 3, \quad \text{ar}_{\mathcal{L}_{\text{dz}}}(\text{pes}) = 1.$$

*Príklad 1.11.* Príklad o návštevníkoch party by sme mohli sformalizovať v jazyku  $\mathcal{L}_{\text{party}}$ , kde

$$\begin{aligned}\mathcal{C}_{\mathcal{L}_{\text{party}}} &= \{\text{Kim, Jim, Sarah}\}, \\ \mathcal{P}_{\mathcal{L}_{\text{party}}} &= \{\text{príde}\}, \quad \text{ar}_{\mathcal{L}_{\text{party}}}(\text{príde}) = 1.\end{aligned}$$

### Označenia symbolov

Keď budeme hovoriť o *ľubovľnom* jazyku  $\mathcal{L}$ , často budeme potrebovať nejak označiť niektoré jeho konštanty alebo predikáty, aj keď nebudeme vedieť, aké konkrétne symboly to sú.

Na označenie symbolov použijeme *meta premenné*: premenné v (matematickej) slovenčine, pomocou ktorých budeme hovoriť o (po grécky *meta*) týchto symboloch.

*Dohoda 1.12.* Individuové konštanty budeme spravidla označovať meta premennými  $a, b, c, d$  s prípadnými dolnými indexmi.

Predikátové symboly budeme spravidla označovať meta premennými  $P, Q, R$  s prípadnými dolnými indexmi.

### Atomické formuly jazyka

Čo sú atomické formuly?

**Definícia 1.13.** Nech  $\mathcal{L}$  je jazyk atomických formúl logiky prvého rádu.

*Rovnostný atóm* jazyka  $\mathcal{L}$  je každá postupnosť symbolov  $c_1 \doteq c_2$ , kde  $c_1$  a  $c_2$  sú individuové konštanty z  $\mathcal{C}_{\mathcal{L}}$ .

*Predikátový atóm* jazyka  $\mathcal{L}$  je každá postupnosť symbolov  $P(c_1, \dots, c_n)$ , kde  $P$  je predikátový symbol z  $\mathcal{P}_{\mathcal{L}}$  s aritou  $n$  a  $c_1, \dots, c_n$  sú individuové konštanty z  $\mathcal{C}_{\mathcal{L}}$ .

*Atomickými formulami* (skrátene *atómami*) jazyka  $\mathcal{L}$  súhrnne nazývame všetky rovnostné a predikátové atómy jazyka  $\mathcal{L}$ .

Množinu všetkých atómov jazyka  $\mathcal{L}$  označujeme  $\mathcal{A}_{\mathcal{L}}$ .

### Slová jazyka atomických formúl logiky prvého rádu

Na Úvode do teoretickej informatiky by ste povedali, že jazyk  $\mathcal{L}$  atomických formúl logiky prvého rádu nad abecedou  $\Sigma_{\mathcal{L}} = \mathcal{C}_{\mathcal{L}} \cup \mathcal{P}_{\mathcal{L}} \cup \{\doteq, (, ), \}$  je

množina slov

$$\{c_1 \doteq c_2 \mid c_1 \in \mathcal{C}_{\mathcal{L}}, c_2 \in \mathcal{C}_{\mathcal{L}}\} \\ \cup \{P(c_1, \dots, c_n) \mid P \in \mathcal{P}_{\mathcal{L}}, \text{ar}_{\mathcal{L}}(P) = n, c_1 \in \mathcal{C}_{\mathcal{L}}, \dots, c_n \in \mathcal{C}_{\mathcal{L}}\}.$$

V logike sa jazyk takto nedefinuje, pretože potrebujeme rozlišovať *rôzne druhy slov*.

### Príklady atómov jazyka

*Príklad 1.14.* V jazyku  $\mathcal{L}_{\text{dz}}$ , kde  $\mathcal{C}_{\mathcal{L}_{\text{dz}}} = \{\text{Bobík, Cilka, Evka, Jarka, Milo}\}$ ,  $\mathcal{P}_{\mathcal{L}_{\text{dz}}} = \{\text{dal, pes}\}$ ,  $\text{ar}_{\mathcal{L}_{\text{dz}}}(\text{dal}) = 3$ ,  $\text{ar}_{\mathcal{L}_{\text{dz}}}(\text{pes}) = 1$ , sú *okrem iných* rovnostné atómy:

Bobík  $\doteq$  Bobík

Cilka  $\doteq$  Bobík

Evka  $\doteq$  Jarka

Bobík  $\doteq$  Cilka


a predikátové atómy:

pes(Cilka)

dal(Cilka, Milo, Bobík)

dal(Jarka, Evka, Milo).

### Atómy ako triedy




## 1.2 Sémantika atomických formúl

### Vyhodnotenie atomickej formuly

Ako zistíme, či je atomická formula `pes(Bobík)` pravdivá v nejakej situácii (napríklad u babky Evky, Jarky a Mila na dedine)?

Pozrieme sa na túto situáciu a zistíme:

1. aký objekt  $b$  pomenúva konštanta Bobík;
2. akú vlastnosť  $p$  označuje predikát pes;
3. či objekt  $b$  má vlastnosť  $p$ .



### Vyhodnotenie atomickej formuly

Ako môžeme tento postup matematicky alebo informaticky modelovať?  
Potrebujeme:

- matematický/informatický model situácie (stavu vybranej časti sveta),
- postup na jeho použitie pri vyhodnocovaní pravdivosti formúl.

### Matematický model stavu sveta

Ako môžeme matematicky popísať nejakú situáciu tak, aby sme pomocou tohto popisu mohli vyhodnocovať atomické formuly v nejakom jazyku logiky prvého rádu  $\mathcal{L}$ ?

### Matematický model stavu sveta

Potrebujeme vedieť:

- ktoré objekty sú v popisovanej situácii prítomné,
- množina všetkých týchto objektov — *doména*;
- jednoznačné priradenie významu všetkým individuovým konštantám a predikátom z jazyka  $\mathcal{L}$

- *interpretačná funkcia*;
- pre každú individuovú konštantu  $c$  z jazyka  $\mathcal{L}$ , ktorý *objekt* z domény konštantu  $c$  pomenúva,
- pre každý unárny predikát  $P$  z jazyka  $\mathcal{L}$ , ktoré objekty z domény majú vlastnosť označenú predikátom  $P$ ,
- tvoria *podmnožinu* domény;
- pre každý  $n$ -árny predikát  $R$  z jazyka  $\mathcal{L}$ ,  $n > 1$ , ktoré  $n$ -tice objektov z domény sú vo vzťahu ozn. pred.  $R$ ,
- tvoria  $n$ -árnu *reláciu* na doméne.


## Štruktúra pre jazyk

**Definícia 1.15.** Nech  $\mathcal{L}$  je jazyk atomických forém logiky prvého rádu. *Štruktúrou* pre jazyk  $\mathcal{L}$  (niekedy *interpretáciou* jazyka  $\mathcal{L}$ ) nazývame dvojicu  $\mathcal{M} = (D, i)$ , kde  $D$  je ľubovoľná *neprázdna* množina nazývaná *doména* štruktúry  $\mathcal{M}$ ;  $i$  je zobrazenie, nazývané *interpretačná funkcia* štruktúry  $\mathcal{M}$ , ktoré

- každej individuovej konštante  $c$  jazyka  $\mathcal{L}$  prirad'uje prvok  $i(c) \in D$ ;
- každému predikátovému symbolu  $P$  jazyka  $\mathcal{L}$  s aritou  $n$  prirad'uje množinu  $i(P) \subseteq D^n$ .

*Dohoda 1.16.* Štruktúry označujeme veľkými *písanými* písmenami  $\mathcal{M}, \mathcal{N}, \dots$

## Príklad štruktúry



Príklad 1.17.

$$\begin{aligned} \mathcal{M} &= (D, i), \quad D = \left\{ \text{ľudia}, \text{strom}, \text{dom}, \text{koc}, \text{auto}, \text{zvieratka} \right\} \\ i(\text{Bobík}) &= \text{koc} & i(\text{Cilka}) &= \text{koc} \\ i(\text{Evka}) &= \text{ľudia} & i(\text{Jarka}) &= \text{ľudia} & i(\text{Milo}) &= \text{ľudia} \\ i(\text{pes}) &= \{ \text{koc}, \text{koc} \} \\ i(\text{dal}) &= \{ (\text{ľudia}, \text{ľudia}, \text{koc}), (\text{ľudia}, \text{ľudia}, \text{koc}), (\text{ľudia}, \text{ľudia}, \text{koc}) \} \end{aligned}$$

### Štruktúra ako informatický objekt












Štruktúru sme definovali pomocou *matematických* objektov.

Aký *informatický* objekt sa podobá na štruktúru?

*Databáza:*

Predikátové symboly jazyka  $\sim$  veľmi zjednodušená schéma DB (arita  $\sim$  počet stĺpcov)

Interpretácia predikátových symbolov  $\sim$  konkrétne tabuľky s dátami

$i(\text{pes}^1)$	$i(\text{dal}^3)$		
1	1	2	3
			
			
			

### Štruktúry — upozornenia

Štruktúr pre daný jazyk je *nekonečne veľa*.

Doména štruktúry

- môže mať ľubovoľné prvky;
- nijak *nesúvisí* s intuitívnym významom interpretovaného jazyka;
- môže byť *nekonečná*.

Interpretácia symbolov konštánt:

- každej konštante je priradený objekt domény;

- nie každý objekt domény musí byť priradený nejakej konštante;
- rôznym konštantám môže byť priradený rovnaký objekt.

Interpretácie predikátových symbolov môžu byť *nekonečné*.

**Príklad 1.18** (Štruktúra s nekonečnou doménou).  $\mathcal{M} = (\mathbb{N}, i)$   $i(\text{pes}) = \{2n \mid n \in \mathbb{N}\}$   $i(\text{dal}) = \{(n, m, n + m) \mid n, m \in \mathbb{N}\}$   
 $i(\text{Bobík}) = 0$   $i(\text{Cilka}) = 1$   $i(\text{Evka}) = 3$   $i(\text{Jarka}) = 5$   $i(\text{Milo}) = 0$

### Pravdivosť atomickej formuly v štruktúre

Ako zistíme, či je atomická formula pravdivá v štruktúre?

**Definícia 1.19.** Nech  $\mathcal{M} = (D, i)$  je štruktúra pre jazyk  $\mathcal{L}$  atomických for-  
múl jazyka logiky prvého rádu.

Rovnostný atóm  $c_1 \doteq c_2$  jazyka  $\mathcal{L}$  je *pravdivý v štruktúre  $\mathcal{M}$*  vtedy a len  
vtedy, keď  $i(c_1) = i(c_2)$ .

Predikátový atóm  $P(c_1, \dots, c_n)$  jazyka  $\mathcal{L}$  je *pravdivý v štruktúre  $\mathcal{M}$*  vtedy  
a len vtedy, keď  $(i(c_1), \dots, i(c_n)) \in i(P)$ .

Vzťah *atóm  $A$  je pravdivý v štruktúre  $\mathcal{M}$*  skráteno zapisujeme  $\mathcal{M} \models A$ .  
Hovoríme aj, že  $\mathcal{M}$  je *modelom  $A$* .

Vzťah *atóm  $A$  nie je pravdivý v štruktúre  $\mathcal{M}$*  zapisujeme  $\mathcal{M} \not\models A$ . Hovoríme  
aj, že  $A$  je *nepravdivý v  $\mathcal{M}$*  a  $\mathcal{M}$  *nie je modelom  $A$* .

**Príklad 1.20** (Určenie pravdivosti atómov v štruktúre).

$$\mathcal{M} = (D, i), \quad D = \left\{ \text{Bobík}, \text{Cilka}, \text{Evka}, \text{Jarka}, \text{Milo}, \text{pes(Bobík)}, \text{dal(Evka, Jarka, Cilka)} \right\}$$

$$i(\text{Bobík}) = \text{Bobík} \quad i(\text{Cilka}) = \text{Cilka}$$

$$i(\text{Evka}) = \text{Evka} \quad i(\text{Jarka}) = \text{Jarka} \quad i(\text{Milo}) = \text{Milo}$$

$$i(\text{pes}) = \{\text{Bobík}, \text{Cilka}\}$$

$$i(\text{dal}) = \{(\text{Evka}, \text{Jarka}, \text{Cilka}), (\text{Evka}, \text{Cilka}, \text{Jarka}), (\text{Jarka}, \text{Evka}, \text{Cilka})\}$$

Atóm  $\text{pes}(\text{Bobík})$  je *pravdivý v štruktúre  $\mathcal{M}$* , t.j.,  $\mathcal{M} \models \text{pes}(\text{Bobík})$ , lebo  
objekt  $i(\text{Bobík}) = \text{Bobík}$  je prvkom množiny  $\{\text{Bobík}, \text{Cilka}\} = i(\text{pes})$ .

Atóm  $\text{dal}(\text{Evka}, \text{Jarka}, \text{Cilka})$  je *pravdivý v  $\mathcal{M}$* , t.j.,  $\mathcal{M} \models \text{dal}(\text{Evka}, \text{Jarka}, \text{Cilka})$ ,  
lebo  $(i(\text{Evka}), i(\text{Jarka}), i(\text{Cilka})) = (\text{Evka}, \text{Jarka}, \text{Cilka}) \in i(\text{dal})$ .

Atóm  $\text{Cilka} \doteq \text{Bobík}$  *nie je pravdivý v  $\mathcal{M}$* , t.j.,  $\mathcal{M} \not\models \text{Cilka} \doteq \text{Bobík}$ , lebo  
 $i(\text{Cilka}) = \text{Cilka} \neq \text{Bobík} = i(\text{Bobík})$ .

## 1.3 Zhrnutie

### Zhrnutie

- Logika prvého rádu je rodina formálnych jazykov.
- Každý jazyk logiky prvého rádu je daný neprázdnu množinou individuových konštánt a množinou predikátových symbolov.
- Atomické formuly sú základnými výrazmi prvorádového jazyka.
  - Postupnosti symbolov  $P(c_1, \dots, c_n)$  (predikátové) a  $c_1 \doteq c_2$  (rovnostné).
  - Zodpovedajú pozitívnym jednoduchým výrokom o vlastnostiach, stavoch, vzťahoch, rovnosti jednotlivých pomenovaných objektov.
- Význam jazyku dáva štruktúra — matematický opis stavu sveta
  - Skladá sa z neprázdnej domény a z interpretačnej funkcie.
  - Konštanty interpretuje ako prvky domény.
  - Predikáty interpretuje ako podmnožiny domény/relácie na doméne.
- Pravdivosť atómu určíme interpretovaním argumentov a zistením, či je výsledná  $n$ -tica objektov prvkom interpretácie predikátu, resp. pri rovnostnom atóme, či sa objekty rovnajú.



## 2. prednáška

# Výrokovologické spojky

---

### Rekapitulácia

Minulý týždeň sme si povedali:

- čo sú symboly jazyka *atomických formúl* logiky prvého rádu;
- čo sú atomické formuly;
- čo sú štruktúry:
  - modely stavu sveta,
  - neprázdna doména + interpretačná funkcia,
  - konštanty označujú objekty,
  - predikáty označujú vzťahy a vlastnosti;
- kedy sú atomické formuly pravdivé v danej štruktúre.
- Jazyk atomických formúl je oproti slovenčine veľmi slabý.
- Môžu byť pravdivé vo veľmi čudných štruktúrach.

## 2 Výrokovologické spojky

### Výrokovologické spojky

Atomické formuly logiky prvého rádu môžeme spájať do zložitejších tvrdení *výrokovologickými spojkami*.

- Zodpovedajú spojkám v slovenčine, ktorými vytvárame súvetia.
- Významom spojky je vždy *boolovská funkcia*, teda funkcia na pravdivostných hodnotách spájaných výrokov. Pravdivostná hodnota zloženého výroku závisí *iba* od pravdivostných hodnôt podvýrokov.

*Príklad 2.1.* Negácia, konjunkcia, disjunkcia, implikácia, ekvivalencia, ...

## Nevýrokovologické spojky

### Negatívny príklad

Spojka *pretože* nie je výrokovologická.

*Dôkaz.* Uvažujme o výroku „*Karol je doma, pretože Jarka je v škole*“.

*Je pravdivý v situácii:* Je 18:00 a Karol je doma, aby nakŕmil psíka. Ten by inak musel čakať na Jarku, ktorá šla dopoludnia do školy a vráti až o 19:30.

*Nie je pravdivý v situácii:* Jarka išla ráno do školy, ale Karol ostal doma, lebo je chorý. S Jarkinou prítomnosťou v škole to nesúvisí.

V oboch situáciách sú výroky „*Karol je doma*“ aj „*Jarka je v škole*“ pravdivé, ale pravdivostná hodnota zloženého výroku je rôzna. *Nezávisí* iba od pravdivostných hodnôt podvýrokov (ale od existencie vzťahu *príčina-následok* medzi nimi).

Spojka *pretože* teda nie je *funkciou* na pravdivostných hodnotách. □

## 2.1 Boolovské spojky

### Negácia

Negácia  $\neg$  je *unárna* spojka — má jeden argument, formulu.

Zodpovedá výrazom *nie*, „*nie je pravda, že ...*“, predpone *ne-*.

Lubovoľne vnárateľná.

Formula vytvorená negáciou sa *nezátvorkuje*.

Okolo argumentu negácie *nepridávame* zátvorky, ale môže ich mať on sám, ak to jeho štruktúra vyžaduje.

*Príklad 2.2.*

$\neg \text{doma}(\text{Karol})$	Karol <i>nie</i> je doma.
$\neg \text{Jarka} \doteq \text{Karol}$	Jarka <i>nie</i> je Karol.
$\neg \neg \neg \text{poslúcha}(\text{Cilka})$	<i>Nie</i> je pravda, že <i>nie</i> je pravda, že Cilka <i>neposlúcha</i> .
<del><math>(\neg \text{doma}(\text{Karol}))</math></del>	nesprávna
<del><math>\neg(\text{doma}(\text{Karol}))</math></del>	syntax

### Konjunkcia

Konjunkcia  $\wedge$  je *binárna* spojka.

Zodpovedá spojкам *a*, *aj*, *i*, *tiež*, *ale*, *avšak*, *no*, *hoci*, *ani*, *ba* (*aj/ani*), ...

Formalizujeme ňou zlučovacie, stupňovacie a odporovacie súvetia:

- Jarka je doma *aj* Karol je doma.  
(doma(Jarka)  $\wedge$  doma(Karol))
- Jarka je v škole, *no* Karol je doma.  
(v\_škole(Jarka)  $\wedge$  doma(Karol))
- *Ani* Jarka nie je doma, *ani* Karol tam nie je.  
( $\neg$ doma(Jarka)  $\wedge$   $\neg$ doma(Karol))
- *Nielen* Jarka je chorá, *ale aj* Karol je chorý.  
(chorý(Jarka)  $\wedge$  chorý(Karol))

Zloženú formulu vždy *zátvorkujeme*.

### Formalizácia viacnásobných vetných členov konjunkciou

Zlučovacie viacnásobné vetné členy tiež formalizujeme ako konjunkcie:

- *Jarka aj Karol* sú doma.  
(doma(Jarka)  $\wedge$  doma(Karol))
- *Karol sa potkol a spadol*.  
(potkol\_sa(Karol)  $\wedge$  spadol(Karol))
- *Jarka dostala Bobíka od mamy a otca*.  
(dostal(Jarka, Bobík, mama)  $\wedge$  dostal(Jarka, Bobík, otec))

Podobne (jednoduché a viacnásobné zlučovacie) prívlastky vlastností:

- Eismann je *ruský špión*.  
(Rus(Eismann)  $\wedge$  špión(Eismann))
- Bobík je *malý čierny psík*.  
(((malý(Bobík)  $\wedge$  čierny(Bobík))  $\wedge$  pes(Bobík)))

### Stratené v preklade

Zlučovacie súvetia niekedy vyjadrujú časovú následnosť, ktorá sa pri priamočiarom preklade do logiky prvého rádu *stráca*:

- Jarka a Karol sa stretli *a* išli do kina. (stretli\_sa(Jarka, Karol)  $\wedge$  (do\_kina(Jarka)  $\wedge$  do\_kina(Karol)))

- Jarka a Karol išli do kina *a* stretli sa.  $((\text{do\_kina}(\text{Jarka}) \wedge \text{do\_kina}(\text{Karol})) \wedge \text{stretli\_sa}(\text{Jarka}, \text{Karol}))$

## Disjunkcia

Disjunkcia  $\vee$  je binárna spojka, ktorá zodpovedá spojкам *alebo*, či v *inkluzívnom* význame (môžu nastať aj obe možnosti). Inkluzívnu disjunkciu vyjadruje tiež „*alebo aj/i*“ a častice *respektíve, eventuálne, popripade, prípadne*.

Disjunkciou formalizujeme vylučovacie súvetia s inkluzívnym významom:

- Jarka je doma *alebo* Karol je doma.  $(\text{doma}(\text{Jarka}) \vee \text{doma}(\text{Karol}))$
- Bobík kúpe Jarka, prípadne ho kúpe Karol.  $(\text{kúpe}(\text{Jarka}, \text{Bobík}) \vee \text{kúpe}(\text{Karol}, \text{Bobík}))$

Zloženú formulu vždy *zátvorkujeme*.

## Formalizácia viacnásobných vetných členov disjunkciou

Viacnásobné vetné členy s vylučovacou spojkou (v inkluzívnom význame) tiež prekladáme ako disjunkcie:

- Doma je Jarka *alebo* Karol.  $(\text{doma}(\text{Jarka}) \vee \text{doma}(\text{Karol}))$
- Jarka je doma *alebo* v škole.  $(\text{doma}(\text{Jarka}) \vee \text{v\_škole}(\text{Jarka}))$
- Jarka dostala Bobíka od mamy *alebo* otca.  $(\text{dostal}(\text{Jarka}, \text{Bobík}, \text{mama}) \vee \text{dostal}(\text{Jarka}, \text{Bobík}, \text{otec}))$
- Bobík je čierny či tmavohnedý psík.  $((\text{čierny}(\text{Bobík}) \vee \text{tmavohnedý}(\text{Bobík})) \wedge \text{pes}(\text{Bobík}))$

## Exkluzívna disjunkcia

Konštrukcie „*bud' ... , alebo ...*“, „*bud' ... , bud' ...*“, „*alebo ... , alebo ...*“ *spravidla* (v matematike vždy) vyjadrujú *exkluzívnu* disjunkciu.

- Bud' je batéria vybitá *alebo* svieti kontrolka.

Exkluzívnu disjunkciu môžeme vyjadriť zložitejšou formulou:

$$((\text{vybitá}(\text{batéria}) \vee \text{svieti}(\text{kontrolka})) \wedge \\ \neg(\text{vybitá}(\text{batéria}) \wedge \text{svieti}(\text{kontrolka}))).$$

Niekedy aj samotné *alebo* spája možnosti, o ktorých vieme, že sú vzájomne vylučné (na základe znalostí o fungovaní domény alebo z kontextu):

- Jarka sa nachádza doma alebo v škole. (Nemôže byť súčasne na dvoch miestach.)

Vid' *Znalosti na pozadí* ďalej.

### Jednoznačnosť rozkladu

Formuly s binárnymi spojkami sú vždy uzátvorkované. Dajú sa jednoznačne rozložiť na podformuly a interpretovať.

Slovenské tvrdenia so spojkami nie sú vždy jednoznačné:

- Karol je doma a Jarka je doma alebo je Bobík šťastný.

❓  $((\text{doma}(\text{Karol}) \wedge \text{doma}(\text{Jarka})) \vee \text{šťastný}(\text{Bobík}))$

❓  $(\text{doma}(\text{Karol}) \wedge (\text{doma}(\text{Jarka}) \vee \text{šťastný}(\text{Bobík})))$

- Karol je doma alebo Jarka je doma a Bobík je šťastný.

❓  $((\text{doma}(\text{Karol}) \vee \text{doma}(\text{Jarka})) \wedge \text{šťastný}(\text{Bobík}))$

❓  $(\text{doma}(\text{Karol}) \vee (\text{doma}(\text{Jarka}) \wedge \text{šťastný}(\text{Bobík})))$

### Jednoznačnosť rozkladu v slovenčine

Slovenčina má prostriedky podobné zátvorkám:

- Viacnásobný vetný člen (+*obaja*, *niekto* z):

- Karol aj Jarka sú (obaja) doma alebo je Bobík šťastný.

$((\text{doma}(\text{Karol}) \wedge \text{doma}(\text{Jarka})) \vee \text{šťastný}(\text{Bobík}))$

- Doma je Karol alebo Jarka a Bobík je šťastný.

Niekoľko z dvojice Karol a Jarka je doma a Bobík je šťastný.

$((\text{doma}(\text{Karol}) \vee \text{doma}(\text{Jarka})) \wedge \text{šťastný}(\text{Bobík}))$

- Kombinácie spojok *bud' ... , alebo ... ; alebo ... , alebo ... ; aj ... , aj ... ; ani ... , ani ... ; a pod.*
  - Karol je doma a *bud'* je doma Jarka, *alebo* je Bobík šťastný, *alebo* jedno *aj* druhé. *Aj* Karol je doma, *aj* Jarka je doma *alebo* je Bobík šťastný.  
 $(\text{doma}(\text{Karol}) \wedge (\text{doma}(\text{Jarka}) \vee \text{šťastný}(\text{Bobík})))$
  - *Alebo* je doma Karol, *alebo* je doma Jarka a Bobík je šťastný, *alebo* *aj* *aj*.  $(\text{doma}(\text{Karol}) \vee (\text{doma}(\text{Jarka}) \wedge \text{šťastný}(\text{Bobík})))$

### Oblasť platnosti negácie

Výskyt negácie sa vzťahuje na *najkratšiu nasledujúcu formulu* – *oblasť platnosti* tohto výskytu.

- $((\neg \text{doma}(\text{Karol}) \wedge \text{doma}(\text{Jarka})) \vee \text{šťastný}(\text{Bobík}))$
- $(\neg (\text{doma}(\text{Karol}) \wedge \text{doma}(\text{Jarka}))) \vee \text{šťastný}(\text{Bobík}))$

Argument negácie je *uzátvorkovaný práve vtedy*, keď je *priamo* vytvorený binárnou spojkou:

- ✓  $\neg \neg (\text{doma}(\text{Karol}) \wedge \text{doma}(\text{Jarka}))$
- ✗  $\neg (\neg (\text{doma}(\text{Karol}) \wedge \text{doma}(\text{Jarka})))$

### Interakcia negácie s alebo v slovenčine

#### **Zamyslite sa 2.1**

Ako by ste sformalizovali: „Doma nie je Jarka alebo Karol“?

- A.  $(\neg \text{doma}(\text{Jarka}) \vee \neg \text{doma}(\text{Karol}))$
- B.  $\neg (\text{doma}(\text{Jarka}) \vee \text{doma}(\text{Karol}))$

Zvyčajné chápanie v slovenčine je **A**.

Formalizácii **B** zodpovedá „Nie je pravda, že Jarka alebo Karol je doma.“

## Negácia rovnostného atómu

Rovnosť nie je spojka, preto:

✓  $\neg \text{Jarka} \doteq \text{Karol} - \text{Jarka nie je Karol.}$

✗  $\neg (\text{Jarka} \doteq \text{Karol})$

Zátvorky sú zbytočné, lebo čítanie „*«Nie je pravda, že Jarka» sa rovná Karol*“ je nezmyselné:

1. Syntakticky: Negácia sa vzťahuje na formulu. Konštanta nie je formula, rovnosť s oboma argumentmi je.
2. Sémanticky: Negácia je funkcia na pravdivostných hodnotách. Konštanty označujú objekty domény. Objekty nie sú pravdivé ani nepravdivé.

Dohoda 2.3. Formulu  $\neg \tau \doteq \sigma$  budeme skrátene zapisovať  $\tau \neq \sigma$ .

## 2.2 Implikácia

### Implikácia

Implikácia  $\rightarrow$  je binárna spojka približne zodpovedajúca podmienkovému podrad'ovaciemu súvetiu *ak ..., tak ...*.

Vo formule  $(A \rightarrow B)$  hovoríme podformule  $A$  *antecedent* a podformule  $B$  *konzekvent*.

Formula vytvorená implikáciou je *nepravdivá v jedinom prípade*: antecedent je pravdivý a konzekvent nepravdivý.

! Tomuto významu nezodpovedajú všetky súvetia *ak ..., tak ...*:

Napr. veta „*Ak by Sarah prišla, Jim by prišiel tiež*“ je nepravdivá, keď ňou chceme povedať, že si myslíme, že išli rovnakým autobusom, ale v skutočnosti Jim išiel iným a zmeškal ho.

Implikácia plne nevystihuje prípady, keď *ak ..., tak ...* vyjadruje (neboolovský) vzťah príčina-následok (ako *pretože*).

*Keď ..., potom ...* má často význam časovej následnosti, ktorý implikácia tiež nepostihuje.

### Nutná a postačujúca podmienka

Implikáciu vyjadrujú aj súvetia:

Jim príde, *ak* príde Kim.

Jim príde, *iba ak* príde Kim.

Vedľajšie vety (*príde Kim*) sú *podmienkami* hlavnej vety (*Jim príde*).  
Ale je medzi nimi *podstatný rozdiel*:

Jim príde, ak príde Kim.  
*postačujúca*  
podmienka

Jim príde, iba ak príde Kim.  
*nutná*  
podmienka

### Postačujúca podmienka

Jim príde, *ak* príde Kim.

- Na to, aby prišiel Jim, *stačí*, aby prišla Kim.
- Teda, ak príde Kim, tak príde aj Jim.
- Nepravdivé, keď Kim príde, ale Jim *nepríde*.
- Zodpovedá teda ( $\text{príde}(\text{Kim}) \rightarrow \text{príde}(\text{Jim})$ ).

Vo všeobecnosti:

$$A, \text{ ak } B. \quad \rightsquigarrow \quad (B \rightarrow A)$$

Iné vyjadrenia:

- Jim príde, *pokiaľ* príde Kim.

### Nutná podmienka

Jim príde, *iba ak* príde Kim.

- Na to, aby prišiel Jim, *je nevyhnutné*, aby prišla Kim, ale nemusí to stačiť.
- Teda, ak Jim príde, tak príde aj Kim.
- Nepravdivé, keď Jim príde, ale Kim *nepríde*.
- Zodpovedá teda ( $\text{príde}(\text{Jim}) \rightarrow \text{príde}(\text{Kim})$ ).

Vo všeobecnosti:

$$A, \text{ iba ak } B. \quad \rightsquigarrow \quad (A \rightarrow B)$$

Iné vyjadrenia:



- Jim príde, *iba* *pokiaľ* s Kim.
- Jim príde *iba* spolu s Kim.
- Jim *nepríde* *bez* Kim.

### Nutná a postačujúca podmienka rukolapne

Určite by sa vám páčilo, keby z pravidiel predmetu vyplývalo:

Z logiky prejdete, *ak* pridete na písomnú aj ústnu skúšku.

*Stačilo* by prísť na obe časti skúšky a *nebolo by nutné* urobiť nič iné.

Žiaľ, z našich pravidiel vyplýva:

Z logiky prejdete, *iba ak* pridete na písomnú aj ústnu skúšku.

Prísť na obe časti skúšky *je nutné*, ale na prejsenie to *nestačí*.

### Súvetia formalizované implikáciou

$(A \rightarrow B)$  formalizuje (okrem iných) zložené výroky:

- Ak  $A$ , tak  $B$ .
- Ak  $A$ , tak aj  $B$ .
- Ak  $A$ ,  $B$ .
- Pokiaľ  $A$ , [tak (aj)]  $B$ .
- $A$ , iba/len/jedine ak/pokiaľ(/keď)  $B$ .
- $A$  nastane iba spolu s  $B$ .
- $A$  nenastane bez  $B$ .
- $B$ , ak/pokiaľ(/keď)  $A$ .

## 2.3 Ekvivalencia

### Ekvivalencia

Ekvivalencia  $\leftrightarrow$  vyjadruje, že ňou spojené výroky majú rovnakú pravdivostnú hodnotu.

Zodpovedá slovenským výrazom *ak a iba ak*; *vtedy a len vtedy*, *keď*; *práve vtedy*, *keď*; *rovnaký ... ako ...*; *taký ... ako ...*.

- Jim príde, ak a iba ak príde Kim. ( $\text{príde}(\text{Jim}) \leftrightarrow \text{príde}(\text{Kim})$ )
- Číslo  $n$  je párne práve vtedy, keď  $n^2$  je párne. ( $\text{párne}(n) \leftrightarrow \text{párne}(n^2)$ )
- Müller je taký Nemec, ako je Stirlitz Rus. ( $\text{Nemec}(\text{Müller}) \leftrightarrow \text{Rus}(\text{Stirlitz})$ )

### Ekvivalencia

Ekvivalencia ( $A \leftrightarrow B$ ) zodpovedá tvrdeniu, že  $A$  je nutnou aj postačujúcou podmienkou  $B$ .

Budeme ju preto považovať za *skratku* za formulu

$$((A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A)).$$

### Ďalšie spojky a vetné konštrukcie

V slovenčine a iných prirodzených aj umelých jazykoch sa dajú tvoriť aj oveľa komplikovanejšie podmienené tvrdenia:

- Karol je doma, *ak* je Jarka v škole, *inak* má Jarka obavy.
- Karol je doma, *ak* je Jarka v škole, *inak* má Jarka obavy, *okrem* prípadov, keď je Bobík s ním.

Výrokovologické spojky sa dajú vytvoriť aj pre takéto konštrukcie, ale väčšinou sa to nerobí.

Na ich vyjadrenie stačia aj základné spojky. Mohli by sme pre ne vymyslieť označenie a považovať aj ako skratky, podobne ako ekvivalenciu.

## 2.4 Syntax výrokovologických formúl

### Syntax a sémantika formúl s výrokovologickými spojkami

Podobne ako pri atomických formulách, aj pri formulách s výrokovologickými spojkami potrebujeme *zadefinovať* — presne a záväzne — ich *syntax* (skladbu) a *sémantiku* (význam).

Niektoré definície preberieme, iné rozšírime alebo modifikujeme, ďalšie pridáme.

*Syntax* výrokovologických formúl logiky prvého rádu špecifikuje:

- z čoho sa skladajú,
- čím sú a akú majú štruktúru.

### Symboly výrokovologickej časti logiky prvého rádu

**Definícia 2.4.** *Symbolmi jazyka  $\mathcal{L}$  výrokovologickej časti logiky prvého rádu sú:*

*mimologické symboly, ktorými sú*

- *individuové konštanty* z nejakej neprázdnej spočítateľnej množiny  $\mathcal{C}_{\mathcal{L}}$
- *a predikátové symboly* z nejakej spočítateľnej množiny  $\mathcal{P}_{\mathcal{L}}$ ;

*logické symboly, ktorými sú*

- *výrokovologické spojky*  $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow$  (nazývané, v uvedenom poradí, *symbol negácie, symbol konjunkcie, symbol disjunkcie, symbol implikácie*);
- *a symbol rovnosti*  $\doteq$ ;

*pomocné symboly*  $(, )$  a  $,$  (ľavá zátvorka, pravá zátvorka a čiarka).

Množiny  $\mathcal{C}_{\mathcal{L}}$  a  $\mathcal{P}_{\mathcal{L}}$  sú disjunktné. Pomocné ani logické symboly sa nevyskytujú v symboloch z  $\mathcal{C}_{\mathcal{L}}$  ani  $\mathcal{P}_{\mathcal{L}}$ . Každému symbolu  $P \in \mathcal{P}_{\mathcal{L}}$  je priradená *arita*  $\text{ar}_{\mathcal{L}}(P) \in \mathbb{N}^+$ .

## Atomické formuly

Definícia atomických formúl je takmer rovnaká ako doteraz:

**Definícia 2.5.** Nech  $\mathcal{L}$  je jazyk výrokovologickej časti logiky prvého rádu.

*Rovnostný atóm* jazyka  $\mathcal{L}$  je každá postupnosť symbolov  $c_1 \doteq c_2$ , kde  $c_1$  a  $c_2$  sú individuové konštanty z  $\mathcal{C}_{\mathcal{L}}$ .

*Predikátový atóm* jazyka  $\mathcal{L}$  je každá postupnosť symbolov  $P(c_1, \dots, c_n)$ , kde  $P$  je predikátový symbol z  $\mathcal{P}_{\mathcal{L}}$  s aritou  $n$  a  $c_1, \dots, c_n$  sú individuové konštanty z  $\mathcal{C}_{\mathcal{L}}$ .

*Atomickými formulami* (skrátene *atómami*) jazyka  $\mathcal{L}$  súhrnne nazývame všetky rovnostné a predikátové atómy jazyka  $\mathcal{L}$ .

Množinu všetkých atómov jazyka  $\mathcal{L}$  označujeme  $\mathcal{A}_{\mathcal{L}}$ .

## Čo sú výrokovologické formuly?

Majme jazyk  $\mathcal{L}$ , kde  $\mathcal{C}_{\mathcal{L}} = \{\text{Kim}, \text{Jim}, \text{Sarah}\}$  a  $\mathcal{P}_{\mathcal{L}} = \{\text{príde}^1\}$ .

Čo sú formuly tohto jazyka?

- Samotné atómy, napr.  $\text{príde}(\text{Sarah})$ .
- Negácie atómov, napr.  $\neg \text{príde}(\text{Sarah})$ .
- Atómy alebo aj ich negácie spojené spojkou, napr.  $(\neg \text{príde}(\text{Kim}) \vee \text{príde}(\text{Sarah}))$ .
- Ale negovať a spájať spojkami môžeme aj zložitejšie formuly, napr.  $(\neg(\text{príde}(\text{Kim}) \wedge \text{príde}(\text{Sarah})) \rightarrow (\neg \text{príde}(\text{Kim}) \vee \neg \text{príde}(\text{Sarah})))$ .

Ako to presne a úplne popíšeme?

## Čo sú výrokovologické formuly?

Ako presne a úplne popíšeme, čo je formula?

*Induktívnou* definíciou:

1. Povieme, čo sú základné formuly, ktoré sa nedajú rozdeliť na menšie formuly.
  - Podobne ako báza pri matematickej indukcii.
2. Opíšeme, ako sa z jednoduchších formúl skladajú zložitejšie.
  - Podobne ako indukčný krok pri matematickej indukcii.
3. Zabezpečíme, že nič iné nie je formulou.

## Formuly jazyka výrokovologickej časti logiky prvého rádu

**Definícia 2.6.** Nech  $\mathcal{L}$  je jazyk výrokovologickej časti logiky prvého rádu. Množina  $\mathcal{E}_{\mathcal{L}}$  formúl jazyka  $\mathcal{L}$  je (3.) *najmenšia* množina postupností symbolov, ktorá spĺňa všetky nasledujúce podmienky:

1. Každý atóm z  $\mathcal{A}_{\mathcal{L}}$  je formulou z  $\mathcal{E}_{\mathcal{L}}$ .
- 2.1. Ak  $A$  patrí do  $\mathcal{E}_{\mathcal{L}}$ , tak aj postupnosť symbolov  $\neg A$  patrí do  $\mathcal{E}_{\mathcal{L}}$  a nazývame ju *negácia* formuly  $A$ .
- 2.2. Ak  $A$  a  $B$  sú v  $\mathcal{E}_{\mathcal{L}}$ , tak aj postupnosti symbolov  $(A \wedge B)$ ,  $(A \vee B)$  a  $(A \rightarrow B)$  patria do  $\mathcal{E}_{\mathcal{L}}$  a nazývame ich postupne *konjunkcia*, *disjunkcia* a *implikácia* formúl  $A$  a  $B$ .

Každý prvok  $A$  množiny  $\mathcal{E}_{\mathcal{L}}$  nazývame *formulou* jazyka  $\mathcal{L}$ .

### Dohody • Vytvorenie formuly

*Dohoda 2.7.* Formuly označujeme meta premennými  $A, B, C, X, Y, Z$ , podľa potreby aj s dolnými indexmi.

*Dohoda 2.8.* Pre každú dvojicu formúl  $A, B \in \mathcal{E}_{\mathcal{L}}$  je zápis  $(A \leftrightarrow B)$  *skratka* za formulu  $((A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A))$ .

Technicky  $(\cdot \leftrightarrow \cdot): \mathcal{E}_{\mathcal{L}} \times \mathcal{E}_{\mathcal{L}} \rightarrow \mathcal{E}_{\mathcal{L}}$  je funkcia na formulách definovaná ako  $(A \leftrightarrow B) = ((A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A))$  pre každé dve formuly  $A$  a  $B$ .

*Príklad 2.9.* Ako by sme podľa definície 2.6 mohli dokázať, že  $(\neg \text{príde}(\text{Kim}) \rightarrow (\text{príde}(\text{Jim}) \vee \text{príde}(\text{Sarah})))$  je formula? Teda, ako by sme ju podľa definície 2.6 mohli vytvoriť?

### Vytvárajúca postupnosť

**Definícia 2.10.** *Vytvárajúcou postupnosťou* nad jazykom  $\mathcal{L}$  výrokovologickej časti logiky prvého rádu je ľubovoľná konečná postupnosť  $A_0, \dots, A_n$  postupností symbolov, ktorej každý člen

- je atóm z  $\mathcal{A}_{\mathcal{L}}$ , alebo
- má tvar  $\neg A$ , pričom  $A$  je niektorý predchádzajúci člen postupnosti, alebo

- má jeden z tvarov  $(A \wedge B)$ ,  $(A \vee B)$ ,  $(A \rightarrow B)$ , kde  $A$  a  $B$  sú niektoré predchádzajúce členy postupnosti.

Vytvárajúcou postupnosťou pre  $X$  je ľubovoľná vytvárajúca postupnosť, ktorej posledným prvkom je  $X$ .

### Indukcia na konštrukciu formuly

**Veta 2.11** (Princíp indukcie na konštrukciu formuly). *Nech  $P$  je ľubovoľná vlastnosť formúl ( $P \subseteq \mathcal{E}_{\mathcal{L}}$ ). Ak platí súčasne*

1. *každý atóm z  $\mathcal{A}_{\mathcal{L}}$  má vlastnosť  $P$ ,*
- 2.1. *ak formula  $A$  má vlastnosť  $P$ , tak aj  $\neg A$  má vlastnosť  $P$ ,*
- 2.2. *ak formuly  $A$  a  $B$  majú vlastnosť  $P$ , tak aj každá z formúl  $(A \wedge B)$ ,  $(A \vee B)$  a  $(A \rightarrow B)$  má vlastnosť  $P$ ,*

*tak všetky formuly majú vlastnosť  $P$  ( $P = \mathcal{E}_{\mathcal{L}}$ ).*

### Formula a existencia vytvárajúcej postupnosti

**Tvrdenie 2.12.** *Postupnosť symbolov  $A$  je výrokovologickou formulou vtt existuje vytvárajúca postupnosť pre  $A$ .*

*Osnova dôkazu. ( $\Rightarrow$ ) Indukciou na konštrukciu formuly*

*( $\Leftarrow$ ) Indukciou na dĺžku vytvárajúcej postupnosti*

□

*vtt skrakuje „vtedy a len vtedy, keď“.*

Vytvárajúcu postupnosť by sme mohli použiť na alternatívnu definíciu formúl.

### (Ne)jednoznačnosť rozkladu formúl výrokovej logiky

Čo keby sme zadefinovali „formuly“ takto?

#### Definícia „formúl“



Nech  $\mathcal{L}$  je jazyk výrokovologickej časti logiky prvého rádu. Množina  $\mathcal{E}_{\mathcal{L}}$  „formúl“ jazyka  $\mathcal{L}$  je (3.) *najmenšia* množina postupností symbolov, ktorá spĺňa všetky nasledujúce podmienky:

1. Každý atóm z  $\mathcal{A}_{\mathcal{L}}$  je „formulou“ z  $\mathcal{E}_{\mathcal{L}}$ .
- 2.1. Ak  $A$  patrí do  $\mathcal{E}_{\mathcal{L}}$ , tak aj postupnosť symbolov  $\neg A$  patrí do  $\mathcal{E}_{\mathcal{L}}$ .
- 2.2. Ak  $A$  a  $B$  sú v  $\mathcal{E}_{\mathcal{L}}$ , tak aj postupnosti symbolov  $A \wedge B$ ,  $A \vee B$  a  $A \rightarrow B$  patria do  $\mathcal{E}_{\mathcal{L}}$ .
- 2.3. ak  $A$  patrí do  $\mathcal{E}_{\mathcal{L}}$ , tak aj postupnosť symbolov  $(A)$  je v  $\mathcal{E}_{\mathcal{L}}$ .

Každý prvok  $A$  množiny  $\mathcal{E}_{\mathcal{L}}$  nazývame „formulou“ jazyka  $\mathcal{L}$ .

Čo znamená „formula“ (príde(Jim)  $\rightarrow$  príde(Kim)  $\rightarrow$   $\neg$ príde(Sarah))?

Formulu by sme mohli čítať ako  $A = (\text{príde}(\text{Jim}) \rightarrow (\text{príde}(\text{Kim}) \rightarrow \neg\text{príde}(\text{Sarah})))$  alebo ako  $B = ((\text{príde}(\text{Jim}) \rightarrow \text{príde}(\text{Kim})) \rightarrow \neg\text{príde}(\text{Sarah}))$ .

Čítanie  $A$  hovorí, že Sarah nepríde, ak prídu Jim a Kim súčasne. To neplatí v *práve jednej* situácii: keď všetci prídu.

Čítanie  $B$  hovorí, že Sarah nepríde, ak alebo nepríde Jim alebo príde Kim. To však neplatí v *aspoň dvoch* rôznych situáciách: keď prídu všetci a keď príde Sarah a Kim, ale nie Jim.

### Jednoznačnosť rozkladu formúl výrokovej logiky

Pre našu definíciu formúl platí:

**Tvrdenie 2.13** (o jednoznačnosti rozkladu). *Pre každú formulu  $X \in \mathcal{E}_{\mathcal{L}}$  v jazyku  $\mathcal{L}$  platí práve jedna z nasledujúcich možností:*

- $X$  je atóm z  $\mathcal{A}_{\mathcal{L}}$ .
- Existuje práve jedna formula  $A \in \mathcal{E}_{\mathcal{L}}$  taká, že  $X = \neg A$ .
- Existujú práve jedna dvojica formúl  $A, B \in \mathcal{E}_{\mathcal{L}}$  a jedna spojka  $b \in \{\wedge, \vee, \rightarrow\}$  také, že  $X = (A \ b \ B)$ .

### Problémy s vytvárajúcou postupnosťou

Vytvárajúca postupnosť popisuje konštrukciu formuly podľa definície formúl:

príde(Jim), príde(Sarah),  $\neg$ príde(Jim), príde(Kim),  
 $\neg$ príde(Sarah),  $(\neg\text{príde}(\text{Jim}) \wedge \text{príde}(\text{Kim}))$ ,  
 $((\neg\text{príde}(\text{Jim}) \wedge \text{príde}(\text{Kim})) \rightarrow \neg\text{príde}(\text{Sarah}))$


ale

- môže obsahovať „zbytočné“ prvky;
- nie je jasné *ktoré* z predchádzajúcich formúl sa *bezprostredne* použijú na vytvorenie nasledujúcej formuly.

Akou „dátovou štruktúrou“ vieme vyjadriť konštrukciu formuly bez týchto problémov?

### Vytvárajúci strom

Konštrukciu si vieme predstaviť ako *strom*:



Takéto stromy voláme *vytvárajúce*.

Ako ich *presne* a *všeobecne* popíšeme — zdefinujeme?

Podobne ako sa definuje napr. binárny vyhľadávací strom.

### Vytvárajúci strom formuly

**Definícia 2.14.** *Vytvárajúci strom*  $T$  pre formulu  $X$  je binárny strom obsahujúci v každom vrchole formulu, pričom platí:

- v koreni  $T$  je formula  $X$ ,
- ak vrchol obsahuje formulu  $\neg A$ , tak má práve jedno dieťa, ktoré obsahuje formulu  $A$ ,
- ak vrchol obsahuje formulu  $(A \ b \ B)$ , kde  $b$  je jedna z binárnych spojok, tak má dve deti, pričom ľavé dieťa obsahuje formulu  $A$  a pravé formulu  $B$ ,
- vrcholy obsahujúce atómy sú listami.



## Syntaktické vzťahy formúl

Uvažujme formulu:

$$((\neg \text{príde}(\text{Jim}) \wedge \text{príde}(\text{Kim})) \rightarrow \neg \text{príde}(\text{Sarah}))$$

Ako nazveme formuly, z ktorých vznikla?

$$\text{príde}(\text{Sarah}), \neg \text{príde}(\text{Jim}), (\neg \text{príde}(\text{Jim}) \wedge \text{príde}(\text{Kim})), \dots$$

Ako nazveme formuly, z ktorých *bezprostredne/priamo* vznikla?

$$(\neg \text{príde}(\text{Jim}) \wedge \text{príde}(\text{Kim})) \quad \text{a} \quad \neg \text{príde}(\text{Sarah})$$

Ako tieto pojmy presne zdefinujeme?

## Podformuly

**Definícia 2.15** (Priama podformula). Pre všetky formuly  $A$  a  $B$ :

- Priamou podformulou  $\neg A$  je formula  $A$ .
- Priamymi podformulami  $(A \wedge B)$ ,  $(A \vee B)$  a  $(A \rightarrow B)$  sú formuly  $A$  (*ľavá priama podformula*) a  $B$  (*pravá priama podformula*).

**Definícia 2.16** (Podformula). Vzťah *byť podformulou* je najmenšia relácia na formulách spĺňajúca pre všetky formuly  $X$ ,  $Y$  a  $Z$ :

- $X$  je podformulou  $X$ .
- Ak  $X$  je priamou podformulou  $Y$ , tak  $X$  je podformulou  $Y$ .
- Ak  $X$  je podformulou  $Y$  a  $Y$  je podformulou  $Z$ , tak  $X$  je podformulou  $Z$ .

Formula  $X$  je *vlastnou podformulou* formuly  $Y$  práve vtedy, keď  $X$  je podformulou  $Y$  a  $X \neq Y$ .

## Meranie syntaktickej zložitosti formúl

Miera zložitosti/veľkosti formuly:

- Jednoduchá: dĺžka, teda počet symbolov
  - Počíta aj pomocné symboly.
  - Nič nemá mieru 0, ani atómy.
- Lepšia: počet netriviálnych krokov pri konštrukcii formuly
  - pridanie negácie,
  - spojenie formúl spojkou.

Túto lepšiu mieru nazývame *stupeň formuly*.

*Príklad 2.17.* Aký je stupeň formuly  $((\text{príde}(\text{Jim}) \vee \neg \text{príde}(\text{Kim})) \wedge \neg (\text{príde}(\text{Sarah}) \rightarrow \text{príde}(\text{Kim})))$ ?

## Meranie syntaktickej zložitosti formúl

Ako stupeň zadefinujeme?

Podobne ako sme zadefinovali formuly — induktívne:

1. určíme hodnotu stupňa pre atomické formuly,
2. určíme, ako zo stupňa priamych podformúl vypočítame stupeň z nich zloženej formuly.

## Stupeň formuly

**Definícia 2.18** (Stupeň formuly). Pre všetky formuly  $A$  a  $B$  a všetky  $n$ ,  $n_1, n_2 \in \mathbb{N}$ :

- Atomická formula je stupňa 0.
- Ak  $A$  je formula stupňa  $n$ , tak  $\neg A$  je stupňa  $n + 1$ .
- Ak  $A$  je formula stupňa  $n_1$  a  $B$  je formula stupňa  $n_2$ , tak  $(A \wedge B)$ ,  $(A \vee B)$  a  $(A \rightarrow B)$  sú stupňa  $n_1 + n_2 + 1$ .

**Definícia 2.18** (Stupeň formuly presnejšie a symbolicky). *Stupeň*  $\deg(X)$  formuly  $X \in \mathcal{E}_{\mathcal{L}}$  definujeme pre všetky formuly  $A, B \in \mathcal{E}_{\mathcal{L}}$  nasledovne:

- $\deg(A) = 0$ , ak  $A \in \mathcal{A}_{\mathcal{L}}$ ,
- $\deg(\neg A) = \deg(A) + 1$ ,
- $\deg((A \wedge B)) = \deg((A \vee B)) = \deg((A \rightarrow B)) = \deg(A) + \deg(B) + 1$ .

### Indukcia na stupeň formuly

Pomocou stupňa vieme indukciu na konštrukciu formuly zredukovať na špeciálny prípad matematickej indukcie:

**Veta 2.19** (Princíp indukcie na stupeň formuly). *Nech  $P$  je ľubovoľná vlastnosť formúl ( $P \subseteq \mathcal{E}_{\mathcal{L}}$ ). Ak platí súčasne*

1. *báza indukcie: každá formula stupňa 0 má vlastnosť  $P$ ,*
2. *indukčný krok: pre každú formulu  $X$  z predpokladu, že všetky formuly menšieho stupňa ako  $\deg(X)$  majú vlastnosť  $P$ , vyplýva, že aj  $X$  má vlastnosť  $P$ ,*

*tak všetky formuly majú vlastnosť  $P$  ( $P = \mathcal{E}_{\mathcal{L}}$ ).*

## 2.5 Sémantika výrokovologických formúl

### Sémantika výrokovej logiky

Význam formúl výrokovologickej časti logiky prvého rádu popíšeme podobne ako význam atomických formúl pomocou *štruktúr*.

### Štruktúra pre jazyk

Definícia štruktúry takmer nemení:

**Definícia 2.20.** Nech  $\mathcal{L}$  je jazyk výrokovologickej časti logiky prvého rádu. *Štruktúrou* pre jazyk  $\mathcal{L}$  nazývame dvojicu  $\mathcal{M} = (D, i)$ , kde  $D$  je ľubovoľná neprázdna množina nazývaná *doména* štruktúry  $\mathcal{M}$ ;  $i$  je zobrazenie, nazývané *interpretačná funkcia* štruktúry  $\mathcal{M}$ , ktoré

- každému symbolu konštanty  $c$  jazyka  $\mathcal{L}$  priraduje prvok  $i(c) \in D$ ;
- každému predikátovému symbolu  $P$  jazyka  $\mathcal{L}$  s aritou  $n$  priraduje množinu  $i(P) \subseteq D^n$ .

## Pravdivosť formuly v štruktúre

**Definícia 2.21.** Nech  $\mathcal{M} = (D, i)$  je štruktúra pre jazyk  $\mathcal{L}$  výrokovologickej časti logiky prvého rádu. Reláciu *formula A je pravdivá v štruktúre  $\mathcal{M}$*  ( $\mathcal{M} \models A$ ) definujeme *induktívne* pre všetky arity  $n > 0$ , všetky predikátové symboly  $P$  s aritou  $n$  všetky konštanty  $c_1, c_2, \dots, c_n$ , a všetky formuly  $A, B$  jazyka  $\mathcal{L}$  nasledovne:


- $\mathcal{M} \models c_1 \doteq c_2$  vtt  $i(c_1) = i(c_2)$ ,
- $\mathcal{M} \models P(c_1, \dots, c_n)$  vtt  $(i(c_1), \dots, i(c_n)) \in i(P)$ ,
- $\mathcal{M} \models \neg A$  vtt  $\mathcal{M} \not\models A$ ,
- $\mathcal{M} \models (A \wedge B)$  vtt  $\mathcal{M} \models A$  a zároveň  $\mathcal{M} \models B$ ,
- $\mathcal{M} \models (A \vee B)$  vtt  $\mathcal{M} \models A$  alebo  $\mathcal{M} \models B$ ,
- $\mathcal{M} \models (A \rightarrow B)$  vtt  $\mathcal{M} \not\models A$  alebo  $\mathcal{M} \models B$ ,

kde  $\mathcal{M} \not\models A$  skrakuje *A nie je pravdivá v  $\mathcal{M}$* .

## Vyhodnotenie pravdivosti formuly

**Príklad 2.22** (Vyhodnotenie pravdivosti formuly v štruktúre). Majme štruktúru  $\mathcal{M} = (D, i)$  pre jazyk o party, kde  $D = \{0, 1, 2, 3\}$ ,  $i(\text{Kim}) = 1$ ,  $i(\text{Jim}) = 2$ ,  $i(\text{Sarah}) = 3$ ,  $i(\text{príde}) = \{1, 3\}$ .

Formuly vyhodnocujeme podľa definície postupom zdola nahor (od atómov cez zložitejšie podformuly k cieľovej formule):



## Vyhodnotenie pravdivosti formuly

*Príklad 2.23* (Vyhodnotenie pravdivosti formuly v štruktúre). Majme štruktúru  $\mathcal{M} = (D, i)$  pre jazyk o party, kde  $D = \{0, 1, 2, 3\}$ ,  $i(\text{Kim}) = 1$ ,  $i(\text{Jim}) = 2$ ,  $i(\text{Sarah}) = 3$ ,  $i(\text{príde}) = \{1, 3\}$ .

Vyhodnotenie pravdivosti môžeme zapísať aj tabuľkou:

	$p(J)$	$p(K)$	$\neg p(K)$	$(p(J) \vee \neg p(K))$	$\neg(p(J) \vee \neg p(K))$	...
$\mathcal{M}$	$\models$	$\models$	$\models$	$\models$	$\models$	

	$p(S)$	$\neg p(S)$	$(\neg(p(J) \vee \neg p(K)) \rightarrow \neg p(S))$
...	$\models$	$\models$	$\models$

kde  $p$  = príde,  $K$  = Kim,  $J$  = Jim a  $S$  = Sarah.

Všimnite si, že v záhlaví tabuľky je vytvárajúca postupnosť vyhodnocovanej formuly.

## Hľadanie štruktúry

*Príklad 2.24* (Nájdenie štruktúry, v ktorej je formula pravdivá). V akej štruktúre  $\mathcal{M} = (D, i)$  je pravdivá formula  $\mathcal{M} \models (\neg(\text{príde}(\text{Jim}) \vee \neg \text{príde}(\text{Kim})) \rightarrow \neg \text{príde}(\text{Sarah}))$ ?

Na zodpovedanie je dobré postupovať podľa definície pravdivosti zhora nadol (od cieľovej formuly cez podformuly k atómom):

$\mathcal{M} \models (\neg(\text{príde}(\text{Jim}) \vee \neg \text{príde}(\text{Kim})) \rightarrow \neg \text{príde}(\text{Sarah}))$  vtt  $\mathcal{M} \models \neg(\text{príde}(\text{Jim}) \vee \neg \text{príde}(\text{Kim}))$  alebo  $\mathcal{M} \models \neg \text{príde}(\text{Sarah})$  vtt  $\mathcal{M} \models (\text{príde}(\text{Jim}) \vee \neg \text{príde}(\text{Kim}))$  alebo  $\mathcal{M} \models \text{príde}(\text{Sarah})$  vtt  $\mathcal{M} \models \text{príde}(\text{Jim})$  alebo  $\mathcal{M} \models \neg \text{príde}(\text{Kim})$  alebo  $\mathcal{M} \models \text{príde}(\text{Sarah})$  vtt  $i(\text{Jim}) \in i(\text{príde})$  alebo  $i(\text{Kim}) \notin i(\text{príde})$  alebo  $i(\text{Sarah}) \notin i(\text{príde})$ .

## 2.6 Teórie a ich modely

### Teórie v neformálnej logike

Medzi základnými logickými pojmami z úvodnej prednášky boli teória a model.

Neformálne je *teória* súbor tvrdení, ktoré pokladáme za pravdivé.

Zvyčajne popisujú našu predstavu o zákonitostiach platných v nejakej časti sveta a pozorovania o jej stave.

*Príklad 2.25.* Máme troch nových známych — Kim, Jima a Sarah. Organizujeme párty a P0: chceme, aby na ňu prišiel niekto z nich. Od spoločných kamarátov sme sa ale dozvedeli o ich požiadavkách:

P1: Sarah nepríde na párty, ak príde Kim.

P2: Jim príde na párty, len ak príde Kim.

P3: Sarah nepríde bez Jima.

### Výrokovologické teórie

V logike prvého rádu tvrdenia zapisujeme formulami. Teóriu preto budeme chápať ako súbor (čiže množinu) formúl.

**Definícia 2.26.** Nech  $\mathcal{L}$  je jazyk výrokovologickej časti logiky prvého rádu.

Každú množinu formúl jazyka  $\mathcal{L}$  budeme nazývať *teóriou* v jazyku  $\mathcal{L}$ .

*Príklad 2.27.*

$$\begin{aligned} T_{\text{party}} = \{ & ((\text{príde}(\text{Kim}) \vee \text{príde}(\text{Jim})) \vee \text{príde}(\text{Sarah})), \\ & (\text{príde}(\text{Kim}) \rightarrow \neg \text{príde}(\text{Sarah})), \\ & (\text{príde}(\text{Jim}) \rightarrow \text{príde}(\text{Kim})), \\ & (\text{príde}(\text{Sarah}) \rightarrow \text{príde}(\text{Jim})) \} \end{aligned}$$

### Modely teórií

Neformálne je *modelom* teórie stav vybranej časti sveta, v ktorom sú všetky tvrdenia v teórii pravdivé.

Pre logiku prvého rádu stavy sveta vyjadrujú štruktúry.

*Príklad 2.28* (Model teórie o party).

$$\begin{aligned} \mathcal{M} &= (\{k, j, s, e, h\}, i), \\ i(\text{Kim}) &= k, \quad i(\text{Jim}) = j, \quad i(\text{Sarah}) = s, \\ i(\text{príde}) &= \{k, j, e\}; \\ \left. \begin{aligned} \mathcal{M} &\models ((\text{príde}(\text{Kim}) \vee \text{príde}(\text{Jim})) \vee \text{príde}(\text{Sarah})) \\ \mathcal{M} &\models (\text{príde}(\text{Kim}) \rightarrow \neg \text{príde}(\text{Sarah})) \\ \mathcal{M} &\models (\text{príde}(\text{Jim}) \rightarrow \text{príde}(\text{Kim})) \\ \mathcal{M} &\models (\text{príde}(\text{Sarah}) \rightarrow \text{príde}(\text{Jim})) \end{aligned} \right\} \mathcal{M} \models T_{\text{party}} \end{aligned}$$

## Model teórie

**Definícia 2.29** (Model). Nech  $\mathcal{L}$  je jazyk výrokovologickej časti logiky prvého rádu a nech  $T$  je teória v jazyku  $\mathcal{L}$  a  $\mathcal{M}$  je štruktúra pre jazyk  $\mathcal{L}$ .

Teória  $T$  je *pravdivá* v  $\mathcal{M}$ , skrátene  $\mathcal{M} \models T$ , vtt *každá* formula  $X$  z  $T$  je pravdivá v  $\mathcal{M}$  (teda  $\mathcal{M} \models X$ ).

Hovoríme tiež, že  $\mathcal{M}$  je *modelom*  $T$ .

Teória  $T$  je *nepravdivá* v  $\mathcal{M}$ , skrátene  $\mathcal{M} \not\models T$ , vtt  $T$  nie je pravdivá v  $\mathcal{M}$ .

## 2.7 Správnosť a vernosť formalizácie

### Skúška správnosti formalizácie

*Správnou formalizáciou* výroku je taká formula, ktorá je pravdivá *za tých istých okolností* ako formalizovaný výrok.

Formuly dokážeme vyhodnocovať iba v štruktúrach.

Preto *za tých istých okolností* znamená *v tých istých štruktúrach*.

### Vernosť formalizácie

Výrok „Nie je pravda, že Jarka a Karol sú doma“ sa dá *správne* formalizovať ako

$$\neg(\text{doma}(\text{Jarka}) \wedge \text{doma}(\text{Karol})),$$

ale rovnako *správna* je aj formalizácia

$$(\neg \text{doma}(\text{Jarka}) \vee \neg \text{doma}(\text{Karol})),$$

lebo je pravdivá v rovnakých štruktúrach.

Pri formalizácii sa snažíme o správnosť, ale zároveň *uprednostňujeme* formalizácie, ktoré *vernejšie* zachytávajú štruktúru výroku.

Zvyšuje to pravdepodobnosť, že sme neurobili chybu, a uľahčuje hľadanie chýb.

Prvá formalizácia je vernejšia ako druhá, a preto ju uprednostníme.

### Znalosti na pozadí

Na praktických cvičeniach ste sa stretli so *znalosťami na pozadí* (background knowledge): vzájomná výlučnosť vlastností *je Nemec* a *je Rus*, ktorá v úlohe nebola explicitne uvedená.

Uprednostňujeme ich vyjadrovanie *samostatnými formulami*.  
Rovnaké dôvody ako pre vernosť.

### Skutočné súčasti významu a konverzačné implikatury

Niektoré tvrdenia *vyznievajú* silnejšie, ako naozaj sú:

- „*Prílohou sú zemiaky alebo šalát*“ môže niekomu znieť ako exkluzívna disjunkcia.
- „*Prejdete, ak všetky úlohy vyriešite na 100 %*“ znie mnohým ako ekvivalencia.

*Skutočnú časť významu tvrdenia nemôžeme poprieť* v dodatku k pôvodnému tvrdeniu bez sporu s ním.

- Keď k tvrdeniu „*Karol a Jarka sú doma*“ dodáme „*Ale Karol nie je doma,*“ dostaneme sa do sporu.

Takže „*Karol je doma*“ je skutočne časťou významu pôvodného výroku.

### Skutočné súčasti významu a konverzačné implikatury

Časť významu tvrdenia, ktorú *môžeme poprieť* dodatkami bez sporu s pôvodným tvrdením, sa nazýva *konverzačná implikatura* (H. P. Grice). *Nie je skutočnou časťou významu pôvodného tvrdenia.*

- *Prílohou sú zemiaky alebo šalát. Ale môžete si (pol na pol alebo za príplatok) dať aj oboje.*

Dodatok popiera exkluzívnosť, ale nie je v spore s tvrdením. Takže exkluzívnosť nie je súčasťou významu základného tvrdenia, je to iba konverzačná implikatura.

- *Prejdete, ak všetky úlohy vyriešite na 100 %. Ale nemusíte mať všetko na 100 %, aby ste prešli.*

Dodatok popiera implikáciu „*Prejdete, iba ak všetky úlohy vyriešite na 100 %,*“ ale nie je v spore s pôvodným tvrdením. Táto implikácia teda nie je skutočne časťou významu základného tvrdenia, je to len konverzačná implikatura.



### 3. prednáška

## Výrokovologické vyplývanie

---

### Rekapitulácia

Minulý týždeň sme hovorili o tom,

- čo sú výrokovologické spojky,
- ako zodpovedajú slovenským spojkám,
- čo sú symboly jazyka výrokovologickej časti logiky prvého rádu,
- čo sú formuly tohto jazyka,
- kedy sú formuly pravdivé v danej štruktúre.
- čo je výrokovologická teória a jej model.

## 3 Výrokovologické vyplývanie

### Logické dôsledky

Na 1. prednáške:

- Hovorili sme o tom, že logiku zaujíma, čo a prečo sú zákonitosti správneho usudzovania.
- Správne úsudky odvodzujú z predpokladov (teórií) závery, ktoré sú ich logickými dôsledkami.
- *Logickými dôsledkami* teórie sú tvrdenia, ktoré sú pravdivé vo *všetkých modeloch* teórie.

Minulý týždeň sme začali pracovať s *výrokovologickou* časťou logiky prvého rádu.

Už vieme, čo sú v nej teórie a modely.

Čo sú logické dôsledky?

### 3.1 Výrokovologické ohodnotenia

#### Nekonečne veľa štruktúr

Logickými dôsledkami teórie sú tvrdenia, ktoré sú pravdivé vo všetkých modeloch teórie.

$$T_{\text{party}} = \{((\text{príde}(\text{Kim}) \vee \text{príde}(\text{Jim})) \vee \text{príde}(\text{Sarah})), \\ (\text{príde}(\text{Kim}) \rightarrow \neg \text{príde}(\text{Sarah})), \\ (\text{príde}(\text{Jim}) \rightarrow \text{príde}(\text{Kim})), \\ (\text{príde}(\text{Sarah}) \rightarrow \text{príde}(\text{Jim}))\}$$

Ale štruktúra je nekonečne veľa a ak má teória jeden model, má aj nekonečne veľa ďalších:

$\mathcal{M}_1 = (\{k, j, s\}, i_1)$	$\mathcal{M}'_1 = (\{k, j, s, 0, 1\}, i'_1)$	$\mathcal{M}''_1 = (\{2, 4, 6\}, i''_1) \quad \dots$
$i_1(\text{Kim}) = k$	$i'_1(\text{Kim}) = k$	$i''_1(\text{Kim}) = 2$
$i_1(\text{Jim}) = j$	$i'_1(\text{Jim}) = j$	$i''_1(\text{Jim}) = 4$
$i_1(\text{Sarah}) = s$	$i'_1(\text{Sarah}) = s$	$i''_1(\text{Sarah}) = 6$
$i_1(\text{príde}) = \{k, j\}$	$i'_1(\text{príde}) = \{k, j, 1\}$	$i''_1(\text{príde}) = \{2, 4\}$

#### Rozdiely modelov

V čom sa líšia a čo majú spoločné nasledujúce modely  $T_{\text{party}}$ ?

$\mathcal{M}_1 = (\{k, j, s, e, h\}, i_1)$	$\mathcal{M}_2 = (\{1, 2, 3\}, i_2)$	$\mathcal{M}_3 = (\{kj, s\}, i_3)$
$i_1(\text{Kim}) = k$	$i_2(\text{Kim}) = 1$	$i_3(\text{Kim}) = kj$
$i_1(\text{Jim}) = j$	$i_2(\text{Jim}) = 2$	$i_3(\text{Jim}) = kj$
$i_1(\text{Sarah}) = s$	$i_2(\text{Sarah}) = 3$	$i_3(\text{Sarah}) = s$
$i_1(\text{príde}) = \{k, j, e\}$	$i_2(\text{príde}) = \{1, 2\}$	$i_3(\text{príde}) = \{kj\}$

Líšia sa doménami aj v interpretáciách.

Líšia sa v pravdivosti rovnostných atómov, napr.  $\text{Kim} \doteq \text{Jim}$ .

Zhodujú sa na pravdivosti všetkých predikátových atómov  $\text{príde}(\text{Kim})$ ,  $\text{príde}(\text{Jim})$ ,  $\text{príde}(\text{Sarah})$ .

💡 V  $T_{\text{party}}$  na ničom inom nezáleží.

## Ohodnotenie atómov

Z každej zo štruktúr

$$\mathcal{M}_1 = (\{k, j, s, e, h\}, i_1)$$

$$i_1(\text{Kim}) = k$$

$$i_1(\text{Jim}) = j$$

$$i_1(\text{Sarah}) = s$$

$$i_1(\text{príde}) = \{k, j, e\}$$

$$\mathcal{M}_2 = (\{1, 2, 3\}, i_2)$$

$$i_2(\text{Kim}) = 1$$

$$i_2(\text{Jim}) = 2$$

$$i_2(\text{Sarah}) = 3$$

$$i_2(\text{príde}) = \{1, 2\}$$

$$\mathcal{M}_3 = (\{kj, s\}, i_3)$$

$$i_3(\text{Kim}) = kj$$

$$i_3(\text{Jim}) = kj$$

$$i_3(\text{Sarah}) = s$$

$$i_3(\text{príde}) = \{kj\}$$

môžeme skonštruovať to isté *ohodnotenie predikátových atómov*:

$$v(\text{príde}(\text{Kim})) = t$$

$$v(\text{príde}(\text{Jim})) = t$$

$$v(\text{príde}(\text{Sarah})) = f$$

$$\text{lebo } \mathcal{M}_j \models \text{príde}(\text{Kim}),$$

$$\text{lebo } \mathcal{M}_j \models \text{príde}(\text{Jim}),$$

$$\text{lebo } \mathcal{M}_j \not\models \text{príde}(\text{Sarah}).$$

Všetky tieto štruktúry (a nekonečne veľa ďalších) vieme pri vyhodnocovaní formúl jazyka  $\mathcal{L}_{\text{party}}$  nahradiť týmto ohodnotením.

## Výrokovologické formuly, teórie a ohodnotenia

**Definícia 3.1.** Nech  $\mathcal{L}$  je jazyk výrokovologickej časti logiky prvého rádu.

Množinu všetkých predikátových atómov jazyka  $\mathcal{L}$  označujeme  $\mathcal{PA}_{\mathcal{L}}$ .

*Výrokovologickými formulami* jazyka  $\mathcal{L}$  nazveme všetky formuly jazyka  $\mathcal{L}$ , ktoré *neobsahujú symbol rovnosti*. Množinu všetkých výrokovologických formúl jazyka  $\mathcal{L}$  označujeme  $\mathcal{PE}_{\mathcal{L}}$ .

**Definícia 3.2.** Nech  $(f, t)$  je usporiadaná dvojica *pravdivostných hodnôt*,  $f \neq t$ , kde  $f$  predstavuje *nepravdu* a  $t$  predstavuje *pravdu*. Nech  $\mathcal{L}$  je jazyk výrokovologickej časti logiky prvého rádu.

*Výrokovologickým ohodnotením* pre  $\mathcal{L}$ , skrátene *ohodnotením*, nazveme každé zobrazenie  $v : \mathcal{PA}_{\mathcal{L}} \rightarrow \{f, t\}$ .

## Pravdivé formuly v ohodnotení

Ako vyhodnotíme, či je formula pravdivá v nejakom ohodnotení?

**Definícia 3.3.** Nech  $\mathcal{L}$  je jazyk výrokovologickej časti logiky prvého rádu, nech  $(f, t)$  sú pravdivostné hodnoty a nech  $v : \mathcal{PA}_{\mathcal{L}} \rightarrow \{f, t\}$  je výrokovologické ohodnotenie pre  $\mathcal{L}$ . Reláciu *výrokovologická formula  $A$  je pravdivá v ohodnotení  $v$*  ( $v \models_p A$ ) definujeme *induktívne* pre všetky predikátové atómy  $a$  a všetky výrokovologické formuly  $A, B$  jazyka  $\mathcal{L}$  nasledovne:

- $v \models_p a$  vtt  $v(a) = t$ ,
- $v \models_p \neg A$  vtt  $v \not\models_p A$ ,
- $v \models_p (A \wedge B)$  vtt  $v \models_p A$  a zároveň  $v \models_p B$ ,
- $v \models_p (A \vee B)$  vtt  $v \models_p A$  alebo  $v \models_p B$ ,
- $v \models_p (A \rightarrow B)$  vtt  $v \not\models_p A$  alebo  $v \models_p B$ ,

kde vtt skrakuje *vtedy a len vtedy* a  $v \not\models_p A$  skrakuje  *$A$  nie je pravdivá vo  $v$* .

### Vyhodnotenie formuly v ohodnotení

*Príklad 3.4.* Vyhodnoťme formulu

$$X = ((\text{príde}(\text{Jim}) \vee \neg \text{príde}(\text{Kim})) \rightarrow \text{príde}(\text{Sarah}))$$

vo výrokovologickom ohodnotení

$$v = \{\text{príde}(\text{Kim}) \mapsto t, \text{príde}(\text{Jim}) \mapsto t, \text{príde}(\text{Sarah}) \mapsto f\}$$

zdola nahor:

	p(Kim)	p(Jim)	p(Sarah)	$\neg p(\text{Kim})$	$(p(\text{Jim}) \vee \neg p(\text{Kim}))$	$X$
$v$	$\models_p$	$\models_p$	$\not\models_p$	$\not\models_p$	$\models_p$	$\not\models_p$

príde sme skrátili na p.

### Ohodnotenie zhodné so štruktúrou

**Definícia 3.5.** Nech  $\mathcal{L}$  je jazyk výrokovologickej časti logiky prvého rádu, nech  $\mathcal{M}$  je štruktúra pre  $\mathcal{L}$ , nech  $(f, t)$  sú pravdivostné hodnoty,  $v : \mathcal{PA}_{\mathcal{L}} \rightarrow \{f, t\}$  je výrokovologické ohodnotenie pre  $\mathcal{L}$  a  $S \subseteq \mathcal{PA}_{\mathcal{L}}$  je množina predikátových atómov.

Ohodnotenie  $v$  a štruktúra  $\mathcal{M}$  sú navzájom *zhodné na  $S$*  vtt pre každý predikátový atóm  $A \in S$  platí

$$v(A) = t \text{ vtt } \mathcal{M} \models A.$$

Ohodnotenie  $v$  a štruktúra  $\mathcal{M}$  sú navzájom *zhodné* vtt sú zhodné na  $\mathcal{PA}_{\mathcal{L}}$ .

### Konštrukcia ohodnotenia zhodného so štruktúrou

Ohodnotenie zhodné so štruktúrou zostrojíme ľahko:

**Tvrdenie 3.6.** *Nech  $\mathcal{L}$  je jazyk výrokovologickej časti logiky prvého rádu, nech  $\mathcal{M}$  je štruktúra pre  $\mathcal{L}$  a  $(f, t)$  sú pravdivostné hodnoty. Zobrazenie  $v : \mathcal{PA}_{\mathcal{L}} \rightarrow \{f, t\}$  definované pre každý atóm  $A \in \mathcal{PA}_{\mathcal{L}}$  nasledovne:*

$$v(A) = \begin{cases} t, & \text{ak } \mathcal{M} \models A, \\ f, & \text{ak } \mathcal{M} \not\models A \end{cases}$$

*je výrokovologické ohodnotenie zhodné s  $\mathcal{M}$ .*

*Dôkaz.* Pre každý atóm  $A \in \mathcal{PA}_{\mathcal{L}}$  musíme dokázať, že  $v(A) = t$  vtt  $\mathcal{M} \models A$ :

( $\Leftarrow$ ) Priamo: Ak  $\mathcal{M} \models A$ , tak  $v(A) = t$  podľa jeho definície v leme.

( $\Rightarrow$ ) Nepriamo: Ak  $\mathcal{M} \not\models A$ , tak  $v(A) = f$  podľa jeho definície v leme, a pretože  $t \neq f$ , tak  $v(A) \neq t$ . □

Dokážeme zostrojiť aj štruktúru z ohodnotenia, aby boli zhodné?

**Príklad 3.7** (Konštrukcia štruktúry zhodnej s ohodnotením). Nech  $\mathcal{L}$  je jazyk výrokovologickej časti logiky prvého rádu, kde  $\mathcal{C}_{\mathcal{L}} = \{\text{Kim}, \text{Jim}, \text{Sarah}\}$  a  $\mathcal{P}_{\mathcal{L}} = \{\text{príde}\}$ .

Nech  $v$  je výrokovologické ohodnotenie pre  $\mathcal{L}$ , kde

$$v(\text{príde}(\text{Kim})) = t \quad v(\text{príde}(\text{Jim})) = t \quad v(\text{príde}(\text{Sarah})) = f$$

Zostrojme štruktúru pre  $\mathcal{L}$  zhodnú s  $v$ .

Možnosťou, ktorú ľahko zovšeobecníme na všetky jazyky, je použiť ako doménu množinu konštánt:

$$\mathcal{M} = (\underbrace{\{\text{Kim}, \text{Jim}, \text{Sarah}\}}_{\mathcal{C}_{\mathcal{L}}}, i)$$

Každú konštantu interpretujeme ňou samou:

$$i(\text{Kim}) = \text{Kim} \qquad i(\text{Jim}) = \text{Jim} \qquad i(\text{Sarah}) = \text{Sarah}$$

predikát príde ako množinu tých  $c$ , pre ktoré  $v(\text{príde}(c)) = t$ :

$$i(\text{príde}) = \{\text{Kim}, \text{Jim}\}$$

### Konštrukcia štruktúry zhodnej s ohodnotením

Ako zostrojíme štruktúru zhodnú s ohodnotením pre hocijaký jazyk?

**Tvrdenie 3.8.** *Nech  $\mathcal{L}$  je jazyk výrokovologickej časti logiky prvého rádu, nech  $(f, t)$  sú pravdivostné hodnoty a  $v : \mathcal{PA}_{\mathcal{L}} \rightarrow \{f, t\}$  je výrokovologické ohodnotenie pre  $\mathcal{L}$ .*

*Nech  $\mathcal{M} = (D, i)$  je štruktúra pre  $\mathcal{L}$  s doménou  $D = \mathcal{C}_{\mathcal{L}}$  a interpretačnou funkciou definovanou pre všetky  $n > 0$ , všetky konštanty  $c$  a všetky predikátové symboly  $P \in \mathcal{P}_{\mathcal{L}}$  s aritou  $n$  takto:*

$$\begin{aligned} i(c) &= c \\ i(P) &= \{(c_1, \dots, c_n) \in \mathcal{C}_{\mathcal{L}}^n \mid v(P(c_1, \dots, c_n)) = t\} \end{aligned}$$

*Potom  $\mathcal{M}$  je zhodná s  $v$ .*

Štruktúram zo syntaktického materiálu sa hovorí *herbrandovské*.

Zhoda ohodnotenia a štruktúry je definované iba na *atómoch*.

Ako sa správajú na *zložitejších* formulách?

### Zhoda na všetkých výrokovologických formulách

**Tvrdenie 3.9.** *Nech  $\mathcal{L}$  je jazyk výrokovologickej časti logiky prvého rádu,  $\mathcal{M}$  je štruktúra pre  $\mathcal{L}$  a  $v$  je výrokovologické ohodnotenie pre  $\mathcal{L}$  zhodné s  $\mathcal{M}$ . Potom pre každú výrokovologickú formulu  $X \in \mathcal{PE}_{\mathcal{L}}$  platí, že  $v \models_p X$  vtt  $\mathcal{M} \models X$ .*

*Dôkaz indukciou na konštrukciu formuly.* 1.1: Nech  $X$  je rovnostný atóm. Potom nie je výrokovologickou formulou a tvrdenie preň triviálne platí.

1.2: Nech  $X$  je predikátový atóm. Potom  $v \models_p X$  vtt  $v(X) = t$  vtt  $\mathcal{M} \models X$ .

2.1: Indukčný predpoklad: Nech tvrdenie platí pre formulu  $X$ . Dokážme tvrdenie pre  $\neg X$ . Ak  $X$  neobsahuje symbol rovnosti  $\doteq$ , potom  $v \models_p \neg X$  vtt  $v \not\models_p X$  vtt (podľa IP)  $\mathcal{M} \not\models X$  vtt  $\mathcal{M} \models \neg X$ . Ak  $X$  obsahuje  $\doteq$ ,  $\neg X$  ho obsahuje tiež, teda nie je výrokovologická a tvrdenie pre ňu platí triviálne.

2.2: IP: Nech tvrdenie platí pre formuly  $X$  a  $Y$ . Dokážme ho pre  $(X \wedge Y)$ ,  $(X \vee Y)$ ,  $(X \rightarrow Y)$ . Ak  $X$  alebo  $Y$  obsahuje  $\doteq$ , tvrdenie platí pre  $(X \wedge Y)$ ,  $(X \vee Y)$ ,  $(X \rightarrow Y)$  triviálne, lebo nie sú výrokovologické.

Nech teda  $X$  ani  $Y$  neobsahuje  $\doteq$ . Potom platí  $v \models_p (X \rightarrow Y)$  vtt  $v \not\models_p X$  alebo  $v \models_p Y$  vtt (podľa IP) vtt  $\mathcal{M} \not\models X$  alebo  $\mathcal{M} \models Y$  vtt  $\mathcal{M} \models (X \rightarrow Y)$ .

Ďalej  $v \models_p (X \wedge Y)$  vtt  $v \models_p X$  a  $v \models_p Y$  vtt (podľa IP) vtt  $\mathcal{M} \models X$  a  $\mathcal{M} \models Y$  vtt  $\mathcal{M} \models (X \wedge Y)$ .

Nakoniec  $v \models_p (X \vee Y)$  vtt  $v \models_p X$  alebo  $v \models_p Y$  vtt (podľa IP) vtt  $\mathcal{M} \models X$  alebo  $\mathcal{M} \models Y$  vtt  $\mathcal{M} \models (X \vee Y)$ . □

## 3.2 Výrokovologické teórie a modely

### Výrokovologické teórie

Vráťme sa naspäť k teóriám, modelom a vyplývaniu.

**Definícia 3.10.** Nech  $\mathcal{L}$  je jazyk výrokovologickej časti logiky prvého rádu. Každú množinu výrokovologických formúl jazyka  $\mathcal{L}$  budeme nazývať *výrokovologickou teóriou* v jazyku  $\mathcal{L}$ .

*Príklad 3.11.* Výrokovologickou teóriou je

$$\begin{aligned} T_{\text{party}} = \{ & ((\text{príde}(\text{Kim}) \vee \text{príde}(\text{Jim})) \vee \text{príde}(\text{Sarah})), \\ & (\text{príde}(\text{Kim}) \rightarrow \neg \text{príde}(\text{Sarah})), \\ & (\text{príde}(\text{Jim}) \rightarrow \text{príde}(\text{Kim})), \\ & (\text{príde}(\text{Sarah}) \rightarrow \text{príde}(\text{Jim})) \}, \end{aligned}$$

ale nie

$$T_{\text{party}} \cup \{\text{Kim} \doteq \text{Sarah}\}.$$

### Príklad výrokovologického modelu

*Príklad 3.12* (Výrokovologický model teórie o party).

$$\left. \begin{array}{l} v = \{\text{príde}(\text{Kim}) \mapsto t, \text{príde}(\text{Jim}) \mapsto t, \text{príde}(\text{Sarah}) \mapsto f\} \\ v \models_p ((\text{príde}(\text{Kim}) \vee \text{príde}(\text{Jim})) \vee \text{príde}(\text{Sarah})) \\ v \models_p (\text{príde}(\text{Kim}) \rightarrow \neg \text{príde}(\text{Sarah})) \\ v \models_p (\text{príde}(\text{Jim}) \rightarrow \text{príde}(\text{Kim})) \\ v \models_p (\text{príde}(\text{Sarah}) \rightarrow \text{príde}(\text{Jim})) \end{array} \right\} v \models_p T_{\text{party}}$$

## Výrokovologický model

**Definícia 3.13** (Výrokovologický model). Nech  $\mathcal{L}$  je jazyk výrokovologickej časti logiky prvého rádu a nech  $T$  je teória v jazyku  $\mathcal{L}$  a  $v$  je výrokovologické ohodnotenie pre jazyk  $\mathcal{L}$ .

Teória  $T$  je *pravdivá* v ohodnotení  $v$ , skrátené  $v \models_p T$ , vtt každá formula  $X$  z  $T$  je pravdivá vo  $v$  (teda  $v \models_p X$  pre každú  $X \in T$ ).

Hovoríme tiež, že  $v$  je *výrokovologickým modelom*  $T$ .

Teória  $T$  je *nepravdivá* vo  $v$ , skrátené  $v \not\models_p T$ , vtt  $T$  nie je pravdivá vo  $v$ .

Zrejme  $v \not\models_p T$  vtt  $v \not\models_p X$  pre *nejakú*  $X \in T$ .

## Model teórie, splniteľnosť a nespľniteľnosť

**Definícia 3.14** (Splniteľnosť a nespľniteľnosť). Teória je *výrokovologicky splniteľná* vtt má aspoň jeden výrokovologický model.

Teória je *výrokovologicky nespľniteľná* vtt nemá žiaden výrokovologický model.

Zrejme teória nie je splniteľná vtt keď je nespľniteľná.

*Príklad 3.15.*  $T_{\text{party}}$  je evidentne splniteľná.

## 3.3 Vyplyvanie, nezávislosť a nespľniteľnosť

### Výrokovologické vyplyvanie

Ak sú množiny konštánt a predikátových symbolov jazyka konečné, jazyk má konečne veľa predikátových atómov a teda aj *konečne veľa* ohodnotení.



Uvažovať o všetkých ohodnoteniach a modeloch teórie nie je také odstrašujúce. Napríklad si ľahšie predstavíme logický dôsledok:

**Definícia 3.16.** Nech  $\mathcal{L}$  je jazyk výrokovologickej časti logiky prvého rádu a nech  $T$  je výrokovologická teória a  $X$  je výrokovologická formula, obe v jazyku  $\mathcal{L}$ .

Formula  $X$  je *výrokovologickým dôsledkom* teórie  $T$  vtt pre každé ohodnotenie  $v$  pre jazyk  $\mathcal{L}$  platí, že ak  $v \models_p T$ , tak  $v \models_p X$ .

Hovoríme tiež, že  $X$  *vyplýva* z  $T$  a píšeme  $T \models_p X$ .

Ak  $X$  *nevyplýva* z  $T$ , píšeme  $T \not\models_p X$ .

### Príklad výrokovologického vyplývania

*Príklad 3.17.* Vyplýva príde(Kim) výrokovologicky z  $T_{\text{party}}$ ? Pretože vieme vymenovať všetky ohodnotenia pre  $\mathcal{L}_{\text{party}}$ , zistíme to ľahko:

	$v_i$			$((p(K) \vee p(J)) \vee p(S))$	$(p(K) \rightarrow \neg p(S))$	$(p(J) \rightarrow p(K))$	$(p(S) \rightarrow p(J))$	$T_{\text{party}}$	$p(K)$
	$p(K)$	$p(J)$	$p(S)$						
$v_0$	$f$	$f$	$f$	$\not\models_p$				$\not\models_p$	
$v_1$	$f$	$f$	$t$	$\models_p$	$\models_p$	$\models_p$	$\not\models_p$	$\not\models_p$	
$v_2$	$f$	$t$	$f$	$\models_p$	$\models_p$	$\not\models_p$		$\not\models_p$	
$v_3$	$f$	$t$	$t$	$\models_p$	$\models_p$	$\not\models_p$		$\not\models_p$	
$v_4$	$t$	$f$	$f$	$\models_p$	$\models_p$	$\models_p$	$\models_p$	$\models_p$	$\models_p$
$v_5$	$t$	$f$	$t$	$\models_p$	$\not\models_p$			$\not\models_p$	
$v_6$	$t$	$t$	$f$	$\models_p$	$\models_p$	$\models_p$	$\models_p$	$\models_p$	$\models_p$
$v_7$	$t$	$t$	$t$	$\models_p$	$\not\models_p$			$\not\models_p$	

Skrátili sme príde na p, Kim na K, Jim na J, Sarah na S.

*Logický záver:* Formula príde(Kim) výrokovologicky vyplýva z  $T_{\text{party}}$ .

*Praktický záver:* Aby boli všetky požiadavky splnené, Kim *musí* prísť na párty.

### Príklad nezávislosti

**Príklad 3.18.** Vyplýva príde(Jim) výrokovologicky z  $T_{\text{party}}$ ?

	$v_i$			$((p(K) \vee p(J)) \vee p(S))$	$(p(K) \rightarrow \neg p(S))$	$(p(J) \rightarrow p(K))$	$(p(S) \rightarrow p(J))$	$T_{\text{party}}$	$p(J)$
	$p(K)$	$p(J)$	$p(S)$						
$v_0$	$f$	$f$	$f$	$\not\vdash_p$				$\not\vdash_p$	
$v_1$	$f$	$f$	$t$	$\vdash_p$	$\vdash_p$	$\vdash_p$	$\not\vdash_p$	$\not\vdash_p$	
$v_2$	$f$	$t$	$f$	$\vdash_p$	$\vdash_p$	$\not\vdash_p$		$\not\vdash_p$	
$v_3$	$f$	$t$	$t$	$\vdash_p$	$\vdash_p$	$\not\vdash_p$		$\not\vdash_p$	
$v_4$	$t$	$f$	$f$	$\vdash_p$	$\vdash_p$	$\vdash_p$	$\vdash_p$	$\vdash_p$	$\not\vdash_p$
$v_5$	$t$	$f$	$t$	$\vdash_p$	$\not\vdash_p$			$\not\vdash_p$	
$v_6$	$t$	$t$	$f$	$\vdash_p$	$\vdash_p$	$\vdash_p$	$\vdash_p$	$\vdash_p$	$\vdash_p$
$v_7$	$t$	$t$	$t$	$\vdash_p$	$\not\vdash_p$			$\not\vdash_p$	

**Logický záver:** Formula príde(Jim) *nevyplýva* z  $T_{\text{party}}$ .

### Výrokovologická nezávislosť

Vzťahu medzi príde(Jim) a  $T_{\text{party}}$  hovoríme *nezávislosť*.

**Definícia 3.19.** Nech  $\mathcal{L}$  je jazyk výrokovologickej časti logiky prvého rádu a nech  $T$  je výrokovologická teória a  $X$  je výrokovologická formula, obe v jazyku  $\mathcal{L}$ .

Formula  $X$  je *výrokovologicky nezávislá* od teórie  $T$  vtt existujú také ohodnotenia  $v_0$  a  $v_1$  pre jazyk  $\mathcal{L}$ , že  $v_0 \vdash_p T$  aj  $v_1 \vdash_p T$ , ale  $v_0 \not\vdash_p X$  a  $v_1 \vdash_p X$ .

**Príklad 3.20** (pokračovanie príkladu 3.18). **Logický záver:** Formula príde(Jim) je *nezávislá* od  $T_{\text{party}}$ .

**Praktický záver:** Všetky požiadavky budú naplnené *bez ohľadu na to*, či Jim príde alebo nepríde na párty. *Nie je nutné*, aby bol prítomný ani aby bol neprítomný. *Môže, ale nemusí* prísť. Jeho prítomnosť od požiadaviek *nezávisí*.

### Príklad vyplývania negácie

**Príklad 3.21.** Je príde(Sarah) výrokovologickým dôsledkom  $T_{\text{party}}$  alebo ne-

závislá od  $T_{\text{party}}$ ?

	$v_i$			$((p(K) \vee p(J)) \vee p(S))$	$(p(K) \rightarrow \neg p(S))$	$(p(J) \rightarrow p(K))$	$(p(S) \rightarrow p(J))$	$T_{\text{party}}$	$p(S)$
	$p(K)$	$p(J)$	$p(S)$						
$v_0$	$f$	$f$	$f$	$\not\vdash_p$				$\not\vdash_p$	
$v_1$	$f$	$f$	$t$	$\vdash_p$	$\vdash_p$	$\vdash_p$	$\not\vdash_p$	$\not\vdash_p$	
$v_2$	$f$	$t$	$f$	$\vdash_p$	$\vdash_p$	$\not\vdash_p$		$\not\vdash_p$	
$v_3$	$f$	$t$	$t$	$\vdash_p$	$\vdash_p$	$\not\vdash_p$		$\not\vdash_p$	
$v_4$	$t$	$f$	$f$	$\vdash_p$	$\vdash_p$	$\vdash_p$	$\vdash_p$	$\vdash_p$	$\not\vdash_p$
$v_5$	$t$	$f$	$t$	$\vdash_p$	$\not\vdash_p$			$\not\vdash_p$	
$v_6$	$t$	$t$	$f$	$\vdash_p$	$\vdash_p$	$\vdash_p$	$\vdash_p$	$\vdash_p$	$\not\vdash_p$
$v_7$	$t$	$t$	$t$	$\vdash_p$	$\not\vdash_p$			$\not\vdash_p$	

**Logický záver:** Formula príde(Sarah) nevyplýva z  $T_{\text{party}}$ , ale ani nie je nezávislá od  $T_{\text{party}}$ .

### Vyplývanie negácie

**Tvrdenie 3.22.** Nech  $\mathcal{L}$  je jazyk výrokovologickej časti logiky prvého rádu a nech  $T$  je splniteľná výrokovologická teória a  $X$  je výrokovologická formula, obe v jazyku  $\mathcal{L}$ .

Formula  $X$  nevyplýva z teórie  $T$  a nie je výrokovologicky nezávislá od  $T$  vtt  $\neg X$  vyplýva z  $T$ .

**Príklad 3.23** (pokračovanie príkladu 3.21). **Logický záver:** Z  $T_{\text{party}}$  vyplýva  $\neg \text{príde}(\text{Sarah})$ .

**Praktický záver:** Aby boli všetky požiadavky naplnené, Sarah nesmie prísť na party.

### Vzťahy teórií a formúl

Medzi ohodnotením a formulou sú iba dva vzájomne výlučné vzťahy:

Buď  $v \vdash_p X$ , alebo  $v \not\vdash_p X$ .

Medzi teóriou a formulou je viac možných vzťahov:

	existuje $v$ také, že $v \models_p T$ a $v \models_p X$	pre všetky $v$ , ak $v \models_p T$ , tak $v \not\models_p X$
existuje $v$ také, že $v \models_p T$ a $v \not\models_p X$	$X$ je nezávislá od $T$ $T \not\models_p X$ a $T \not\models_p \neg X$	$T \models_p \neg X$ a $T \not\models_p X$
pre všetky $v$ , ak $v \models_p T$ , tak $v \models_p X$	$T \models_p X$ a $T \not\models_p \neg X$	$T$ je <i>nesplniteľná</i> $T \models_p X$ aj $T \models_p \neg X$

### Nesplniteľná teória

**Príklad 3.24.** Je teória  $T'_{\text{party}} = T_{\text{party}} \cup \{(\neg \text{príde}(\text{Sarah}) \rightarrow \neg \text{príde}(\text{Kim}))\}$  splniteľná?

	$v_i$			$((p(K) \vee p(J)) \vee p(S))$	$(p(K) \rightarrow \neg p(S))$	$(p(J) \rightarrow p(K))$	$(p(S) \rightarrow p(J))$	$(\neg p(S) \rightarrow \neg p(K))$	$T'_{\text{party}}$
	$p(K)$	$p(J)$	$p(S)$						
$v_0$	$f$	$f$	$f$	$\not\models_p$					$\not\models_p$
$v_1$	$f$	$f$	$t$	$\models_p$	$\models_p$	$\models_p$	$\not\models_p$		$\not\models_p$
$v_2$	$f$	$t$	$f$	$\models_p$	$\models_p$	$\not\models_p$			$\not\models_p$
$v_3$	$f$	$t$	$t$	$\models_p$	$\models_p$	$\not\models_p$			$\not\models_p$
$v_4$	$t$	$f$	$f$	$\models_p$	$\models_p$	$\models_p$	$\models_p$	$\not\models_p$	$\not\models_p$
$v_5$	$t$	$f$	$t$	$\models_p$	$\not\models_p$				$\not\models_p$
$v_6$	$t$	$t$	$f$	$\models_p$	$\models_p$	$\models_p$	$\models_p$	$\not\models_p$	$\not\models_p$
$v_7$	$t$	$t$	$t$	$\models_p$	$\not\models_p$				$\not\models_p$

**Logický záver:**  $T'_{\text{party}}$  je nesplniteľná, vyplýva z nej každá formula.

**Praktický záver:**  $T'_{\text{party}}$  nemá praktické dôsledky, lebo *nevypovedá o žiadnom stave sveta*. Na jej základe *nevieme rozhodnúť*, kto musí alebo nesmie prísť na párty.

### Vyplývanie a nesplniteľnosť

Nesplniteľnosť ale nie neužitočná vlastnosť.

**Tvrdenie 3.25.** Nech  $\mathcal{L}$  je jazyk výrokovologickej časti logiky prvého rádu a nech  $T$  je splniteľná výrokovologická teória a  $X$  je výrokovologická formula, obe v jazyku  $\mathcal{L}$ .

Formula  $X$  výrokovologicky vyplýva z teórie  $T$  vtt  $T \cup \{\neg X\}$  je výrokovologicky nesplniteľná.

Podľa tohto tvrdenia sa rozhodnutie vyplývania dá *zredukovať* na rozhodnutie splniteľnosti.

Výrokovologickú splniteľnosť rozhoduje SAT solver.

### Množina atómov formuly a teórie

**Definícia 3.26.** *Množinu atómov*  $\text{atoms}(X)$  formuly  $X \in \mathcal{E}_{\mathcal{L}}$  definujeme pre všetky formuly  $A, B \in \mathcal{E}_{\mathcal{L}}$  nasledovne:

- $\text{atoms}(A) = \{A\}$ , ak  $A$  je atóm,
- $\text{atoms}(\neg A) = \text{atoms}(A)$ ,
- $\text{atoms}((A \wedge B)) = \text{atoms}((A \vee B)) = \text{atoms}((A \rightarrow B)) = \text{atoms}(A) \cup \text{atoms}(B)$ .

*Množinou atómov teórie  $T$  je*

$$\text{atoms}(T) = \bigcup_{X \in T} \text{atoms}(X).$$

### Ohodnotenia zhodné na atómoch teórie

**Definícia 3.27.** Nech  $\mathcal{L}$  je jazyk výrokovologickej časti logiky prvého rádu, nech  $M \subseteq \mathcal{PA}_{\mathcal{L}}$ . Ohodnotenia  $v_1$  a  $v_2$  sa *zhodujú* na množine  $M$  vtt  $v_1(A) = v_2(A)$  pre každý atóm  $A \in M$ .

**Tvrdenie 3.28.** *Nech  $\mathcal{L}$  je jazyk výrokovologickej časti logiky prvého rádu. Pre každú výrokovologickú teóriu  $T$  a formulu  $X$  jazyka  $\mathcal{L}$  a všetky ohodnotenia  $v_1$  a  $v_2$ , ktoré zhodujú na množine  $\text{atoms}(T) \cup \text{atoms}(X)$  platí*

- $v_1 \models_p T$  vtt  $v_2 \models_p T$ ,
- $v_1 \models_p X$  vtt  $v_2 \models_p X$ .

## Ohodnotenia postačujúce na skúmanie teórií

Inak povedané: Pravdivosť formuly/teórie v ohodnotení závisí *iba* od pravdivostných hodnôt tých atómov, ktoré sa v nej vyskytujú.

Takže na zistenie vyplývania, nezávislosti, splniteľnosti stačí preskúmať všetky ohodnotenia, ktoré sa *lišia* na atómoch *vyskytujúcich* sa vo formule a teórii.

Pokiaľ je teória je konečná, stačí skúmať konečne veľa ohodnotení, aj keby bol jazyk nekonečný.


## Rekapitulácia

### Rekapitulácia

Dnes sme sa naučili:

- ako zjednodušiť štruktúry na výrokovologické ohodnotenia,
- čo je logické vyplývanie z teórie a logický dôsledok teórie,
- čo je nezávislosť formuly od teórie,
- štyri situácie vo vzťahoch teórií a formúl a ich praktické dôsledky,
- čo sú splniteľné a nesplniteľné teórie,
- ako súvisí nesplniteľnosť a vyplývanie.

## Schéma riešenia problémov pomocou logiky



## XOR

Logická spojka exclusive or (XOR):

$a$	$b$	$a \oplus b$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

- zodpovedá sčítaniu v poli  $\mathbb{Z}_2$
- komutatívna a asociatívna
- rýchlo vypočítateľná, aj na úrovni hardvéru
- dôležitá v kryptológii

## XOR

Ideálna šifra: vezmeme náhodný reťazec (kľúč) rovnako dlhý ako správa a spravíme XOR bit po bite. Použitý kľúč zahodíme. Všetky zašifrované texty sú rovnako pravdepodobné.

Reálne šifry: kľúč je krátky (napr. 1024 B). Ak by sme ho nakopírovali veľakrát za sebou, bity správy šifrované tým istým bitom kľúča vytvoria slabinu (možno dešifrovať aj bez znalosti kľúča, stačí uhádnuť jeho dĺžku). Preto napr. použijeme kľúč ako seed do pseudonáhodného generátora a vygenerujeme reťazec potrebnej dĺžky.

Útoky na šifry: o.i. pomocou SAT solvera, ktorý vie pracovať s XOR (aktívna oblasť výskumu).

## XOR

Ku XOR existuje prepis do CNF, napr. z  $a \oplus b \oplus c$  sa stane  $(a \vee b \vee c) \wedge (a \vee \neg b \vee \neg c) \wedge (b \vee \neg a \vee \neg c) \wedge (c \vee \neg a \vee \neg b)$

Ale s počtom premenných rastie dĺžka ekvivalentnej CNF formuly exponenciálne. Preto sa oplatí predspracovanie: XOR formuly vnímame ako súčty nad  $\mathbb{Z}_2$  a použijeme Gaussovu elimináciu.

$$a_1 \oplus a_2 \oplus a_3 = 0$$

$$a_1 \oplus a_3 \oplus a_4 = 0$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & | & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & | & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & | & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & | & 0 \end{pmatrix}$$



## 4. prednáška

# Vlastnosti a vzťahy výrokovologických formúl

---

### Rekapitulácia

Minulý týždeň sme:

- *zjednodušili* pohľad na možné stavy sveta zo štruktúr na *výrokovologické* ohodnotenia,
- zistili sme, že na zistenie vyplývania/logických dôsledkov stačí pre konečné teórie skúmať konečne veľa ohodnotení, ktoré zastúpia nekonečne veľa štruktúr,
- presne sme zadefinovali vzťahy medzi teóriou a formulou z hľadiska ohodnotení:
  - výrokovologické vyplývanie,
  - výrokovologickú nezávislosť.

## 4 Vlastnosti a vzťahy výrokovologických formúl

### 4.1 Tautológie, splniteľné, falzifikovateľné a nesplniteľné formuly

#### Logické dôsledky prázdnej teórie

Tvrdenie vyplýva z nejakej teórie (je jej logickým dôsledkom), keď je pravdivé v každom modeli teórie, teda v každom stave sveta, v ktorom sú pravdivé všetky tvrdenia teórie.

Čo keď je teória *prázdna*?

- Je pravdivá v *každom* stave sveta.
- Jej logické dôsledky sú teda *tiež* pravdivé v každom stave sveta.

Navyše:

- Každý model hocijakej neprázdnej teórie  $T$  je aj modelom prázdnej teórie.
- Logické dôsledky prázdnej teórie sú v ňom pravdivé.
- Preto sú aj logickými dôsledkami  $T$ .

Logické dôsledky prázdnej teórie sú teda dôsledkami *všetkých* teórií.

### Príklady logických dôsledkov prázdnej teórie

*Existujú vôbec logické dôsledky prázdnej teórie?*

*Áno, napríklad:*

- pre každú konštantu  $c$  je pravdivé tvrdenie  $c \doteq c$ ;
- pre každý atóm  $A$  je pravdivé  $(A \vee \neg A)$ .

Pretože sú pravdivé bez ohľadu na teóriu a sú pravdivé v každom stave sveta, sú *logickými pravdami* a sú *nutne* pravdivé.

### Rozpoznateľné logické pravdy

Jazyk a spôsob pohľadu na stavy sveta ovplyvňuje, ktoré logické pravdy dokážeme rozpoznať:

- $c \doteq c$  aj  $(A \vee \neg A)$  sú pravdivé v každej štruktúre.
- Výrokovologické ohodnotenia sa nezaoberajú rovnostnými atómami. Pomocou nich nezistíme, že  $c \doteq c$  je nutne pravda. Ale zistíme, že  $(A \vee \neg A)$  pre každý *predikátový* atóm  $A$  je pravdivé v každom ohodnotení, a teda je nutne pravdou.

Logickým pravdám, ktorých nutnú pravdivosť dokážeme určiť rozborom všetkých výrokovologických ohodnotení, hovoríme *tautológie*.

### Príklad tautológie

**Príklad 4.1** (Peirceov zákon). Majme jazyk  $\mathcal{L}$  s  $\mathcal{C}_{\mathcal{L}} = \{a, b\}$ ,  $\mathcal{P}_{\mathcal{L}} = \{p^1\}$ . Je formula  $X = (((p(a) \rightarrow p(b)) \rightarrow p(a)) \rightarrow p(a))$  tautológiou?

Označme  $A = p(a)$  a  $B = p(b)$ , teda  $X = (((A \rightarrow B) \rightarrow A) \rightarrow A)$  a preskúmame všetky výrokovologické ohodnotenia týchto atómov:

$v_i$		$X$			
$A$	$B$	$(A \rightarrow B)$	$((A \rightarrow B) \rightarrow A)$	$((((A \rightarrow B) \rightarrow A) \rightarrow A)$	
$v_0$	$f$	$f$	$\models_p$	$\not\models_p$	$\models_p$
$v_1$	$f$	$t$	$\models_p$	$\not\models_p$	$\models_p$
$v_2$	$t$	$f$	$\not\models_p$	$\models_p$	$\models_p$
$v_3$	$t$	$t$	$\models_p$	$\models_p$	$\models_p$

Pretože  $X$  je pravdivá vo všetkých ohodnoteniach pre  $\mathcal{L}$ ,  $X$  je tautológiou.

## Tautológia

**Definícia 4.2.** Nech  $\mathcal{L}$  je jazyk výrokovologickej časti logiky prvého rádu. Nech  $X$  je výrokovologická formula. Formulu  $X$  nazveme *tautológiou* (skrátene  $\models_p X$ ) vtt  $X$  je pravdivá v každom výrokovologickom ohodnotení  $v$  pre  $\mathcal{L}$  (teda pre každé výrokovologické ohodnotenie  $v$  pre  $\mathcal{L}$  platí  $v \models_p X$ ).

Definícia vyžaduje preveriť všetky možné ohodnotenia pre  $\mathcal{L}$ , teda ohod-

		$v_i$			
		$A_1$	$A_2$	$\dots$	$X$
notenia všetkých predikátových atómov jazyka $\mathcal{L}$ . Ale...	$v_0$	$f$	$f$	$\dots$	$\models_p$
	$v_1$	$f$	$f$	$\dots$	$\models_p$
			$\dots$		
	$v_k$	$t$	$f$	$\dots$	$\models_p$
			$\dots$		

## Postačujúca podmienka pre tautológiu

Na konci minulej prednášky sme spomenuli, že platí:

**Tvrdenie 4.3.** Nech  $\mathcal{L}$  je jazyk výrokovologickej časti logiky prvého rádu a nech  $X$  je výrokovologická formula jazyka  $\mathcal{L}$ . Pre všetky ohodnotenia  $v_1$  a  $v_2$ , ktoré zhodujú na množine  $\text{atoms}(X)$ , platí  $v_1 \models_p X$  vtt  $v_2 \models_p X$ .

Na zistenie, či formula je tautológia, teda stačí teda preverovať ohodnotenia atómov vyskytujúcich sa vo formule:

**Dôsledok 4.4.** *Nech  $\mathcal{L}$  je jazyk výrokovologickej časti logiky prvého rádu a nech  $X$  je výrokovologická formula jazyka  $\mathcal{L}$ . Formula  $X$  je tautológiou vtt  $X$  je pravdivá v každom výrokovologickom ohodnotení  $v : \text{atoms}(X) \rightarrow \{f, t\}$ .*

#### Dôkaz indukciou na konštrukciu formuly

- (1)  $X$  je výrokovologická formula jazyka  $\mathcal{L}$
- (2)  $v_1$  a  $v_2$  sú ohodnotenia zhodné na  $\text{atoms}(X)$   $\Downarrow v_1 \models_p X$  vtt  $v_2 \models_p X$

Báza:  $X$  je atóm.

- (3)  $X$  predikátový atóm      podľa 1
- (4)  $v_1 \models_p X$  vtt  $v_1(X) = t$       def. pravdivosti
- (5)  $v_2 \models_p X$  vtt  $v_2(X) = t$       def. pravdivosti
- (6)  $v_1(X) = v_2(X)$       podľa 2
- $v_1 \models_p X$  vtt  $v_2 \models_p X$       podľa 4, 5, 6

#### Dôkaz indukciou na konštrukciu formuly

- (1)  $Z$  je výrokovologická formula jazyka  $\mathcal{L}$
- (2)  $v_1$  a  $v_2$  sú ohodnotenia zhodné na  $\text{atoms}(Z)$   $\Downarrow v_1 \models_p Z$  vtt  $v_2 \models_p Z$

Ind. krok pre  $\neg$ : Formula v tvare  $Z = \neg X$ .

- (IP) Tvrdenie platí pre  $X$
- (3)  $v_1, v_2$  sa zhodujú na  $\text{atoms}(X)$       2,  $\text{atoms}(\neg X) = \text{atoms}(X)$
- (4)  $v_1 \models_p X$  vtt  $v_2 \models_p X$       3, IP pre  $Z = X$
- (5)  $v_1 \models_p \neg X$  vtt  $v_1 \not\models_p X$       def.  $\models_p$
- (6)  $v_2 \models_p \neg X$  vtt  $v_2 \not\models_p X$       def.  $\models_p$
- (7)  $v_1 \not\models_p X$  vtt  $v_2 \not\models_p X$       4, def.  $\not\models_p$
- $v_1 \models_p \neg X$  vtt  $v_2 \models_p \neg X$       5, 6, 7

## Dôkaz indukciou na konštrukciu formuly

- (1)  $Z$  je výrokovologická formula jazyka  $\mathcal{L}$   
 (2)  $v_1$  a  $v_2$  sú ohodnotenia zhodné na  $\text{atoms}(Z)$   $\Downarrow v_1 \models_p Z \text{ vtt } v_2 \models_p Z$

Ind. krok pre  $\wedge$ : Formula v tvare  $Z = (X \wedge Y)$ .

- (IP) Tvrdenie platí pre  $X$  aj pre  $Y$
- |     |  |                   |
|-----|--|-------------------|
| (3) | $\text{atoms}((X \wedge Y)) = \text{atoms}(X) \cup \text{atoms}(Y)$                  | def. atoms        |
| (4) | $v_1, v_2$ sa zhodujú na $\text{atoms}(X)$   | 2, 3              |
| (5) | $v_1 \models_p X \text{ vtt } v_2 \models_p X$                                       | 4, IP pre $Z = X$ |
| (6) | $v_1, v_2$ sa zhodujú na $\text{atoms}(Y)$   | 2, 3              |
| (7) | $v_1 \models_p Y \text{ vtt } v_2 \models_p Y$                                       | 6, IP pre $Z = Y$ |
| (8) | $v_1 \models_p (X \wedge Y) \text{ vtt } v_1 \models_p X \text{ a } v_1 \models_p Y$ | def. $\models_p$  |
| (9) | $v_2 \models_p (X \wedge Y) \text{ vtt } v_2 \models_p X \text{ a } v_2 \models_p Y$ | def. $\models_p$  |
|     | $v_1 \models_p (X \wedge Y) \text{ vtt } v_2 \models_p (X \wedge Y)$                 | 5, 7, 8, 9        |

*Dôkaz tvrdenia 4.3 (ešte raz, vo vetách).* Tvrdenie dokážeme indukciou na konštrukciu formuly:

1.1. Ak  $X$  je rovnostný atóm, nie je výrokovologickou formulou a tvrdenie preň platí triviálne.

1.2. Nech  $X$  je predikátový atóm. Zoberme ľubovoľné ohodnotenia  $v_1$  a  $v_2$ , ktoré sa zhodujú na  $\text{atoms}(X)$ , teda na samotnom  $X$ . Podľa definície pravdivosti platí  $v_1 \models_p X \text{ vtt } v_1(X) = t \text{ vtt } v_2(X) = t \text{ vtt } v_2 \models_p X$ .

2.1 Indukčný predpoklad (IP): Predpokladajme, že tvrdenie platí pre formulu  $X$ . Dokážme ho pre  $\neg X$ . Zoberme ľubovoľné ohodnotenia  $v_1$  a  $v_2$ , ktoré sa zhodujú na  $\text{atoms}(\neg X)$ . Pretože  $\text{atoms}(\neg X) = \text{atoms}(X)$ ,  $v_1$  a  $v_2$  sa zhodujú na  $\text{atoms}(X)$ , a teda podľa IP  $v_1 \models_p X \text{ vtt } v_2 \models_p X$ . Preto  $v_1 \models_p \neg X \text{ vtt (def. } \models_p) v_1 \not\models_p X \text{ vtt (IP) } v_2 \not\models_p X \text{ vtt (def. } \models_p) v_2 \models_p \neg X$ .

2.2 Indukčný predpoklad (IP): Predpokladajme, že tvrdenie platí pre formulu  $X$  a  $Y$ . Dokážme ho pre  $(X \wedge Y)$ . Zoberme ľubovoľné ohodnotenia  $v_1$  a  $v_2$ , ktoré sa zhodujú na  $\text{atoms}((X \wedge Y))$ . Pretože  $\text{atoms}((X \wedge Y)) = \text{atoms}(X) \cup \text{atoms}(Y)$ ,  $v_1$  a  $v_2$  sa zhodujú na  $\text{atoms}(X)$ , a teda podľa IP  $v_1 \models_p X \text{ vtt } v_2 \models_p X$ ; tiež sa zhodujú na  $\text{atoms}(Y)$ , a teda podľa IP  $v_1 \models_p Y \text{ vtt } v_2 \models_p Y$ . Preto  $v_1 \models_p (X \wedge Y) \text{ vtt (def. } \models_p) v_1 \models_p X \text{ a } v_1 \models_p Y \text{ vtt (IP) } v_2 \models_p X \text{ a } v_2 \models_p Y \text{ vtt (def. } \models_p) v_2 \models_p (X \wedge Y)$ .

Podobne postupujeme pre ďalšie binárne spojky. □

## Tautológie a vyplývanie

**Tvrdenie 4.5** (Tautológie, vyplývanie a jeho monotónnosť). *Nech  $\mathcal{L}$  je jazyk výrokovologickej časti logiky prvého rádu. Nech  $A$  je výrokovologická formula v  $\mathcal{L}$ . Nech  $T_1$  a  $T_2$  sú výrokovologické teórie v  $\mathcal{L}$ . Potom:*

- a)  $\models_p A$  ( $A$  je tautológia) vtt  $\emptyset \models_p A$  ( $A$  vyplýva z prázdnej teórie).
- b)  $T_1 \models_p A$  a  $T_1 \subseteq T_2$ , tak  $T_2 \models_p A$ .
- c)  $\models_p A$  vtt pre každú teóriu  $T$  v  $\mathcal{L}$ ,  $T \models_p A$ .

## Splniteľnosť

Kým tautológie sú *nutne* pravdivé, teda pravdivé vo *všetkých* ohodnoteniach, mnohé formuly iba *môžu* byť pravdivé, teda sú pravdivé v *niektorých* ohodnoteniach.

Nazývame ich *splniteľné*.

$v_i$				
	$A_1$	$A_2$	$\dots$	$X$
$v_0$	$f$	$f$	$\dots$	$\not\models_p$
$v_1$	$f$	$f$	$\dots$	$\not\models_p$
		$\dots$		
$v_k$	$t$	$f$	$\dots$	$\models_p$
		$\dots$		

**Definícia 4.6.** Nech  $\mathcal{L}$  je jazyk výrokovologickej časti logiky prvého rádu. Nech  $X$  je výrokovologická formula. Formulu  $X$  nazveme *splniteľnou* vtt  $X$  je *pravdivá* v *nejakom* výrokovologickom ohodnotení pre  $\mathcal{L}$  (teda *existuje* také výrokovologické ohodnotenie  $v$  pre  $\mathcal{L}$ , že  $v \models_p X$ ).

## Falzifikovateľnosť

Na rozdiel od tautológií, ktoré sú *nutne* pravdivé, a teda *nemôžu* byť *nepravdivé*, mnohé formuly *môžu* byť *nepravdivé*, teda sú *nepravdivé* v *niektorých* ohodnoteniach.

Nazývame ich *falzifikovateľné*.

$v_i$				
	$A_1$	$A_2$	$\dots$	$X$
$v_0$	$f$	$f$	$\dots$	$\models_p$
$v_1$	$f$	$f$	$\dots$	$\models_p$
		$\dots$		
$v_k$	$t$	$f$	$\dots$	$\not\models_p$
		$\dots$		

**Definícia 4.7.** Nech  $\mathcal{L}$  je jazyk výrokovologickej časti logiky prvého rádu. Nech  $X$  je výrokovologická formula. Formulu  $X$  nazveme *falzifikovateľnou* vtt  $X$  je *nepravdivá* v *nejakom* výrokovologickom ohodnotení pre  $\mathcal{L}$  (teda *existuje* také výrokovologické ohodnotenie  $v$  pre  $\mathcal{L}$ , že  $v \not\models_p X$ ).

### Nesplniteľnosť


Nakoniec, mnohé formuly sú *nutne nepravdivé*, teda sú *nepravdivé* vo *všetkých* ohodnoteniach.

Nazývame ich *nesplniteľné*.

$v_i$				
	$A_1$	$A_2$	$\dots$	$X$
$v_0$	$f$	$f$	$\dots$	$\not\models_p$
$v_1$	$f$	$f$	$\dots$	$\not\models_p$
		$\dots$		
$v_k$	$t$	$f$	$\dots$	$\not\models_p$
		$\dots$		

**Definícia 4.8.** Nech  $\mathcal{L}$  je jazyk výrokovologickej časti logiky prvého rádu. Nech  $X$  je výrokovologická formula. Formulu  $X$  nazveme *nesplniteľnou* vtt  $X$  je *nepravdivá* v *každom* výrokovologickom ohodnotení pre  $\mathcal{L}$  (teda pre *každé* výrokovologické ohodnotenie  $v$  pre  $\mathcal{L}$ , platí  $v \not\models_p X$ ).

„Geografia“ formúl podľa pravdivosti vo všetkých ohodnoteniach



Obrázok podľa [Papadimitriou \[1994\]](#)

## 4.2 Ekvivalencia

### Logická ekvivalencia

Dve tvrdenia sú *ekvivalentné*, ak sú v každom stave sveta buď obe pravdivé alebo obe nepravdivé.

Ekvivalentné tvrdenia sú navzájom nahraditeľné. To je výhodné vtedy, keď potrebujeme, aby tvrdenie malo nejaký požadovaný tvar, alebo používalo iba niektoré spojky. Napríklad vstupom pre SAT solver je teória zložená iba z disjunkcií literálov.

Podobne ako pri tautológiách môžeme pomocou skúmania všetkých ohodnotení rozpoznať *niektoré* ekvivalentné tvrdenia zapísané formulami (ale nie všetky, pretože ohodnotenia napríklad nedávajú význam rovnostným atómom).

### Príklad výrokovologickej ekvivalentných formul

*Príklad 4.9.* V jazyku  $\mathcal{L}$  z príkladu 4.1 označme  $A = p(a)$  a  $B = p(b)$ . Sú formuly  $X = \neg(A \rightarrow \neg B)$  a  $Y = (A \wedge B)$  výrokovologickej ekvivalentné?



Preskúmajme všetky výrokovologické ohodnotenia atómov  $A$  a  $B$ :


$v_i$				$X$		$Y$
$A$	$B$	$\neg B$	$(A \rightarrow \neg B)$	$\neg(A \rightarrow \neg B)$	$(A \wedge B)$	
$v_0$	$f$	$f$	$\models_p$	$\models_p$	$\not\models_p$	$\not\models_p$
$v_1$	$f$	$t$	$\not\models_p$	$\models_p$	$\not\models_p$	$\not\models_p$
$v_2$	$t$	$f$	$\models_p$	$\models_p$	$\not\models_p$	$\not\models_p$
$v_3$	$t$	$t$	$\not\models_p$	$\models_p$	$\models_p$	$\models_p$

$X$  je pravdivá v *práve tých* ohodnoteniach pre  $\mathcal{L}$ , v ktorých je pravdivá  $Y$ , preto  $X$  a  $Y$  sú výrokovologicky ekvivalentné.

## Výrokovogická ekvivalencia

**Definícia 4.10.** Nech  $\mathcal{L}$  je jazyk výrokovologickej časti logiky prvého rádu. Nech  $X$  a  $Y$  sú výrokovologické formuly jazyka  $\mathcal{L}$ . Formuly  $X$  a  $Y$  sú *výrokovologicky ekvivalentné*, skrátené  $X \Leftrightarrow_p Y$  vtt pre *každé* výrokovologické ohodnotenie  $v$  pre jazyk  $\mathcal{L}$  platí, že  $X$  je pravdivá vo  $v$  vtt  $Y$  je pravdivá vo  $v$ .

$\Leftrightarrow_p$  **verzus**  $\leftrightarrow$

 **Pozor!** Nemýľte si zápis  $X \Leftrightarrow_p Y$  s formulou  $(X \leftrightarrow Y)$ .

- $X \Leftrightarrow_p Y$  je skrátené vyjadrenie vzťahu dvoch formúl podľa definície 4.10. Keď napíšeme  $X \Leftrightarrow_p Y$ , tvrdíme tým, že  $X$  a  $Y$  sú výrokovologicky ekvivalentné formuly (alebo sa pýtame, či to tak je).
- $(X \leftrightarrow Y)$  je formula, postupnosť symbolov, ktorá môže byť pravdivá v nejakom ohodnotení a nepravdivá v inom, môže byť splniteľná, tautológia, falzifikovateľná, nespĺniteľná, môže vyplývať, či byť nezávislá od nejakej teórie, alebo môže byť výrokovologicky ekvivalentná s inou formulou.

Medzi  $X \Leftrightarrow_p Y$  a  $(X \leftrightarrow Y)$  je vzťah, ktorý si ozrejníme neskôr.

## Známe ekvivalencie

O mnohých dvojiciach formúl už viete, že sú vzájomne ekvivalentné. Zhrnuli sme ich do nasledujúcej vety.

## Známe ekvivalencie

**Veta 4.11.** *Nech  $\mathcal{L}$  je jazyk výrokovologickej časti logiky prvého rádu. Nech  $A$ ,  $B$  a  $C$  sú ľubovoľné výrokovologické formuly jazyka  $\mathcal{L}$ . Potom:*

$(A \rightarrow B) \Leftrightarrow_p (\neg A \vee B)$	nahradenie $\rightarrow$
$(A \wedge (B \wedge C)) \Leftrightarrow_p ((A \wedge B) \wedge C)$	asociatívnosť $\wedge$
$(A \vee (B \vee C)) \Leftrightarrow_p ((A \vee B) \vee C)$	asociatívnosť $\vee$
$(A \wedge B) \Leftrightarrow_p (B \wedge A)$	komutatívnosť $\wedge$
$(A \vee B) \Leftrightarrow_p (B \vee A)$	komutatívnosť $\vee$
$(A \wedge (B \vee C)) \Leftrightarrow_p ((A \wedge B) \vee (A \wedge C))$	distributívnosť $\wedge$ cez $\vee$
$(A \vee (B \wedge C)) \Leftrightarrow_p ((A \vee B) \wedge (A \vee C))$	distributívnosť $\vee$ cez $\wedge$

**Veta 4.11** (pokračovanie).

$\neg(A \wedge B) \Leftrightarrow_p (\neg A \vee \neg B)$	de Morganove
$\neg(A \vee B) \Leftrightarrow_p (\neg A \wedge \neg B)$	zákony
$\neg\neg A \Leftrightarrow_p A$	zákon dvojitej negácie
$(A \wedge A) \Leftrightarrow_p A$	idempotencia pre $\wedge$
$(A \vee A) \Leftrightarrow_p A$	idempotencia pre $\vee$
$(A \wedge \top) \Leftrightarrow_p A$	identita pre $\wedge$
$(A \vee \perp) \Leftrightarrow_p A$	identita pre $\vee$
$(A \vee (A \wedge B)) \Leftrightarrow_p A$	absorpcia
$(A \wedge (A \vee B)) \Leftrightarrow_p A$	
$(A \vee \neg A) \Leftrightarrow_p \top$	vylúčenie tretieho ( <i>tertium non datur</i> )
$(A \wedge \neg A) \Leftrightarrow_p \perp$	spor,

kde  $\top$  je ľubovoľná tautológia a  $\perp$  je ľubovoľná nesplniteľná formula.

## Všeobecné dôkazy známych ekvivalencií

Pre *konkrétne* dvojice formúl v konkrétnom jazyku sa ekvivalencia dá dokázať rozborom všetkých ohodnotení ako v príklade 4.9.

Dôkaz ekvivalencie  $(A \rightarrow B)$  a  $(\neg A \vee B)$  pre ľubovoľné formuly  $A$  a  $B$  vyžaduje *opatrnější* postup.

Nemôžeme predpokladať, že  $A$  a  $B$  sú atomické a ohodnotenia im *priamo* priradujú pravdivostné hodnoty  $f$  a  $t$  (ak napr.  $A = (p(a) \wedge \neg p(a))$ , tak  $v(A)$  nie je definované, definované sú iba  $v(p(a))$  a  $v(p(b))$ ).

Môžeme však:

1. zobrať ľubovoľné ohodnotenie  $v$ ,
2. rozobrať všetky prípady, akými môžu byť  $A$  a  $B$  pravdivé alebo nepravdivé v tomto ohodnotení (teda  $v \models_p A$  a  $v \models_p B$ ,  $v \models_p A$  a  $v \not\models_p B$ ,  $v \not\models_p A$  a  $v \models_p B$ ,  $v \not\models_p A$  a  $v \not\models_p B$ )
3. a ukázať, že v každom prípade je  $(A \rightarrow B)$  pravdivá vo  $v$  vtt je  $(\neg A \vee B)$  pravdivá vo  $v$ .

*Príklad 4.12* (Dôkaz prvej ekvivalentnej dvojice z vety 4.11). Nech  $A$  a  $B$  sú ľubovoľné výrokovologické formuly v ľubovoľnom jazyku  $\mathcal{L}$ .

Nech  $v$  je ľubovoľné ohodnotenie pre  $\mathcal{L}$ . V tomto ohodnotení môže byť každá z formúl  $A$  a  $B$  buď pravdivá alebo nepravdivá, a teda môžu nastať nasledovné prípady:

- $v \not\models_p A$  a  $v \not\models_p B$ , vtedy  $v \models_p (A \rightarrow B)$  a  $v \models_p (\neg A \vee B)$ ;
- $v \not\models_p A$  a  $v \models_p B$ , vtedy  $v \models_p (A \rightarrow B)$  a  $v \models_p (\neg A \vee B)$ ;
- $v \models_p A$  a  $v \not\models_p B$ , vtedy  $v \not\models_p (A \rightarrow B)$  a  $v \not\models_p (\neg A \vee B)$ ;
- $v \models_p A$  a  $v \models_p B$ , vtedy  $v \models_p (A \rightarrow B)$  a  $v \models_p (\neg A \vee B)$ .

Rozobrali sme *všetky prípady* pravdivosti  $A$  a  $B$  v ohodnotení  $v$  a aj keď sa prípady od seba líšia pravdivosťou  $(A \rightarrow B)$  a  $(\neg A \vee B)$ , v *každom prípade* platí, že  $v \models_p (A \rightarrow B)$  vtt  $v \models_p (\neg A \vee B)$ . Preto môžeme konštatovať, že bez ohľadu na to, ktorý prípad nastáva, v ohodnotení  $v$  platí, že  $v \models_p (A \rightarrow B)$  vtt  $v \models_p (\neg A \vee B)$ .

Pretože ohodnotenie  $v$  bolo ľubovoľné, môžeme toto konštatovanie *zovšeobecniť* na všetky ohodnotenia pre  $\mathcal{L}$  a podľa definície 4.10 sú  $(A \rightarrow B)$  a  $(\neg A \vee B)$  výrokovologicky ekvivalentné.

## Dôkazy rozborom prípadov

Rozbor prípadov z odrážkového zoznamu v predchádzajúcom dôkaze môžeme zapísať do *podobnej* tabuľky ako v príklade 4.9:

	$A$	$B$	$(A \rightarrow B)$	$(\neg A \vee B)$
$v$	$\not\models_p$	$\not\models_p$	$\not\models_p$	$\not\models_p$
$v$	$\not\models_p$	$\models_p$	$\models_p$	$\models_p$
$v$	$\models_p$	$\not\models_p$	$\not\models_p$	$\not\models_p$
$v$	$\models_p$	$\models_p$	$\models_p$	$\models_p$

Vždy ju však treba doplniť

1. úvodom o ľubovoľnom ohodnotení,
2. úvodom k rozboru prípadov,
3. záverom o všetkých prípadoch,
4. záverom o všetkých ohodnoteniach.

Podobne môžeme uvažovať o tautológiách, nesplniteľnosti, aj vyplývaní.

## 4.3 Vzťah tautológií, vyplývania a ekvivalencie

### Tautológie a vyplývanie

Tautológie nie sú zaujímavé iba preto, že sú logickými pravdami.

Kedy je formula  $((A_1 \wedge A_2) \rightarrow B)$  tautológia?

Vtedy, keď je pravdivá v každom ohodnotení, teda keď v každom ohodnotení  $v$  máme  $v \models_p (A_1 \wedge A_2)$  alebo  $v \models_p B$ , čiže keď v každom ohodnotení  $v$ , v ktorom  $v \models_p (A_1 \wedge A_2)$ , máme aj  $v \models_p B$  teda keď v každom ohodnotení  $v$ , v ktorom  $v \models_p A_1$  a  $v \models_p A_2$ , máme aj  $v \models_p B$ , teda keď z  $\{A_1, A_2\}$  výrokovologicky vyplýva  $B$ .

### Vzťahy výrokovologického vyplývania a tautológií

Pripomeňme, že podľa tvrdenia 4.5:  $\emptyset \models_p A$  vtt  $\models_p A$ .

**Tvrdenie 4.13** (Sémantická verzia vety od dedukcii). *Nech  $\mathcal{L}$  je jazyk výrokovologickej časti logiky prvého rádu. Nech  $T$  je výrokovologická teória, nech  $A, B, C$  sú výrokovologické formuly v  $\mathcal{L}$ . Potom:*

a)  $T \cup \{A\} \models_p C$  vtt  $T \models_p (A \rightarrow C)$ .

b)  $T \cup \{A, B\} \models_p C$  vtt  $T \cup \{(A \wedge B)\} \models_p C$ .

**Dôsledok 4.14** (Redukcia vyplývania na tautológiu). *Nech  $\mathcal{L}$  je jazyk výrokovologickej časti logiky prvého rádu. Nech  $A_1, A_2, \dots, A_n$  a  $C$  sú výrokovologické formuly v jazyku  $\mathcal{L}$ . Potom  $\{A_1, \dots, A_n\} \models_p C$  vtt  $\models_p (((\dots (A_1 \wedge A_2) \wedge \dots) \wedge A_n) \rightarrow C)$ .*

*Dôkaz tvrdenia 4.13.* a) Nech  $T$  je teória a  $A$  a  $C$  sú výrokovologické formuly v ľubovoľnom jazyku  $\mathcal{L}$ .

( $\Leftarrow$ ) Predpokladajme, že  $T \models_p (A \rightarrow C)$  a dokážme *priamo*, že z  $T \cup \{A\}$  vyplýva  $C$ .

Zoberme ľubovoľné výrokovologické ohodnotenie  $v$  pre  $\mathcal{L}$ , ktoré je modelom  $T \cup \{A\}$ . Vo  $v$  sú teda pravdivé všetky formuly z  $T \cup \{A\}$ . Preto  $v \models_p T$  a tiež  $v \models_p A$ .

Z  $v \models_p T$  na základe predpokladu  $T \models_p (A \rightarrow C)$  dostávame, že vo  $v$  je pravdivá implikácia  $(A \rightarrow C)$ , teda podľa definície pravdivosti  $v \models_p A$  alebo  $v \models_p C$ . Pretože ale vieme, že  $v \models_p A$ , musí  $v \models_p C$ .

Keďže  $v$  bol ľubovoľný model  $T \cup \{A\}$ , môžeme toto zistenie zovšeobecniť na všetky ohodnotenia a podľa definície vyplývania potom  $T \cup \{A\} \models_p C$ .

( $\Rightarrow$ ) Predpokladajme, že z  $T \cup \{A\}$  vyplýva  $C$  a dokážme *sporom*, že z  $T$  vyplýva  $(A \rightarrow C)$ .

Nech by existovalo ohodnotenie  $v$ , ktoré je modelom  $T$ , ale nie formuly  $(A \rightarrow C)$ , teda podľa definície pravdivosti  $v \models_p A$  a  $v \not\models_p C$ . Z  $v \models_p T$  a  $v \models_p A$  máme  $v \models_p T \cup \{A\}$  a z predpokladu  $T \cup \{A\} \models_p C$  dostávame  $v \models_p C$ , čo je spor.

b) Dôkaz je podobný ako v časti a). □

*Dôkaz dôsledku 4.14.* Nech  $\mathcal{L}$  je jazyk výrokovologickej časti logiky prvého rádu. Nech  $A_1, A_2, \dots, A_n$  a  $C$  sú výrokovologické formuly v jazyku  $\mathcal{L}$ .

Opakovaným použitím tvrdenia 4.13 a pomocou 4.5 dostávame:

$$\begin{aligned}
 \{A_1, A_2, \dots, A_n\} \models_p C & \quad \text{vtt} \quad \{(A_1 \wedge A_2), \dots, A_n\} \models_p C \\
 & \quad \text{vtt} \quad \dots \\
 & \quad \text{vtt} \quad \emptyset \cup \{((\dots (A_1 \wedge A_2) \wedge \dots) \wedge A_n)\} \models_p C \\
 & \quad \text{vtt} \quad \emptyset \models_p (((\dots (A_1 \wedge A_2) \wedge \dots) \wedge A_n) \rightarrow C) \\
 & \quad \text{vtt} \quad \models_p (((\dots (A_1 \wedge A_2) \wedge \dots) \wedge A_n) \rightarrow C) \quad \square
 \end{aligned}$$

### Tautológie a ekvivalencia

Kedy je formula  $(X \leftrightarrow Y)$ , teda  $((X \rightarrow Y) \wedge (Y \rightarrow X))$  tautológia?

Vtedy a len vtedy, keď je pravdivá v každom ohodnotení, teda vtt v každom ohodnotení  $v$  máme  $v \models_p (X \rightarrow Y)$  a  $v \models_p (Y \rightarrow X)$ , vtt v každom ohodnotení  $v$  máme buď  $v \models_p X$  alebo  $v \models_p Y$  a zároveň buď  $v \models_p Y$  alebo  $v \models_p X$ , vtt v každom ohodnotení  $v$  platí, že ak  $v \models_p X$ , tak  $v \models_p Y$ , a ak  $v \models_p Y$ , tak  $v \models_p X$ , vtt v každom ohodnotení  $v$  máme  $v \models_p X$  vtt  $v \models_p Y$ , vtt  $X$  je výrokologicky ekvivalentná s  $Y$ .

**Tvrdenie 4.15.** *Nech  $\mathcal{L}$  je jazyk výrokologickej časti logiky prvého rádu. Nech  $X$  a  $Y$  sú výrokologické formuly v  $\mathcal{L}$ . Potom  $(X \leftrightarrow Y)$  je tautológia vtt  $X$  a  $Y$  sú výrokologicky ekvivalentné. (Skrátene:  $\models_p (X \leftrightarrow Y)$  vtt  $X \Leftrightarrow_p Y$ .)*

## 4.4 Ekvivalentné úpravy a CNF

### Reťazenie ekvivalentných úprav

Určite ste už robili ekvivalentné úpravy formúl, pri ktorých ste *reťazili dvojice* vzájomne ekvivalentných formúl:

$$\neg(A \rightarrow \neg B) \Leftrightarrow_p \neg(\neg A \vee \neg B) \Leftrightarrow_p (\neg\neg A \wedge \neg\neg B) \Leftrightarrow_p (A \wedge B)$$

a nakoniec ste prehlásili, že prvá  $\neg(A \rightarrow \neg B)$  a posledná formula  $(A \wedge B)$  sú ekvivalentné.

Mohli ste to urobiť, lebo  $\Leftrightarrow_p$  je *tranzitívna* relácia na formulách, dokonca viac než iba tranzitívna.

## Výrokovologická ekvivalencia ako relácia ekvivalencie

**Tvrdenie 4.16.** *Nech  $\mathcal{L}$  je jazyk výrokovologickej časti logiky prvého rádu.*

*Vzťah výrokovologickej ekvivalencie  $\Leftrightarrow_p$  je reláciou ekvivalencie na výrokovologických formulách jazyka  $\mathcal{L}$ , teda pre všetky výrokovologické formuly  $X, Y, Z$  jazyka  $\mathcal{L}$  platí:*

- *Reflexivita:  $X \Leftrightarrow_p X$ .*
- *Symetria: Ak  $X \Leftrightarrow_p Y$ , tak  $Y \Leftrightarrow_p X$ .*
- *Tranzitivita: Ak  $X \Leftrightarrow_p Y$  a  $Y \Leftrightarrow_p Z$ , tak  $X \Leftrightarrow_p Z$ .*

*Dôkaz.* Priamym dôkazom dokážeme tranzitivitu. Ostatné vlastnosti sa dajú dokázať podobne.

Nech  $X, Y$  a  $Z$  sú výrokovologické formuly jazyka  $\mathcal{L}$ . Nech (1)  $X$  je výrokovologicky ekvivalentná s  $Y$  a (2)  $Y$  je ekvivalentná so  $Z$ .

Aby sme dokázali, že  $X$  je výrokovologicky ekvivalentná so  $Z$ , musíme ukázať, že pre každé ohodnotenie pre jazyk  $\mathcal{L}$  platí, že  $v \models_p X$  vtt  $v \models_p Z$ .

Nech teda  $v$  je ľubovoľné ohodnotenie pre  $\mathcal{L}$ .

- Ak  $v \models_p X$ , tak podľa predpokladu (1) a definície výrokovologickej ekvivalencie 4.10 musí platiť  $v \models_p Y$ , a teda podľa predpokladu (2) a definície ekvivalencie máme  $v \models_p Z$ .
- Nezávisle od toho, ak  $v \models_p Z$ , tak  $v \models_p Y$  podľa (2) a def. 4.10, a teda  $v \models_p X$  podľa (1) a def. 4.10.

Preto  $v \models_p X$  vtt  $v \models_p Z$ .

Pretože  $v$  bolo ľubovoľné, môžeme náš záver zovšeobecniť na všetky ohodnotenia, a teda podľa definície ekvivalencie 4.10 sú  $X$  a  $Z$  výrokovologicky ekvivalentné.  $\square$

## Substitúcia pri ekvivalentných úpravách

V reťazci ekvivalentných úprav

$$\begin{aligned}\neg(A \rightarrow \neg B) &\Leftrightarrow_p \neg(\neg A \vee \neg B) \Leftrightarrow_p (\neg\neg A \wedge \neg\neg B) \\ &\Leftrightarrow_p (A \wedge \neg\neg B) \Leftrightarrow_p (A \wedge B)\end{aligned}$$

v prvom, treťom a štvrtom kroku *nezodpovedá celá* formula niektorej zo známych ekvivalencií z vety 4.11.

Podľa známej ekvivalencie sme *nahrádzali podformuly* – *substituovali* sme ich.

**Definícia 4.17** (Substitúcia). Nech  $\mathcal{L}$  je jazyk výrokovologickej časti logiky prvého rádu a nech  $X, A, B$  sú formuly jazyka  $\mathcal{L}$ . *Substitúciou*  $B$  za  $A$  v  $X$  (skrátene  $X[A|B]$ ) nazývame formulu, ktorá vznikne nahradením každého výskytu  $A$  v  $X$  formulou  $B$ .

### Substitúcia rekurzívne

Substitúciu si vieme predstaviť aj ako indukzívne definovanú (rekurzívnu) operáciu:

### Substitúcia rekurzívne

Nech  $\mathcal{L}$  je jazyk výrokovologickej časti logiky prvého rádu. Pre všetky formuly  $A, B, X, Y$  jazyka  $\mathcal{L}$  a všetky binárne spojky  $b \in \{\wedge, \vee, \rightarrow\}$ :

$$\begin{aligned} X[A|B] &= B, & \text{ak } A &= X \\ X[A|B] &= X, & \text{ak } X \text{ je atóm a } A &\neq X \\ (\neg X)[A|B] &= \neg(X[A|B]), & \text{ak } A &\neq \neg X \\ (X \ b \ Y)[A|B] &= ((X[A|B]) \ b \ (Y[A|B])), & \text{ak } A &\neq (X \ b \ Y). \end{aligned}$$

### Korektnosť substitúcie ekvivalentnej formuly

Substitúciou ekvivalentnej podformuly, napríklad

$$(\neg\neg O \wedge \neg\neg C)[\neg\neg O|O] = (O \wedge \neg\neg C),$$

skutočne dostávame formulu ekvivalentnú s pôvodnou:

**Veta 4.18** (Ekvivalentné úpravy substitúciou). *Nech  $\mathcal{L}$  je jazyk výrokovologickej časti logiky prvého rádu a nech  $X$  je formula,  $A$  a  $B$  sú výrokovologicky ekvivalentné formuly jazyka  $\mathcal{L}$ . Potom formuly  $X$  a  $X[A|B]$  sú tiež výrokovologicky ekvivalentné.*

Toto tvrdenie môžeme dokázať indukciou na konštrukciu formuly.



## Ekvivalentné úpravy a vstup pre SAT solver

Častým použitím ekvivalentných úprav je transformácia teórie (napríklad o nejakom Sudoku) do tvaru vhodného pre SAT solver.

Aby sme tento tvar mohli popísať, potrebujeme pomenovať viacnásobne vnorené konjunkcie a viacnásobne vnorené disjunkcie a dohodneme sa na skracovaní ich zápisu vynechaním vnútorných zátvoriek.

## Konjunkcia a disjunkcia postupnosti formúl

**Definícia 4.19.** Nech  $\mathcal{L}$  je jazyk výrokovologickej časti logiky prvého rádu. Nech  $A_1, A_2, \dots, A_n$  je konečná postupnosť formúl jazyka  $\mathcal{L}$ .

- *Konjunkciou postupnosti*  $A_1, \dots, A_n$  je formula  $((A_1 \wedge A_2) \wedge A_3) \wedge \dots \wedge A_n$ , skrátene  $(A_1 \wedge A_2 \wedge A_3 \wedge \dots \wedge A_n)$ .
  - Konjunkciu *prázdnej* postupnosti formúl ( $n = 0$ ) označujeme  $\top$ . Chápeme ju ako ľubovoľnú *tautológiu*, napríklad  $(P(c) \vee \neg P(c))$  pre nejaký unárny predikát  $P$  a nejakú konštantu  $c$  jazyka  $\mathcal{L}$ .
- *Disjunkciou postupnosti*  $A_1, \dots, A_n$  je formula  $((A_1 \vee A_2) \vee A_3) \vee \dots \vee A_n$ , skrátene  $(A_1 \vee A_2 \vee A_3 \vee \dots \vee A_n)$ .
  - Disjunkciu *prázdnej* postupnosti formúl označujeme  $\perp$  alebo  $\square$ . Chápeme ju ako ľubovoľnú *nesplniteľnú* formulu, napríklad  $(P(c) \wedge \neg P(c))$ .
- Pre  $n = 1$  chápeme samotnú formulu  $A_1$  ako konjunkciu aj ako disjunkciu jednoprvkovej postupnosti formúl  $A_1$ .

## Literál, klauzula, konjunktívny normálny tvar

Vstup do SAT solvera je formula v konjunktívnom normálnom tvare.

### Definícia 4.20.

*Literál* je atóm alebo negácia atómu.

*Klauzula* (tiež „klauza“, angl. *clause*) je *disjunkcia* postupnosti literálov.

*Formula v konjunktívnom normálnom tvare* (angl. conjunctive normal form, CNF) je *konjunkcia* postupnosti klauzúl.

*Príklad 4.21. Literály:*  $P, C, \neg C, \neg O$

**Klauzuly:**  $P, \neg O, \square, (\neg P \vee O \vee \neg C)$

**CNF:**  $P, \neg O, \top, (P \vee \neg O) (P \wedge \neg O \wedge C), \square, ((P \vee O) \wedge \square), ((\neg P \vee O) \wedge (O \vee C))$   
ak  $P$  = pacient(Edo),  $O$  = očkovaný(Edo),  $C$  = chorý(Edo).

### Existencia ekvivalentnej formuly v CNF

**Veta 4.22.** *Ku každej výrokovologickej formule  $X$  existuje ekvivalentná formula  $C$  v konjunktívnom normálnom tvare.*

*Dôkaz.* Zoberme všetky ohodnotenia  $v_1, \dots, v_n$  také, že  $v_i \models_p \neg X$  a  $v_i(A) = f$  pre všetky atómy  $A \notin \text{atoms}(\neg X)$ . Pre každé  $v_i$  zostrojme formulu  $C_i$  ako konjunkciu obsahujúcu  $A$ , ak  $v_i(A) = t$ , alebo  $\neg A$ , ak  $v_i(A) = f$ , pre každý atóm  $A \in \text{atoms}(\neg X)$ . Očividne formula  $D = (C_1 \vee \dots \vee C_n)$  je ekvivalentná s  $\neg X$  (vymenúva všetky možnosti, kedy je  $\neg X$  pravdivá).

Znegovaním  $D$  a aplikáciou de Morganových pravidiel dostaneme formulu  $C$  v CNF, ktorá je ekvivalentná s  $X$ .  $\square$

### Konverzia formuly do ekvivalentnej v CNF

Skúmanie všetkých ohodnotení podľa dôkazu vety 4.22 nie je ideálny spôsob ako upraviť formulu do CNF — najmä keď má veľa premenných a jej splniteľnosť chceme rozhodnúť SAT solverom.

Jednoduchý algoritmus na konverziu formuly do ekvivalentnej formuly v CNF založený na ekvivalentných úpravách si naprogramujete ako **4. praktické cvičenie**.

### Konverzia formuly do ekvivalentnej v CNF

Základný algoritmus konverzie do CNF má dve fázy:

1. Upravíme formulu na *negačný normálny tvar* (NNF) — nevyskytuje sa v ňom implikácia a negované sú iba atómy:
  - Nahradíme implikácie disjunkciami:  $(A \rightarrow B) \Leftrightarrow_p (\neg A \vee B)$
  - Presunieme  $\neg$  k atómom opakovaným použitím de Morganových zákonov a zákona dvojitej negácie.

2. Odstránime konjunkcie vnorené v disjunkciách „roznásobením“ podľa distributívnosti a komutatívnosti:

$$\begin{aligned}
 (A \vee (B \wedge C)) &\Leftrightarrow_p ((A \vee B) \wedge (A \vee C)) \\
 ((B \wedge C) \vee A) &\Leftrightarrow_p (A \vee (B \wedge C)) \Leftrightarrow_p ((A \vee B) \wedge (A \vee C)) \\
 &\Leftrightarrow_p ((B \vee A) \wedge (A \vee C)) \\
 &\Leftrightarrow_p ((B \vee A) \wedge (C \vee A))
 \end{aligned}$$

## Konverzia formuly do ekvivalentnej v CNF

*Príklad 4.23.* Úprava formuly do NNF:

$$\begin{aligned}
 ((\neg S \wedge P) \rightarrow \neg(Z \vee \neg O)) &\Leftrightarrow_p (\neg(\neg S \wedge P) \vee \neg(Z \vee \neg O)) \quad (\text{nahr. } \rightarrow) \\
 &\Leftrightarrow_p (((\neg\neg S \vee \neg P) \vee (\neg Z \wedge \neg\neg O)) \quad (2 \times \text{de Morgan}) \\
 &\Leftrightarrow_p ((S \vee \neg P) \vee (\neg Z \wedge O)) \quad (2 \times \text{dvoj. neg.})
 \end{aligned}$$

Úprava formuly v NNF do CNF:

$$\begin{aligned}
 ((S \vee \neg P) \vee (\neg Z \wedge O)) \\
 \Leftrightarrow_p (((S \vee \neg P) \vee \neg Z) \wedge ((S \vee \neg P) \vee O)) \quad (\text{distr. } \wedge \text{ cez } \vee)
 \end{aligned}$$

Podľa dohody v def. 4.19 výslednú formulu v CNF skráteno zapíšeme:

$$((S \vee \neg P \vee \neg Z) \wedge (S \vee \neg P \vee O))$$

## Zhrnutie

- Význačné sémantické vlastnosti formúl: tautologickosť, splniteľnosť, nespľniteľnosť, falzifikovateľnosť
- Ekvivalencia — sémantický vzťah formúl
- Vzťah tautológií s vyplývaním a ekvivalenciou
- Syntaktické odvodenie ekvivalencie pomocou substitúcií podľa známych ekvivalencií
- NNF a CNF

## 5. prednáška

# Dôkazy a výrokovologické tablá

---

### Rekapitulácia


Minulý týždeň sme sa zaoberali:

- vlastnosťami formúl vzhľadom na všetky ohodnotenia:
  - tautológia,
  - splniteľnosť,
  - falzifikovateľnosť,
  - nespľniteľnosť;
- vzťahmi formúl:
  - ekvivalencia;
- vzťahom vyplývania a ekvivalencie s tautológiami;
- transformáciou formúl medzi jazykmi so zachovaním splniteľnosti.

## 5 Dôkazy a výrokovologické tablá

### Riešenie slovných úloh pomocou formálnej logiky

V 3. sade teoretických úloh (AIN) sme riešili neformálne zadané problémy pomocou ich formálnej verzie:



Formálny problém sme riešili hrubou silou a sémanticky — rozborom všetkých ohodnotení. Žiadne naozajstné usudzovanie. Výsledok zodpovedal výsledku neformálneho úsudku o probléme.

### Dôkazy neformálnych meta tvrdení

V 4. sade teoretických úloh sme dokazovali tvrdenia o vyplývaní, splniteľnosti a tautológiách:

- matematické tvrdenia v slovenčine;
- dôkazy tiež v slovenčine.

Usudzovanie, ale neformálne.

### Formalizácia dôkazov

Logiku zaujíma *jazyk* a *usudzovanie*.

Výroky v slovenčine (jazyk) sme *sformalizovali* ako *formuly* v jazyku logiky prvého rádu

- matematická „dátová štruktúra“: postupnosti symbolov s indukčnými pravidlami konštrukcie;
- javovská dátová štruktúra: stromy objektov podtried triedy Formula.

*Dôkazy* (usudzovanie) začneme *formalizovať* tento týždeň.

## Čo sú dôkazy a prečo sa dokazuje

*Dôkaz* je úvaha, ktorá zdôvodňuje, prečo je nejaký záver logickým dôsledkom predpokladov.

*Načo* sú vlastne dobré *dôkazy*?

- Môžeme nimi *presvedčiť* iných o pravdivosti svojich záverov.
- Zvyčajne sú menej prácne a *pochopiteľnejšie* ako rozbor všetkých možností.

Už 16 možností v 3. sade úloh bolo prácne rozobrať.

Ak je možností nekonečne veľa, rozbor všetkých možností ani nie je možný.

- Odvodzovaním podľa pravidiel dôkazov môžeme skúmať, aké dôsledky má naša teória aj bez konkrétneho cieľa.

## Prečo formalizovať dôkazy

*Načo* je dobré *formalizovať* dôkazy?

- Aby sme si ujasnili, čo sú dôkazy a kedy sú *správne*. Správna argumentácia nie je dôležitá iba v matematike:
  - uvažovanie o správnosti našich programov či dopytov,
  - základ kritického/vedeckého myslenia v bežnom živote.
- Aby sme vedeli naprogramovať *dátové štruktúry* na ich reprezentáciu v počítači.
- Aby sme mohli dokazovanie *automatizovať*.
  - Automatické dokazovanie je jeden z cieľov umelej inteligencie.
- Aby sme zistili, čo sa dá a čo sa *nedá* dokázať.
  - Prakticky: Čo sa nedá dokázať, toho dôkaz sa nedá automatizovať.
  - Filozoficky: Hranice poznania a chápania.

## 5.1 Druhy dôkazov

### Druhy dôkazov

V matematike sa na to používa viac typov dôkazov:

- priamy,
- sporom,
- nepriamy,
- analýzou prípadov,

ktoré sa často kombinujú.

### Priamy dôkaz a analýza prípadov

*Priamy dôkaz* Z predpokladov postupným odvodzovaním jednoduchých logických dôsledkov dospejeme k požadovanému záveru.

*Dôkaz analýzou (rozborom) prípadov* Keď predpoklady obsahujú *disjunkciu*, dokážeme požadovaný záver z *každého disjunktu* a ostatných predpokladov *nezávisle* od ostatných disjunktov.

Ak aj predpoklady disjunkciu neobsahujú, môžeme rozoberať prípady, že je nejaké pomocné tvrdenie pravdivé alebo nepravdivé.

### Príklad priameho dôkazu s analýzou prípadov

*Príklad 5.1* (Párty po covide · priamy dôkaz s analýzou prípadov). ( $A_1$ ) Anka príde, iba ak príde Betka a Cyril. ( $A_2$ ) Ak príde Betka alebo Dávid, príde aj Evka. ( $A_3$ ) Evka nepríde, ak príde Fero.

Teda: ( $X$ ) Ak príde Anka, tak nepríde Fero.

*Dôkaz (priamo)*. Predpokladajme, že tvrdenia  $A_1$  až  $A_3$  sú pravdivé. Dokážme  $X$ .

Ak nepríde Anka,  $X$  je pravdivé ( $X$  je implikácia a jej antecedent je nepravdivý).

Preto predpokladajme, že Anka príde. Podľa  $A_1$  potom musia prísť aj Betka a Cyril. Preto príde Betka, a teda príde Betka alebo Dávid. Podľa  $A_2$  potom príde aj Evka. Pretože podľa  $A_3$  by Evka neprišla, ak by prišiel Fero, ale Evka príde, musí byť pravda, že Fero nepríde. Preto je tvrdenie  $X$  opäť pravdivé ( $X$  je implikácia a jej konzekvent je pravdivý).

## Dôkaz sporom a nepriamy dôkaz

*Dôkaz sporom* Prijmeme predpoklady, ale *spochybíme záver* — predpokladáme, že je nepravdivý. Postupným odvodzovaním jednoduchých logických dôsledkov dospejeme k *sporu* s predpokladom alebo iným dôsledkom.

Záver teda nemôže byť nepravdivý, preto ak sú pravdivé predpoklady, je nutne pravdivý, vyplýva z nich.

*Nepriamy dôkaz* — variácia dôkazu sporom Predpokladáme, že záver je nepravdivý. Postupným odvodzovaním jednoduchých logických dôsledkov dospejeme k nepravdivosti niektorého z predpokladov.

Tým dokážeme: Ak je nepravdivý záver, tak sú nepravdivé predpoklady. Obmena: Ak sú pravdivé predpoklady, je pravdivý záver.

## Príklad dôkazu sporom

*Príklad 5.2* (Párty po covide · dôkaz sporom).

( $A_1$ ) Anka príde, iba ak príde Betka a Cyril. ( $A_2$ ) Ak príde Betka alebo Dávid, príde aj Evka. ( $A_3$ ) Evka nepríde, ak príde Fero.

Teda: ( $X$ ) Ak príde Anka, tak nepríde Fero.

*Dôkaz (sporom)*. Predpokladajme, že tvrdenia  $A_1$  až  $A_3$  sú pravdivé, ale  $X$  je nepravdivé.

Predpokladáme teda, že príde Anka a príde aj Fero. Preto príde Fero, a teda podľa predpokladu  $A_3$  Evka nepríde. Zároveň vieme, že príde Anka, a podľa  $A_1$  teda prídu aj Betka a Cyril. Preto príde Betka, a teda príde Betka alebo Dávid. Podľa  $A_2$  potom príde aj Evka. To je však spor z predchádzajúcim dôsledkom  $A_3$ , že Evka nepríde.

Predpoklad, že  $X$  je nepravdivé viedol k sporu, preto  $X$  je pravdivé.

## Výhody dôkazu sporom

Dôkaz sporom je veľmi konkrétna ukážka kritického, vedeckého myslenia:

1. Pochybujeme o pravdivosti tvrdenia.
2. Vyvrátením tejto pochybnosti sa presvedčíme o pravdivosti.



Má ale aj „technickú“ výhodu: Nemusíme pri ňom až tak tápať, ako dospejeme k cieľu, pretože

- dostaneme viac predpokladov;
- máme jednoduchý cieľ: nájsť spor;
- väčšinou stačí tvrdenia iba zjednodušovať.

### Odvodzovanie jednoduchých dôsledkov

*Kroky dôkazu by mali odvodzovať jednoduché dôsledky.*

Tie potom používame na odvodenie ďalších dôsledkov.

*Aký dôsledok je jednoduchý?*

Závisí od čitateľa dôkazu — musí byť schopný ho overiť.

Matematici (a učitelia) radi robia väčšie skoky a nechajú čitateľa (študenta) domýšľať si, prečo ich mohli urobiť.

Vyučujúci chcú od študentov malé kroky — aby si overili, že študent skutočne uvažuje správne.

## 5.2 Výrokovologické tablá

### Jednoduché dôsledky podľa definície pravdivosti formúl

Pozrime sa znova na príklad dôkazu sporom:

1. Sformalizujme ho.
2. Uvedomme si, čo vlastne dokazujeme.
3. Všímajme si, aké kroky robíme.

### Príklad dôkazu sporom s formulami

*Príklad 5.3 (Párty po covide · formalizovaný dôkaz sporom).* Dokážme, že z teórie  $T = \{A_1, A_2, A_3\}$ , kde

$A_1 = (p(A) \rightarrow (p(B) \wedge p(C)))$	Anka príde, iba ak príde Betka a Cyril.
$A_2 = ((p(B) \vee p(D)) \rightarrow p(E))$	Ak príde Betka alebo Dávid, príde aj Evka.
$A_3 = (p(F) \rightarrow \neg p(E)),$	Evka nepríde, ak príde Fero.

vyplýva formula  $X$ , pričom

$X = (p(A) \rightarrow \neg p(F))$	Ak príde Anka, tak nepríde Fero.
------------------------------------	----------------------------------

*Príklad 5.3* (Párty po covide · formal. dôkaz sporom, pokrač.).

*Dôkaz (sporom).* Predpokladajme, pre nejaké ohodnotenie  $v$  platí, že

(1)  $v \models_p (p(A) \rightarrow (p(B) \wedge p(C)))$ ,

(2)  $v \models_p ((p(B) \vee p(D)) \rightarrow p(E))$ ,

(3)  $v \models_p (p(F) \rightarrow \neg p(E))$ , ale

(4)  $v \not\models_p (p(A) \rightarrow \neg p(F))$ .

Podľa definície pravdivosti v ohodnotení, potom máme:

(5)  $v \models_p p(A)$  zo (4) a súčasne

(6)  $v \not\models_p \neg p(F)$  zo (4), teda

(7)  $v \models_p p(F)$  z (6). Ďalej

(8)  $v \not\models_p p(F)$ , alebo (9)  $v \models_p \neg p(E)$  podľa (3).

čo je (10)  $v \not\models_p p(E)$  z (9). Zároveň

v spore (11)  $v \not\models_p p(A)$ , alebo (12)  $v \models_p (p(B) \wedge p(C))$  podľa (1).

so (7), čo je (13)  $v \models_p p(B)$  z (12). Potom podľa (2):

v spore (14)  $v \not\models_p (p(B) \vee p(D))$ , alebo (15)  $v \models_p p(E)$ ,

s (5), (16)  $v \not\models_p p(B)$  zo (14), spor s (10).

spor s (13);

## Tablový kalkúl

Z takýchto dôkazov sporom vychádza *tablový kalkúl* — jeden z *formálnych deduktívnych systémov* pre výrokovologickú časť logiky prvého rádu

*Formálny deduktívny systém* je systém odvodzovacích pravidiel na konštrukciu dôkazov vyplývania formúl z teórií.

Nami používaná verzia tablového kalkulu pochádza od Raymonda M. Smullyana [Smullyan, 1979].

Postupne si ukážeme, ako predchádzajúci dôkaz premeníme na *tablo* — formálny dôkaz v tablovom kalkule.

## Označené formuly a ich sémantika

Zbavme sa najprv opakovania  $v \models_p \dots$  a  $v \not\models_p \dots$ .

**Definícia 5.4.** Nech  $\mathcal{L}$  je jazyk výrokovologickej časti logiky prvého rádu. Nech  $X$  je výrokovologická formula jazyka  $\mathcal{L}$ . Postupnosti symbolov  $\mathbf{T}X$  a  $\mathbf{F}X$  nazývame *označené formuly*.

**Definícia 5.5.** Nech  $\mathcal{L}$  je jazyk výrokovologickej časti logiky prvého rádu,  $v$  je ohodnotenie pre  $\mathcal{L}$  a  $X$  je výrokovologická formula v  $\mathcal{L}$ . Potom

- vo  $v$  je pravdivá  $\mathbf{T}X$  (skrátene  $v \models_p \mathbf{T}X$ ) vtt vo  $v$  je pravdivá  $X$ ;

- vo  $v$  je pravdivá  $\mathbf{F}X$  (skr.  $v \models_p \mathbf{F}X$ ) vtt vo  $v$  nie je pravdivá  $X$ .

Znamienko  $\mathbf{F}$  sa teda správa ako negácia a  $\mathbf{T}$  nemení význam formuly. Znamienka  $\mathbf{F}$  a  $\mathbf{T}$  sa *nesmú* objaviť v podformulách. Vďaka znamienkam stačí hovoriť iba o pravdivých ozn. formulách.

*Příklad 5.5* (Párty po covidě · dôkaz s označenými formulami). Predpokladajme, pre nejakom ohodnotení  $v$  sú pravdivé označené formuly

- (1)  $\mathbf{T}(p(A) \rightarrow (p(B) \wedge p(C)))$ ,
- (2)  $\mathbf{T}((p(B) \vee p(D)) \rightarrow p(E))$ ,
- (3)  $\mathbf{T}(p(F) \rightarrow \neg p(E))$ , ale
- (4)  $\mathbf{F}(p(A) \rightarrow \neg p(F))$ .

Podľa definície pravdivosti, sú vo  $v$  pravdivé:

- (5)  $\mathbf{T} p(A)$  zo (4) a súčasne
- (6)  $\mathbf{F} \neg p(F)$  zo (4), teda
- (7)  $\mathbf{T} p(F)$  z (6). Ďalej
- (8)  $\mathbf{F} p(F)$ , alebo (9)  $\mathbf{T} \neg p(E)$  podľa (3).

čo je (10)  $\mathbf{F} p(E)$  z (9). Zároveň

v spore (11)  $\mathbf{F} p(A)$ , alebo (12)  $\mathbf{T}(p(B) \wedge p(C))$  z (1).

so (7),

čo je

(13)  $\mathbf{T} p(B)$  z (12). Potom podľa (2)

v spore

(14)  $\mathbf{F}(p(B) \vee p(D))$ , alebo (15)  $\mathbf{T} p(E)$ ,

s (5),

(16)  $\mathbf{F} p(B)$  zo (14),

spor s (10).

spor s (13);

## Kroky odvodenia

Všimnime si teraz kroky, ktoré sme v dôkaze robili:

- Niektoré z pravdivosti formuly *priamo odvodili* pravdivosť niektorej priamej podformuly, napr.:
  - z (4)  $\mathbf{F}(p(A) \rightarrow \neg p(F))$  sme odvodili (5)  $\mathbf{T} p(A)$ ;
  - z (4)  $\mathbf{F}(p(A) \rightarrow \neg p(F))$  sme odvodili (6)  $\mathbf{F} \neg p(F)$ ;
  - z (9)  $\mathbf{T} \neg p(E)$  sme odvodili (10)  $\mathbf{F} p(E)$ .
- Iné viedli k *analýze prípadov* pravdivosti *oboch* priamych podformúl:
  - (2)  $\mathbf{T}((p(B) \vee p(D)) \rightarrow p(E))$  viedla k analýze prípadov:
    - (14)  $\mathbf{F}(p(B) \vee p(D))$  alebo (15)  $\mathbf{T} p(E)$ .

## Priame odvodenie pravdivosti priamych podformúl

Z definície pravdivosti formúl ľahko dostaneme:

**Pozorovanie 5.6.** *Nech  $v$  je ľubovoľné ohodnotenie pre jazyk  $\mathcal{L}$  výrokovo-logickej časti logiky prvého rádu. Nech  $X$  a  $Y$  sú ľubovoľné formuly  $\mathcal{L}$ :*

$Ak\ v \models_p \neg X, \text{ tak } v \not\models_p X.$	$Ak\ v \models_p \mathbf{T} \neg X, \text{ tak } v \models_p \mathbf{F} X.$
$Ak\ v \not\models_p \neg X, \text{ tak } v \models_p X.$	$Ak\ v \models_p \mathbf{F} \neg X, \text{ tak } v \models_p \mathbf{T} X.$
$Ak\ v \models_p (X \wedge Y), \text{ tak } v \models_p X.$	$Ak\ v \models_p \mathbf{T}(X \wedge Y), \text{ tak } v \models_p \mathbf{T} X.$
$Ak\ v \models_p (X \wedge Y), \text{ tak } v \models_p Y.$	$Ak\ v \models_p \mathbf{T}(X \wedge Y), \text{ tak } v \models_p \mathbf{T} Y.$
$Ak\ v \not\models_p (X \vee Y), \text{ tak } v \not\models_p X.$	$Ak\ v \models_p \mathbf{F}(X \vee Y), \text{ tak } v \models_p \mathbf{F} X.$
$Ak\ v \not\models_p (X \vee Y), \text{ tak } v \not\models_p Y.$	$Ak\ v \models_p \mathbf{F}(X \vee Y), \text{ tak } v \models_p \mathbf{F} Y.$
$Ak\ v \not\models_p (X \rightarrow Y), \text{ tak } v \models_p X.$	$Ak\ v \models_p \mathbf{F}(X \rightarrow Y), \text{ tak } v \models_p \mathbf{T} X.$
$Ak\ v \not\models_p (X \rightarrow Y), \text{ tak } v \not\models_p Y.$	$Ak\ v \models_p \mathbf{F}(X \rightarrow Y), \text{ tak } v \models_p \mathbf{F} Y.$

## Zjednodušujúce tablové pravidlá

Z pozorovania 5.6 môžeme sformulovať pravidlá, ktoré priamo odvodzujú z označených formúl ich označené podformuly:

$\frac{\mathbf{T} \neg X}{\mathbf{F} X}$	$\frac{\mathbf{F} \neg X}{\mathbf{T} X}$	$\frac{\mathbf{T}(X \wedge Y)}{\mathbf{T} X}$	$\frac{\mathbf{F}(X \vee Y)}{\mathbf{F} X}$	$\frac{\mathbf{F}(X \rightarrow Y)}{\mathbf{T} X}$
		$\frac{\mathbf{T}(X \wedge Y)}{\mathbf{T} Y}$	$\frac{\mathbf{F}(X \vee Y)}{\mathbf{F} Y}$	$\frac{\mathbf{F}(X \rightarrow Y)}{\mathbf{F} Y}$

Na tieto pravidlá sa dá pozeriť ako na *špeciálne prípady jedného pravidla*, ktorému sa hovorí  $\alpha$ , *zjednodušenie* alebo *sploštenie* (angl. *flatten*), pre rôzne spojky.

## Jednotný zápis označených formúl typu $\alpha$

**Definícia 5.7** (Jednotný zápis označených formúl typu  $\alpha$ ).

Označená formula  $A^+$  je typu  $\alpha$  vtt má jeden z tvarov v ľavom stĺpci tabuľky pre nejaké formuly  $X$  a  $Y$ . Takéto formuly budeme označovať písmenom  $\alpha$ ;  $\alpha_1$  bude označovať príslušnú označenú formulu zo stredného stĺpca,  $\alpha_2$  príslušnú formulu z pravého stĺpca.

$\alpha$	$\alpha_1$	$\alpha_2$
$\mathbf{T}(X \wedge Y)$	$\mathbf{T} X$	$\mathbf{T} Y$
$\mathbf{F}(X \vee Y)$	$\mathbf{F} X$	$\mathbf{F} Y$
$\mathbf{F}(X \rightarrow Y)$	$\mathbf{T} X$	$\mathbf{F} Y$
$\mathbf{T} \neg X$	$\mathbf{F} X$	$\mathbf{F} X$
$\mathbf{F} \neg X$	$\mathbf{T} X$	$\mathbf{T} X$

**Pozorovanie 5.8** (Stručne vďaka jednotnému zápisu). *Nech  $v$  je ľubovoľné ohodnotenie pre jazyk  $\mathcal{L}$  výrokovologickej časti logiky prvého rádu. Potom  $v \models_p \alpha$  vtt  $v \models_p \alpha_1$  a  $v \models_p \alpha_2$ .*

### Analýza prípadov pravdivosti priamych podformúl

Z definície pravdivosti formúl ľahko dostaneme:

**Pozorovanie 5.9.** *Nech  $v$  je ľubovoľné ohodnotenie pre jazyk  $\mathcal{L}$  výrokovologickej časti logiky prvého rádu. Nech  $X$  a  $Y$  sú ľubovoľné formuly  $\mathcal{L}$ :*

- *Ak  $v \models_p (X \wedge Y)$ , tak  $v \models_p X$  alebo  $v \models_p Y$ . Ak  $v \models_p \mathbf{F}(X \wedge Y)$ , tak  $v \models_p \mathbf{F}X$  alebo  $v \models_p \mathbf{F}Y$ .*
- *Ak  $v \models_p (X \vee Y)$ , tak  $v \models_p X$  alebo  $v \models_p Y$ . Ak  $v \models_p \mathbf{T}(X \vee Y)$ , tak  $v \models_p \mathbf{T}X$  alebo  $v \models_p \mathbf{T}Y$ .*
- *Ak  $v \models_p (X \rightarrow Y)$ , tak  $v \models_p X$  alebo  $v \models_p Y$ . Ak  $v \models_p \mathbf{T}(X \rightarrow Y)$ , tak  $v \models_p \mathbf{F}X$  alebo  $v \models_p \mathbf{T}Y$ .*

### Rozvetvujúce tablové pravidlá

Z pozorovania 5.9 môžeme sformulovať pravidlá, ktoré vedú k analýze prípadov pravdivosti priamych podformúl:

$$\frac{\mathbf{F}(X \wedge Y)}{\mathbf{F}X \mid \mathbf{F}Y} \qquad \frac{\mathbf{T}(X \vee Y)}{\mathbf{T}X \mid \mathbf{T}Y} \qquad \frac{\mathbf{T}(X \rightarrow Y)}{\mathbf{F}X \mid \mathbf{T}Y}$$

Aj na tieto pravidlá sa dá pozerat' ako na špeciálne prípady jedného pravidla, ktorému sa hovorí  $\beta$ , *vetvenie* alebo *rozdelenie* (angl. *split*), pre rôzne spojky.

### Jednotný zápis označených formúl typu $\beta$

**Definícia 5.10** (Jednotný zápis označených formúl typu  $\beta$ ).

Označená formula  $B^+$  je typu  $\beta$  vtt má jeden z tvarov v ľavom stĺpci tabuľky pre nejaké formuly  $X$  a  $Y$ . Takéto formuly budeme označovať písmenom  $\beta$ ;  $\beta_1$  bude označovať príslušnú označenú formulu zo stredného stĺpca,  $\beta_2$  príslušnú formulu z pravého stĺpca.

	$\beta$	$\beta_1$	$\beta_2$
	$\mathbf{F}(X \wedge Y)$	$\mathbf{F}X$	$\mathbf{F}Y$
	$\mathbf{T}(X \vee Y)$	$\mathbf{T}X$	$\mathbf{T}Y$
	$\mathbf{T}(X \rightarrow Y)$	$\mathbf{F}X$	$\mathbf{T}Y$

**Pozorovanie 5.11** (Stručne vďaka jednotnému zápisu). *Nech  $v$  je ľubovoľné ohodnotenie pre jazyk  $\mathcal{L}$  výrokovologickej časti logiky prvého rádu. Potom  $v \models_p \beta$  vtt  $v \models_p \beta_1$  alebo  $v \models_p \beta_2$ .*

### Označovanie označených formúl a ich množín

Čo vlastne dokazujeme v našom príklade? To, že predpoklad existencie ohodnotenia  $v$ , v ktorom sú pravdivé všetky prvky množiny označených formúl

$$S^+ = \{ \begin{array}{l} \mathbf{T}(p(A) \rightarrow (p(B) \wedge p(C))), \\ \mathbf{T}((p(B) \vee p(D)) \rightarrow p(E)), \\ \mathbf{T}(p(F) \rightarrow \neg p(E)), \\ \mathbf{F}(p(A) \rightarrow \neg p(F)) \end{array} \}$$

vedie k sporu, teda že  $S^+$  je *nesplniteľná*.

*Dohoda 5.12.* Pre označené formuly budeme používať veľké písmená zo začiatku a konca abecedy s horným indexom + a prípadne s dolnými indexmi, napr.  $A^+$ ,  $X_7^+$ .


Pre množiny označených formúl budeme používať písmená  $S$ ,  $T$  s horným indexom + a prípadne s dolnými indexmi, napr.  $S^+$ ,  $T_3^+$ .

*Príklad 5.12* (Párty po covide · tablo).

1.	$\mathbf{T}(p(A) \rightarrow (p(B) \wedge p(C)))$	$S^+$																			
2.	$\mathbf{T}((p(B) \vee p(D)) \rightarrow p(E))$	$S^+$																			
3.	$\mathbf{T}(p(F) \rightarrow \neg p(E))$	$S^+$																			
4.	$\mathbf{F}(p(A) \rightarrow \neg p(F))$	$S^+$																			
5.	$\mathbf{T} p(A)$	$\alpha 4$																			
6.	$\mathbf{F} \neg p(F)$	$\alpha 4$																			
7.	$\mathbf{T} p(F)$	$\alpha 6$																			
8.	$\mathbf{F} p(F) \quad \beta 3$ *7, 8	<table><tr><td>9.</td><td><math>\mathbf{T} \neg p(E) \quad \beta 3</math></td></tr><tr><td>10.</td><td><math>\mathbf{F} p(E) \quad \alpha 9</math></td></tr><tr><td>11.</td><td><math>\mathbf{F} p(A) \quad \beta 1</math> *5, 11</td><td><table><tr><td>12.</td><td><math>\mathbf{T}(p(B) \wedge p(C)) \quad \beta 1</math></td></tr><tr><td>13.</td><td><math>\mathbf{T} p(B) \quad \alpha 12</math></td></tr><tr><td>14.</td><td><math>\mathbf{F}(p(B) \vee p(D)) \quad \beta 2</math></td></tr><tr><td>15.</td><td><math>\mathbf{T} p(E) \quad \beta 2</math></td></tr><tr><td>16.</td><td><math>\mathbf{F} p(B) \quad \alpha 14</math> *13, 16</td></tr><tr><td></td><td>*10, 15</td></tr></table></td></tr></table>	9.	$\mathbf{T} \neg p(E) \quad \beta 3$	10.	$\mathbf{F} p(E) \quad \alpha 9$	11.	$\mathbf{F} p(A) \quad \beta 1$ *5, 11	<table><tr><td>12.</td><td><math>\mathbf{T}(p(B) \wedge p(C)) \quad \beta 1</math></td></tr><tr><td>13.</td><td><math>\mathbf{T} p(B) \quad \alpha 12</math></td></tr><tr><td>14.</td><td><math>\mathbf{F}(p(B) \vee p(D)) \quad \beta 2</math></td></tr><tr><td>15.</td><td><math>\mathbf{T} p(E) \quad \beta 2</math></td></tr><tr><td>16.</td><td><math>\mathbf{F} p(B) \quad \alpha 14</math> *13, 16</td></tr><tr><td></td><td>*10, 15</td></tr></table>	12.	$\mathbf{T}(p(B) \wedge p(C)) \quad \beta 1$	13.	$\mathbf{T} p(B) \quad \alpha 12$	14.	$\mathbf{F}(p(B) \vee p(D)) \quad \beta 2$	15.	$\mathbf{T} p(E) \quad \beta 2$	16.	$\mathbf{F} p(B) \quad \alpha 14$ *13, 16		*10, 15
9.	$\mathbf{T} \neg p(E) \quad \beta 3$																				
10.	$\mathbf{F} p(E) \quad \alpha 9$																				
11.	$\mathbf{F} p(A) \quad \beta 1$ *5, 11	<table><tr><td>12.</td><td><math>\mathbf{T}(p(B) \wedge p(C)) \quad \beta 1</math></td></tr><tr><td>13.</td><td><math>\mathbf{T} p(B) \quad \alpha 12</math></td></tr><tr><td>14.</td><td><math>\mathbf{F}(p(B) \vee p(D)) \quad \beta 2</math></td></tr><tr><td>15.</td><td><math>\mathbf{T} p(E) \quad \beta 2</math></td></tr><tr><td>16.</td><td><math>\mathbf{F} p(B) \quad \alpha 14</math> *13, 16</td></tr><tr><td></td><td>*10, 15</td></tr></table>	12.	$\mathbf{T}(p(B) \wedge p(C)) \quad \beta 1$	13.	$\mathbf{T} p(B) \quad \alpha 12$	14.	$\mathbf{F}(p(B) \vee p(D)) \quad \beta 2$	15.	$\mathbf{T} p(E) \quad \beta 2$	16.	$\mathbf{F} p(B) \quad \alpha 14$ *13, 16		*10, 15							
12.	$\mathbf{T}(p(B) \wedge p(C)) \quad \beta 1$																				
13.	$\mathbf{T} p(B) \quad \alpha 12$																				
14.	$\mathbf{F}(p(B) \vee p(D)) \quad \beta 2$																				
15.	$\mathbf{T} p(E) \quad \beta 2$																				
16.	$\mathbf{F} p(B) \quad \alpha 14$ *13, 16																				
	*10, 15																				

## Štruktúra tabla

Čo je teda tablo? Aká „dátová štruktúra“? Čo v nej musí platiť?



**Definícia 5.13** (Tablo pre množinu označených formúl). *Analytické tablo pre množinu označených formúl  $S^+$  (skrátene tablo pre  $S^+$ )* je binárny strom, ktorého vrcholy obsahujú označené formuly a ktorý je skonštruovaný podľa nasledovných induktívnych pravidiel:

- Strom s jediným vrcholom (koreňom) obsahujúcim niektorú označenú formulu  $A^+$  z  $S^+$  je tablom pre  $S^+$ .
- Nech  $\mathcal{T}$  je tablo pre  $S^+$  a  $y$  je nejaký jeho list. Potom tablom pre  $S^+$  je aj každé *priame rozšírenie*  $\mathcal{T}$  ktorýmkoľvek z pravidiel:

$\alpha$ : Ak sa na vetve  $\pi_y$  (ceste z koreňa do  $y$ ) vyskytuje nejaká označená formula  $\alpha$ , tak ako jediné dieťa  $y$  pripojíme nový vrchol obsahujúci  $\alpha_1$  alebo  $\alpha_2$ .

$\beta$ : Ak sa na vetve  $\pi_y$  (ceste z koreňa do  $y$ ) vyskytuje nejaká označená formula  $\beta$ , tak ako deti  $y$  pripojíme *dva* nové vrcholy, pričom ľavé dieťa bude obsahovať  $\beta_1$  a pravé  $\beta_2$ .

$S^+$ : Ako jediné dieťa  $y$  pripojíme nový vrchol obsahujúci ľubovoľnú označenú formulu  $A^+ \in S^+$ .

Nič iné nie je tablom pre  $S^+$ .

**Tablá a tablové pravidlá**  
**Pôvodné tablo**   **Možné priame rozšírenie**   **Pravidlá a označené formuly v nich**

	$\rightsquigarrow$	$\frac{\alpha}{\alpha_1} \quad \frac{\alpha}{\alpha_2}$	$\frac{\alpha}{\alpha_1 \quad \alpha_2}$		
			$\begin{array}{l} \mathbf{T}(X \wedge Y) \\ \mathbf{F}(X \vee Y) \\ \mathbf{F}(X \rightarrow Y) \\ \mathbf{T} \neg X \\ \mathbf{F} \neg X \end{array}$	$\begin{array}{l} \mathbf{TX} \\ \mathbf{FX} \\ \mathbf{TX} \\ \mathbf{FX} \\ \mathbf{TX} \end{array}$	$\begin{array}{l} \mathbf{TY} \\ \mathbf{FY} \\ \mathbf{FY} \\ \mathbf{FX} \\ \mathbf{TX} \end{array}$
	$\rightsquigarrow$	$\frac{\beta}{\beta_1 \mid \beta_2}$	$\frac{\beta}{\beta_1 \quad \beta_2}$		
			$\begin{array}{l} \mathbf{F}(X \wedge Y) \\ \mathbf{T}(X \vee Y) \\ \mathbf{T}(X \rightarrow Y) \end{array}$	$\begin{array}{l} \mathbf{FX} \\ \mathbf{TX} \\ \mathbf{FX} \end{array}$	$\begin{array}{l} \mathbf{FY} \\ \mathbf{TY} \\ \mathbf{TY} \end{array}$

Legenda:  $y$  je list v table  $\mathcal{T}$ ,  $\pi_y$  je cesta od koreňa k  $y$

**Tablá a tablové pravidlá (pokračovanie)**  
**Pôvodné tablo**   **Možné priame rozšírenie**   **Pravidlá a označené formuly v nich**

	$\rightsquigarrow$	$\frac{}{A^+}$	$A^+ \in S^+$		
			$\mathbf{A^+}$	$A^+ \in S^+$	

Legenda:  $y$  je list v table  $\mathcal{T}$ ,  $\pi_y$  je cesta od koreňa k  $y$



## Uzavretosť a otvorenosť vetvy a tabla

**Definícia 5.14.** *Vetvou* tabla  $\mathcal{T}$  je každá cesta od koreňa  $\mathcal{T}$  k niektorému listu  $\mathcal{T}$ .

Označená formula  $X^+$  sa *vyskytuje na vetve*  $\pi$  v  $\mathcal{T}$  vtt  $X^+$  sa nachádza v niektorom vrchole na  $\pi$ . Skrátene to budeme zapisovať  $X^+ \in \text{formulas}(\pi)$ .

Tablo  $\sim$  dôkaz sporom. Vetvenie  $\sim$  rozbor možných prípadov.  $\implies$  Spor musí nastať vo všetkých vetvách.

**Definícia 5.15.** *Vetva*  $\pi$  tabla  $\mathcal{T}$  je *uzavretá* vtt na  $\pi$  sa súčasne vyskytujú označené formuly  $\mathbf{F}X$  a  $\mathbf{T}X$  pre nejakú formulu  $X$ . Inak je  $\pi$  *otvorená*.

*Tablo*  $\mathcal{T}$  je *uzavreté* vtt každá jeho vetva je uzavretá. Naopak,  $\mathcal{T}$  je *otvorené* vtt aspoň jedna jeho vetva je otvorená.

### Príklad — vetvy a uzavretosť

*Príklad 5.16* (Vetvy a uzavretosť). Určme vetvy v table a zistíme, či sú uzavreté a či je uzavreté tablo:

1.	$\mathbf{T}(p(A) \rightarrow (p(B) \wedge p(C)))$	$S^+$						
2.	$\mathbf{T}((p(B) \vee p(D)) \rightarrow p(E))$	$S^+$						
3.	$\mathbf{T}(p(F) \rightarrow \neg p(E))$	$S^+$						
4.	$\mathbf{F}(p(A) \rightarrow \neg p(F))$	$S^+$						
5.	$\mathbf{T}p(A)$	$\alpha 4$						
6.	$\mathbf{F}\neg p(F)$	$\alpha 4$						
7.	$\mathbf{T}p(F)$	$\alpha 6$						
8.	$\mathbf{F}p(F) \quad \beta 3$ *7, 8	<table><tr><td>9.</td><td><math>\mathbf{T}\neg p(E) \quad \beta 3</math></td></tr><tr><td>10.</td><td><math>\mathbf{F}p(E) \quad \alpha 9</math></td></tr></table>	9.	$\mathbf{T}\neg p(E) \quad \beta 3$	10.	$\mathbf{F}p(E) \quad \alpha 9$		
9.	$\mathbf{T}\neg p(E) \quad \beta 3$							
10.	$\mathbf{F}p(E) \quad \alpha 9$							
	<table><tr><td>11.</td><td><math>\mathbf{F}p(A) \quad \beta 1</math> *5, 11</td></tr></table>	11.	$\mathbf{F}p(A) \quad \beta 1$ *5, 11	<table><tr><td>12.</td><td><math>\mathbf{T}(p(B) \wedge p(C)) \quad \beta 1</math></td></tr><tr><td>13.</td><td><math>\mathbf{T}p(B) \quad \alpha 12</math></td></tr></table>	12.	$\mathbf{T}(p(B) \wedge p(C)) \quad \beta 1$	13.	$\mathbf{T}p(B) \quad \alpha 12$
11.	$\mathbf{F}p(A) \quad \beta 1$ *5, 11							
12.	$\mathbf{T}(p(B) \wedge p(C)) \quad \beta 1$							
13.	$\mathbf{T}p(B) \quad \alpha 12$							
	14.	$\mathbf{F}(p(B) \vee p(D)) \quad \beta 2$	15.	$\mathbf{T}p(E) \quad \beta 2$ *10,15				

### Korektnosť tablového kalkulu

**Veta 5.17** (Korektnosť tablového kalkulu). *Nech  $S^+$  je množina označených formúl a  $\mathcal{T}$  je uzavreté tablo pre  $S^+$ . Potom je množina  $S^+$  nesplniteľná.*

**Dôsledok 5.18.** *Nech  $S$  je výrokovologická teória a  $X$  je výrokovologická formula. Ak existuje uzavreté tablo pre  $\{\mathbf{T} A \mid A \in S\} \cup \{\mathbf{F} X\}$  (skrát.  $S \vdash_p X$ ), tak z  $S$  výrokovologicky vyplýva  $X$  ( $S \models_p X$ ).*

**Dôsledok 5.19.** *Nech  $X$  je výrokovologická formula. Ak existuje uzavreté tablo pre  $\{\mathbf{F} X\}$  (skrátene  $\vdash_p X$ ), tak  $X$  je tautológia ( $\models_p X$ ).*

### ***Spomeňte si 5.1***

1. Má každé tablo *aspoň* jedno priame rozšírenie?
2. Má každé tablo *najviac* jedno priame rozšírenie?

## **Literatúra**

Christos H. Papadimitriou. *Computational complexity*. Addison-Wesley, 1994. ISBN 978-0-201-53082-7.

Raymond M. Smullyan. *Logika prvého rádu*. Alfa, 1979. Z angl. orig. *First-Order Logic*, Berlin-Heidelberg: Springer-Verlag, 1968 preložil Svätoslav Mathé.