

# vetoresLI

March 23, 2020

## 0.1 Sobre conjuntos linearmente independentes de vetores

Uma família de vetores  $\{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n\}$  é linearmente independente se, e somente se a única forma de se escrever o vetor nulo  $\vec{0}$  como combinação linear é a trivial. Isto também significa que nenhum vetor  $\vec{v}_i$  deste conjunto pode se escrever como combinação linear dos vetores restantes.

Se  $\vec{v}$  é um vetor do sub-espço gerado por  $\{\vec{v}_1 \dots \vec{v}_n\}$  de quantas formas diferentes ele pode ser escrito como combinação linear desses vetores?

Vamos resolver alguns exercícios do Apostol: Considerem os vetores

$$\vec{v}_1 = \mathbf{i} \quad \vec{v}_2 = \mathbf{i} + \mathbf{j} \quad \text{e} \quad \vec{v}_3 = \mathbf{i} + \mathbf{j} + 3\mathbf{k}$$

- Prove que  $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3\}$  é LI
- Escreva os vetores  $\mathbf{i}$  e  $\mathbf{j}$  como combinação linear de  $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3\}$
- Escreva o vetor  $2\mathbf{i} - 3\mathbf{j} + 5\mathbf{k}$  como combinação linear de  $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3\}$ .
- Prove que  $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3\}$  é uma base.

*Exercício 13*

- Mostre que os vetores  $(\sqrt{3}, 1, 0)$ ,  $(1, \sqrt{3}, 1)$  e  $(0, 1, \sqrt{3})$  são LI.
- Mostre que os vetores  $(\sqrt{2}, 1, 0)$ ,  $(1, \sqrt{2}, 1)$  e  $(0, 1, \sqrt{3})$  são LD.
- Encontre todos os valores reais possíveis de  $t$  para que os vetores  $(t, 1, 0)$ ,  $(1, t, 1)$  e  $(0, 1, t)$  sejam LI.

*Exercício 15*

Se três vetores de  $V_n$ ,  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$  e  $\vec{c}$  são LI. Verifique se cada uma das afirmações abaixo é verdadeira ou falsa.

- $\vec{a} + \vec{b}$ ,  $\vec{b} + \vec{c}$  e  $\vec{c} + \vec{a}$  formam um conjunto LI.
- $\vec{a} - \vec{b}$ ,  $\vec{b} + \vec{c}$  e  $\vec{c} + \vec{a}$  formam um conjunto LI.

[ ]: