

Guia de Saúde Feminina

# 7 Sintomas Femininos que Não Deves Ignorar

---

O que o teu corpo está a tentar dizer-te  
e quando procurar ajuda médica

Guia gratuito • [consultas-online.pt](https://consultas-online.pt)

Este guia tem carácter informativo e não substitui consulta médica. © [consultas-online.pt](https://consultas-online.pt) 2026

# O teu corpo fala. Estás a ouvir?

A mulher portuguesa tende a minimizar os seus próprios sintomas. "Deve ser stress", "vai passar", "não é nada de grave" — são frases que adiamos durante meses, por vezes anos, enquanto o corpo tenta chamar a nossa atenção.

A maioria das doenças graves tem um período de desenvolvimento silencioso em que os sinais existem mas são subtis. É exactamente nesse período que a intervenção médica é mais eficaz — e menos invasiva.

Este guia reúne 7 sintomas que as mulheres ignoram com frequência, explica o que pode estar na sua origem e indica quando é urgente procurar avaliação médica. Não é para assustar — é para informar. Porque o conhecimento é a melhor ferramenta de prevenção que existe.

## Como usar este guia

- Lê cada sintoma com atenção. Se te revêes em algum deles, não faças autodiagnóstico.
- Usa este guia como ponto de partida para uma conversa com a tua médica.
- Sem médico de família? Podes fazer uma videoconsulta em [consultas-online.pt](https://consultas-online.pt).

## Importante: este guia não substitui avaliação médica.

Se tens sintomas preocupantes, procura sempre orientação de uma profissional de saúde. Em caso de urgência, recorre ao SNS24 (808 24 24 24) ou à urgência hospitalar.

# 1

## Sangramento fora do período menstrual



Qualquer sangramento vaginal que ocorra fora do período menstrual habitual deve ser avaliado por um médico — especialmente se fores pós-menopáusia, onde qualquer sangramento é considerado anormal até prova em contrário.

Causas possíveis: pólipos uterinos ou cervicais, miomas, hiperplasia do endométrio, síndrome do ovário poliquístico, alterações hormonais, infeções como cervicite ou endometrite, alterações da tiróide, e em casos mais raros, cancro do colo do útero ou do endométrio.

O sangramento após relações sexuais (pós-coital) é particularmente importante de avaliar, pois pode ser sinal de alterações no colo do útero que requerem investigação imediata.

### Procura avaliação urgente se:

- O sangramento é abundante ou prolongado
- Acompanhado de dor pélvica intensa
- Ocorre após a menopausa
- Tens mais de 40 anos com ciclos irregulares recentes

## 2 Dor pélvica persistente



A dor pélvica crónica — definida como dor na região abaixo do umbigo com duração superior a 6 meses — afecta cerca de 15% das mulheres em idade fértil. É frequentemente subestimada e demora em média 7 a 10 anos a ser diagnosticada correctamente quando causada por endometriose.

Causas possíveis: endometriose, síndrome do ovário poliquístico, quistos ováricos, miomas, doença inflamatória pélvica, síndrome do intestino irritável, aderências pós-cirúrgicas e, mais raramente, neoplasias pélvicas.

### **Procura avaliação se:**

- Dor que interfere com as actividades diárias ou com o trabalho
- Dor intensa durante ou após relações sexuais (dispareunia)
- Dor que piora durante o período menstrual (dismenorreia severa)
- Dor acompanhada de febre, náuseas ou corrimento anormal

### 3 Alterações na mama



O cancro da mama é o cancro mais frequente nas mulheres a nível mundial. Em Portugal, são diagnosticados cerca de 7.000 novos casos por ano. A boa notícia é que quando detectado precocemente, a taxa de sobrevivência a 5 anos é superior a 90%.

O que debes monitorizar mensalmente: qualquer nódulo ou espessamento novo na mama ou axila, alterações na pele da mama (vermelhidão, retracção, aspecto de casca de laranja), alterações no mamilo (retracção, secreção espontânea, especialmente se sanguinolenta), e alterações no contorno ou tamanho da mama.

O autoexame deve ser feito entre o 7.º e o 10.º dia do ciclo menstrual, quando as mamas estão menos tensas. Em posições diferentes — deitada e de pé — com movimentos circulares sistemáticos cobrindo toda a mama e axila.

#### **Procura avaliação urgente se:**

- Nódulo novo de aparecimento recente, especialmente se duro e de bordos irregulares
- Secreção espontânea do mamilo, especialmente se sanguinolenta e unilateral
- Alterações da pele da mama — vermelhidão persistente, retracção ou edema
- Tens história familiar de cancro da mama (mãe, irmã, avó)

## 4

## Fadiga extrema e inexplicada



O cansaço crónico que não melhora com o descanso é um dos sintomas mais comuns e mais ignorados pela mulher portuguesa. É frequentemente atribuído ao stress ou ao ritmo de vida — mas pode ter causas orgânicas tratáveis que, identificadas a tempo, têm resolução simples.

Causas mais comuns: anemia ferropénica (muito frequente em mulheres em idade fértil por perda menstrual), hipotireoidismo (a disfunção tiroideia afecta 5 a 8 vezes mais as mulheres), deficiência de vitamina D, deficiência de vitamina B12, diabetes tipo 2, depressão e burnout, apneia do sono, e doenças autoimunes como o lúpus ou a artrite reumatoide.

### O que pedir nas análises:

- Hemograma completo, ferro e ferritina, vitamina D, vitamina B12
- TSH (função tiroideia) — muitas vezes omitido no painel standard
- Glicemia em jejum e HbA1c — para excluir diabetes
- Pede à tua médica um painel completo — não apenas o hemograma

## 5 Alterações do ciclo menstrual



O ciclo menstrual é considerado o quinto sinal vital da mulher — tal como a tensão arterial ou a frequência cardíaca. Alterações significativas no ciclo são frequentemente o primeiro sinal de que algo no organismo está em desequilíbrio.

O que é considerado alteração: ciclos com duração inferior a 21 dias ou superior a 35 dias, períodos com duração superior a 7 dias, fluxo muito abundante (necessidade de trocar penso/tampão mais do que de hora a hora), dores menstruais que imobilizam, ausência de período por mais de 3 meses sem causa conhecida, e spotting entre períodos.

Causas possíveis: síndrome do ovário poliquístico (SOPK), endometriose, miomas, alterações da tireóide, hiperprolactinemia, doença inflamatória pélvica, stress crónico severo, distúrbios alimentares, e perimenopáusia nas mulheres com mais de 40 anos.

### **Procura avaliação se:**

- Ausência de período por mais de 3 meses (amenorreia)
- Fluxo tão abundante que causa anemia (tonturas, palidez, cansaço)
- Dores que não respondem a anti-inflamatórios comuns
- Alterações súbitas num ciclo que sempre foi regular

## 6

## Perda de peso involuntária



Perder mais de 5% do peso corporal em 6 meses sem alteração intencional da dieta ou do exercício é considerado um sinal de alerta clínico que requer investigação. Ao contrário do que muitas mulheres pensam, não é um sinal positivo.

Causas possíveis: hipertireoidismo (a tiróide em excesso acelera o metabolismo), diabetes tipo 1 ou descompensada, doença de Crohn ou doença celíaca, depressão severa ou perturbação de ansiedade, e em casos mais raros, neoplasias — onde a perda de peso é frequentemente um dos primeiros sinais.

A perda de peso involuntária é especialmente preocupante quando acompanhada de outros sintomas como fadiga intensa, suores nocturnos, febre baixa persistente, gânglios aumentados ou alterações do trânsito intestinal.

### Procura avaliação urgente se:

- Perda de mais de 5% do peso em menos de 6 meses sem causa conhecida
- Perda de peso acompanhada de suores nocturnos e febre
- Perda de peso com aparecimento de gânglios palpáveis
- Perda de peso com alterações do intestino ou sangue nas fezes



## 7

## Alterações da pele, cabelo e unhas



A pele, o cabelo e as unhas são frequentemente espelhos do estado de saúde interno. Alterações persistentes nestas estruturas podem reflectir desequilíbrios hormonais, deficiências nutricionais ou doenças sistémicas que merecem investigação.

### Queda de cabelo difusa

Pode indicar hipotireoidismo, deficiência de ferro ou ferritina, deficiência de zinco, síndrome do ovário poliquístico (queda com padrão masculino), deficiência de biotina, ou stress físico severo como cirurgias ou partos.

### Acne persistente na idade adulta

Acne que persiste ou aparece após os 25 anos, especialmente na zona do queixo e mandíbula, é frequentemente de origem hormonal. Pode indicar SOPK, resistência à insulina ou excesso de androgénios.

### Pele muito seca ou muito oleosa de forma súbita

Alterações súbitas na hidratação da pele sem mudança de rotina podem reflectir alterações da tiróide — a pele muito seca é típica do hipotireoidismo, enquanto a pele muito oleosa pode indicar excesso de androgénios.

### Manchas escuras (acantose nigricans)

Manchas de pele escura e aveludada, especialmente na nuca, axilas ou virilhas, são frequentemente um sinal de resistência à insulina e pré-diabetes — condição que, sem intervenção, pode evoluir para diabetes tipo 2.

## **Unhas quebradiças ou com alterações de cor**

Unhas muito quebradiças podem indicar deficiência de ferro, biotina ou cálcio. Unhas com manchas brancas podem reflectir deficiência de zinco. Alterações de cor das unhas requerem sempre avaliação médica.

---

# Quando agir — guia rápido

Um resumo prático para cada situação

## ■ URGÊNCIA — Vai à urgência hospitalar

- Sangramento abundante com tonturas ou síncope
- Dor pélvica intensa de início súbito (possível torção ovárica)
- Febre alta com dor pélvica (possível doença inflamatória pélvica grave)
- Sangramento abundante na gravidez

## ■ URGENTE — Marca consulta esta semana

- Sangramento pós-menopáusico
- Nódulo novo na mama de aparecimento recente
- Perda de peso involuntária superior a 5% em 6 meses
- Ausência de período por mais de 3 meses sem causa conhecida

## ■ IMPORTANTE — Marca consulta no próximo mês

- Ciclo irregular há mais de 3 meses
- Cansaço crónico que não melhora com o descanso
- Dor pélvica persistente mas controlável
- Alterações da pele, cabelo ou unhas sem causa aparente
- Dores menstruais que interferem com as actividades diárias

## Sem médico de família? Resolve por videoconsulta.

consultas-online.pt • Segunda a domingo, das 9h às 21h • A partir de 35€

# Referências Bibliográficas

Este guia é baseado nas seguintes fontes de evidência científica

1. Direção-Geral da Saúde (DGS). Programa Nacional para as Doenças Oncológicas — Cancro da Mama. Lisboa: DGS; 2023.
2. Direção-Geral da Saúde (DGS). Orientação n.º 007/2022 — Rastreio do Cancro do Colo do Útero. Lisboa: DGS; 2022.
3. Liga Portuguesa Contra o Cancro. Cancro da Mama em Portugal — Estatísticas e Factores de Risco. Lisboa: LPCC; 2023.
4. Sociedade Portuguesa de Ginecologia (SPG). Recomendações para o Diagnóstico e Tratamento da Endometriose. Lisboa: SPG; 2022.
5. Sociedade Portuguesa de Ginecologia (SPG). Síndrome do Ovário Poliquístico — Orientações Clínicas. Lisboa: SPG; 2021.
6. European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE). Guideline on Endometriosis. 2022.
7. American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). Abnormal Uterine Bleeding. Practice Bulletin No. 214. 2023.
8. Sociedade Portuguesa de Endocrinologia (SPEDM). Hipotiroidismo na Mulher — Diagnóstico e Tratamento. Lisboa: SPEDM; 2022.
9. Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA). Inquérito Nacional de Saúde com Exame Físico. Lisboa: INSA; 2022.
10. World Health Organization (WHO). Cancer — Breast Cancer Factsheet. Geneva: WHO; 2024.
11. Sociedade Portuguesa de Medicina Interna (SPMI). Anemia Ferropénica na Mulher em Idade Fértil. Lisboa: SPMI; 2023.
12. Associação Portuguesa de Endometriose (APE). Endometriose em Portugal — Dados Epidemiológicos. Lisboa: APE; 2023.
13. European Menopause and Andropause Society (EMAS). Position Statement on Abnormal Uterine Bleeding. Maturitas. 2023.
14. Ordem dos Médicos. Regulamento de Boas Práticas em Telemedicina. Lisboa: OM; 2020.
15. Decreto-Lei n.º 10-A/2020 de 13 de março. Enquadramento Legal da Telemedicina em Portugal. Diário da República; 2020.
16. Sociedade Portuguesa de Dermatologia e Venereologia (SPDV). Alopecia Feminina — Guia de Diagnóstico. Lisboa: SPDV; 2022.
17. American Cancer Society. Breast Cancer Early Detection and Diagnosis. Atlanta: ACS; 2024.
18. INFARMED. Normas de Prescrição Eletrónica de Medicamentos. Lisboa: INFARMED; 2023.

# O teu corpo merece ser ouvido.

Sem médico de família? Sem tempo para o centro de saúde?  
Fala com a nossa médica por videoconsulta — hoje.

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Avaliação de sintomas | Pedido de análises |
| Renovação de receitas | Baixa médica       |
| Atestados médicos     |                    |

**consultas-online.pt**

Segunda a domingo • 9h às 21h • A partir de 35€ • MBWay

Este guia tem carácter informativo e não substitui consulta médica presencial. © consultas-online.pt 2026