

# Guia de Primeiros Socorros

O que fazer nas situações de emergência mais comuns  
antes de chegar o socorro médico

## ■ EMERGÊNCIA — LIGUE 112

■  
SNS 24  
808 24 24 24

■  
Bombeiros  
117

■  
GNR / PSP  
112

Este guia foi criado pela equipa médica da ConsultasOnline para ajudar a saber o que fazer nas situações de emergência mais comuns, nos primeiros minutos decisivos antes de chegar o socorro. Guarde-o no telemóvel ou imprima e coloque num local acessível em casa.

## ♥■ 1. Paragem Cardiorrespiratória — Como fazer RCP

Sinais de alerta: pessoa inconsciente, não respira ou respira de forma anormal, sem pulso.

1

**LIGUE 112**

**imediatamente**

Peça ajuda em voz alta. Active o 112 e siga as instruções do operador.

**2****VERIFIQUE  
a segurança**

Certifique-se que o local é seguro. Chame a pessoa pelo nome e toque nos ombros.

**3****INCLINE  
a cabeça**

Incline a cabeça para trás e eleve o queixo para abrir a via aérea.

**4****COMPRESSÕES  
no peito**

30 compressões fortes no centro do peito, 5-6 cm de profundidade, ritmo de 100-120/min.

**5****INSUFLAÇÕES  
(se treinado)**

2 insuflações após 30 compressões. Se não sabe, apenas compressões contínuas.

**6****CONTINUE  
até socorro**

Mantenha até o doente recuperar, chegarem os socorros ou estar fisicamente incapaz.

## ■ 2. Engasgamento — Manobra de Heimlich

Sinais: pessoa não consegue falar, tossir ou respirar, leva as mãos à garganta.

| ■ Bebê (menos de 1 ano)                                                                                                                                                                                                          | Adulto ou criança maior                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Segure o bebê de barriga para baixo no seu antebraço 2. Dê 5 pancadas firmes entre as omoplatas 3. Vire o bebê e dê 5 compressões no peito 4. Alterne até desobstruir ou o bebê perder consciência 5. Ligue 112 imediatamente | 1. Fique atrás da pessoa, incline-a ligeiramente para a frente 2. Dê 5 pancadas fortes entre as omoplatas 3. Se não resultar: 5 compressões abdominais (Heimlich) — punho fechado entre umbigo e esterno, puxe para si e para cima 4. Alterne 5 pancadas + 5 compressões 5. Ligue 112 se não resolver rapidamente |

## ■ 3. Hemorragia — Como controlar o sangramento

1

### **Pressão directa**

Aplique pressão firme e contínua sobre a ferida com pano limpo ou gaze. Não retire — se encharcar, adicione mais por cima.

2

### **Eleve o membro**

Se possível, eleve o membro lesado acima do nível do coração para reduzir o fluxo de sangue.

3

### **Não retire objetos**

Se houver um objeto encravado (vidro, faca), NÃO o retire. Imobilize e ligue 112.

4

### **Torniquete**

Apenas se a hemorragia for grave num membro e incontrollável: aplique torniquete a 5 cm acima da ferida. Registe a hora.

## ■ 4. Queimaduras

### ■ O que FAZER

- Arrefecer com água fria corrente durante 20 min
- Retirar roupa e jóias (se não estiverem coladas)
- Cobrir com pano limpo e húmido
- Ligue 112 para queimaduras extensas ou no rosto

### ■ O que NÃO fazer

- Não use gelo, manteiga ou pasta de dentes
- Não rebente bolhas
- Não retire roupas coladas à pele
- Não aplique pomadas sem indicação médica

## ■ 5. Desmaio e Perda de Consciência

1

### **Deite a pessoa**

Deite-a de costas num local seguro. Eleve as pernas 30 cm se não houver suspeita de lesão.

**2****Via aérea**

Incline a cabeça e eleve o queixo. Verifique se respira normalmente.

**3****Posição lateral**

Se estiver inconsciente mas a respirar: coloque em posição lateral de segurança (PLS).

**4****Monitorize**

Não lhe dê nada a beber. Desaperte roupas apertadas. Fique ao seu lado até recuperar.

## ■ 6. Reação Alérgica Grave — Anafilaxia

**Sinais de anafilaxia:** dificuldade respiratória, inchaço da face/lábios/língua, urticária generalizada, queda brusca da tensão, perda de consciência.

### ■ LIGUE 112 IMEDIATAMENTE — É uma emergência médica

- Se a pessoa tiver auto-injetor de adrenalina (EpiPen), aplique imediatamente na coxa exterior
- Deite a pessoa deitada com as pernas elevadas (excepto se tiver dificuldade respiratória — sentada)
- Não lhe dê medicamentos orais se tiver dificuldade em engolir
- Monitorize a respiração e o pulso até chegarem os socorros

## ■ 7. Convulsões

### ■ FAÇA

- Afaste objectos perigosos
- Proteja a cabeça com algo macio
- Coloque em PLS após a convulsão
- Ligue 112 se durar mais de 5 min
- Ligue 112 se não recuperar

### ■ NÃO FAÇA

- Não imobilize a pessoa à força
- Não coloque nada na boca
- Não dê água durante a convulsão
- Não deixe a pessoa sozinha
- Não tente "acordar" a força

## ■ 8. Urgências vs Consulta Online — quando escolher cada um

### ■ Vá às Urgências / Ligue 112

- Dor no peito ou dificuldade respiratória
- Perda de consciência
- AVC (boca torta, braço caído, fala alterada)
- Hemorragia grave
- Queimaduras extensas
- Traumatismos graves
- Febre muito alta com mau estado geral
- Convulsões
- Anafilaxia

### ■ Consulta Online resolve

- Baixa médica (CIT)
- Infecção urinária não complicada
- Amigdalite sem sinais de alarme
- Renovação de receitas crónicas
- Atestados (amamentação, escola, condução)
- Rastreio de DST/IST
- Cessaçao tabágica
- Dúvidas médicas gerais
- Situações não urgentes

## ■ 9. Kit de Primeiros Socorros em Casa

O kit ideal para ter em casa inclui:

- ■ Paracetamol e ibuprofeno (adultos e crianças)
- ■ Pensos rápidos em vários tamanhos e ligaduras
- ■ Solução antisséptica (clorohexidina ou iodopovidona)
- ■■ Termómetro digital
- >■ Tesoura de pontas rombas e pinça
- ■ Luvas descartáveis (pelo menos 4 pares)
- ■ Tensiómetro (especialmente em hipertensos)
- ■ Seringa (para lavar feridas) e compressas esterilizadas
- ■ Lista de medicação habitual e alergias de cada membro da família
- ■ Números de emergência impressos: 112 SNS24 (808 24 24 24), médico assistente

## ■ Consulta Médica Online — Quando Não é Emergência

Baixa médica · Atestados · Renovação de receitas · Rastreio DST

Sem filas · Sem deslocações · MBWay · Fatura AT · Médicos com cédula

**www.consultas-online.pt**

