
TYR^0: latent-logarithm PMF, valid blocks only (no empty bin 0-50 A), all molecules vs monomers (water 40-50 A = 0; shaded: bootstrap SE)
(a) TYR^0, 0.2 M (SCY)
US (SCY): min -18.3 ± 0.4 at 11.6 A
total: min -16.1 ± 0.8 at 11.5 A; valid blocks 9/9 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
monomer: min -14.3 ± 0.8 at 11.5 A; valid blocks 9/9 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
(b) TYR^0, 0.1 M (SCY-1)
US (SCY): min -18.3 ± 0.4 at 11.6 A
total: min -16.1 ± 1.5 at 11.5 A; valid blocks 3/9 (2, 3, 6)
monomer: min -15.2 ± 1.4 at 11.5 A; valid blocks 3/9 (2, 3, 6)
PMF (kJ/mol)
(c) Monomer fraction per |z| bin (thin: 9 valid blocks; dashed: overall)
(d) Monomer fraction per |z| bin (thin: 3 valid blocks; dashed: overall)
Monomer fraction
|z| (Å)
MD latent log: All molecules (total)
MD latent log: Monomers only (0 contacts < 4.5 A)
Umbrella sampling (SCY, isolated solutes)