
SCY (TYR) pooled counts, 3 trajectory blocks: 0.2 M vs 0.1 M, membrane vs water reference
Membrane reference (minimum in 0-20 A = 0)
Water reference (mean 40-50 A probability = 0)
SCY 0.2 M
SCY 0.1 M
Pooled-count PMF (kJ/mol)
$G_{0.2\,M} - G_{0.1\,M}$ (kJ/mol)
|z| (Å)
0-20 A: p(max|t|) = 0.0014, p(offset) = 0.0014
mean diff = -0.44 +/- 0.11 kJ/mol, defined 100.0%, min. p = 0.0014
0-50 A: p(max|t|) = 0.0014, p(offset) = 0.0014
mean diff = -1.66 +/- 0.70 kJ/mol, defined 96.3%, min. p = 0.0014
0-20 A: p(max|t|) = 0.0100, p(offset) = 0.0868
mean diff = +2.49 +/- 1.27 kJ/mol, defined 96.3%, min. p = 0.0014
0-50 A: p(max|t|) = 0.0014, p(offset) = 0.1166
mean diff = +1.27 +/- 0.67 kJ/mol, defined 96.3%, min. p = 0.0014
Bands: exact bootstrap SE over 3 trajectory blocks x sqrt(3/2); reference re-estimated per replicate. p-values: centred exact bootstrap (27 x 27 = 729 resample pairs); replicates with undefined bins excluded.