Berufsverband der Coloproktologen Deutschlands e.V. (BCD)
info@coloproktologen.de
www.coloproktologen.de

Deutsche Gesellschaft für Koloproktologie e.V. (DGK)
info@koloproktologie.org
www.koloproktologie.org

Deutsche Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie (DGAV)
www.dgav.de

Chirurgische Arbeitsgemeinschaft für Coloproctologie (CACP)
www.dgav.de

Stellungnahme zur

zur postoperativen proktologischen Wundversorgung

In den Empfehlungen zur Prävention postoperativer Wundinfektionen der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO) beim Robert Koch-Institut (RKI), veröffentlicht im Bundesgesundheitsbl 2018.61:448-473, wird auf die Besonderheiten bei proktologischen Operationen nicht explizit eingegangen. Die Empfehlungen zielen auch vornehmlich auf primär heilende Wunden ab. Allerdings wird im letzten Kapitel (4.4, S. 464) „Operationen mit geringem SSI-Risiko“ festgelegt, dass bei Operationen mit geringem SSI-Risiko einfachere bauliche Voraussetzungen genügen (Einzelheiten s. dort). Auch wird festgelegt, dass die Entscheidung, was Operationen mit geringem SSI-Risiko sind, durch den lokalen chirurgischen Fachvertreter und den beratenden Hygieniker getroffen wird. Obige Gesellschaften sehen in proktologischen Operationen mit regelmäßig sekundärer Wundheilung grundsätzlich Operationen mit geringem SSI-Risiko.

In Bezug auf die postoperative Wundbetreuung und die regelmäßig erforderliche Reinigung der Analregion nach proktologischen Eingriffen ist eine eindeutige Klärung in den Empfehlungen zur Prävention postoperativer Wundinfektionen der KRINKO nicht enthalten. Daher weisen obige Gesellschaften in diesem Zusammenhang auf den Leitfaden und die Empfehlungen für die Hygiene in der Koloproktologie Teil 1 und Teil 2 hin, nach dem die Reinigung der Analregion nach proktologischen Operationen gemäß dem eigenen Hygieneplan bzw. bisher üblichen Standard nach bewährter klinischer Expertise beizubehalten ist, bis zu dieser Frage neue Erkenntnisse aus Studien vorliegen, bzw. eine klärende Empfehlung durch die KRINKO erfolgt. Dieses schließt eine Reinigung der Analregion postoperativ mit Leitungswasser in Trinkwasserqualität ein.

Freiburg, April 2018

Dr. B. Strittmatter
Vorsitzender BCD

Prof. Dr. A. Herold
Generalsekretär DGK

Prof. Dr. O. Schwandner
Vorsitzender CACP

Prof. Dr. H. Buhr
Sekretär DGAV

Geschäftsstelle BCD/DGK
Maienstraße 3 Tel.: 0761/70438-113
79102 Freiburg Fax: 0761/70438-114