

$$\begin{cases} -\nabla p_i + n_i m_i \vec{g} + e n_i (\vec{E} + \vec{v}_i \times \vec{B}) - n_i m_i \nu_i (\vec{v}_i - \vec{u}) = 0 \\ -\nabla p_e + n_e m_e \vec{g} - e n_e (\vec{E} + \vec{v}_e \times \vec{B}) - n_e m_e \nu_e (\vec{v}_e - \vec{u}) = 0 \end{cases}$$

Обозначим

$$\vec{f} = e\vec{E} + m_i \nu_i \vec{u} - \frac{1}{n_i} \nabla p_i + m_i \vec{g}$$

Уравнение для ионов:

$$\vec{f} + e\vec{v}_i \times \vec{B} - m_i \nu_i \vec{v}_i = 0 \quad (1)$$

Выражаем \vec{v}_i :

$$\vec{v}_i = \frac{\vec{f}}{m_i \nu_i} + \frac{e}{m_i \nu_i} \vec{v}_i \times \vec{B} \quad (2)$$

Множим (2) на \vec{B} векторно и скалярно:

$$\begin{cases} \vec{v}_i \times \vec{B} = \frac{1}{m_i \nu_i} [\vec{f} \times \vec{B} - e B^2 \vec{v}_i + e(\vec{v}_i; \vec{B}) \vec{B}] \\ (\vec{v}_i; \vec{B}) = \frac{(\vec{f}; \vec{B})}{m_i \nu_i} \end{cases}$$

Подставим найденное скалярное произведение в правую часть выражения для векторного произведения:

$$\vec{v}_i \times \vec{B} = \frac{1}{m_i \nu_i} \left[\vec{f} \times \vec{B} - e B^2 \vec{v}_i + e \frac{(\vec{f}; \vec{B})}{m_i \nu_i} \vec{B} \right]$$

Теперь это векторное произведение подставим в уравнение движения (1):

$$\vec{v}_i = \frac{\vec{f}}{m_i \nu_i} + \frac{e}{(m_i \nu_i)^2} \left(\vec{f} \times \vec{B} - e B^2 \vec{v}_i + e \frac{(\vec{f}; \vec{B})}{m_i \nu_i} \vec{B} \right) \quad (3)$$

Подставим \vec{f} : предполагаем, что компоненты сил тяжести и градиента давления, ортогональные магнитному полю, малы по сравнению с силой Лоренца

$$\left(1 + \left(\frac{eB}{m_i\nu_i}\right)^2\right) \vec{v}_i = \frac{e\vec{E}}{m_i\nu_i} + \vec{u} - \frac{\nabla p_i}{n_i m_i \nu_i} + \frac{\vec{g}}{\nu_i} + \frac{(m_i \nu_i \vec{u} - \frac{1}{n_i} \nabla p_i + m_i \vec{g}; \vec{B})}{m_i \nu_i} \vec{B}$$