

# Annexe A

## Fondamentaux et compléments

### Sommaire

<b>A.1 Fondamentaux</b>	<b>143</b>
A.1.1 Éléments de théorie des ensembles	143
A.1.2 Structures fondamentales : relations et structures algébriques	144
A.1.3 Cardinalité	146
A.1.4 L'ensemble des réels : construction et structures afférentes	151
A.1.5 Inégalités fondamentales	156
<b>A.2 Pour aller plus loin (••••)</b>	<b>158</b>
A.2.1 Théorie des ensembles, cardinalité	158
A.2.2 Complété d'un espace métrique (••••)	158
A.2.3 Topologie générale (••••)	159

### A.1 Fondamentaux

#### A.1.1 Éléments de théorie des ensembles

**Notations A.1.1.** (o) Soit  $X$  un ensemble, on note  $\mathcal{P}(X)$  l'ensemble des parties de  $X$ , c'est à dire l'ensemble des sous-ensembles constitués d'éléments de  $X$ .

Soit  $A$  une partie de  $X$ . On note  $A^c$  le complémentaire de  $A$  dans  $X$ , c'est-à-dire l'ensemble des éléments de  $X$  qui ne sont pas dans  $A$ .

Soient  $A$  et  $B$  deux parties d'un ensemble  $X$ . On dit que  $A$  est inclus dans  $B$ , et l'on écrit  $A \subset B$ , si tout élément de  $A$  est aussi élément de  $B$  :

$$x \in A \implies x \in B.$$

On a <sup>1</sup>  $\emptyset \subset B$  pour toute partie  $B$ .

Soient  $A$  et  $B$  deux parties d'un ensemble  $X$ . On note  $A \cap B$  l'*intersection* de  $A$  et  $B$ , c'est à dire l'ensemble des éléments qui appartiennent à la fois à  $A$  et à  $B$  :

$$A \cap B = \{x \in X, x \in A \text{ et } x \in B\}.$$

On note  $A \cup B$  l'*union* de  $A$  et  $B$ , c'est à dire l'ensemble des éléments qui sont dans  $A$  ou dans  $B$  :

$$A \cup B = \{x \in X, x \in A \text{ ou } x \in B\}.$$

---

1. Cette assertion est à la fois évidente et troublante, du fait que l'ensemble vide est inclus dans toute partie de n'importe quel ensemble. Ce fait rend possible d'énoncer des propriétés comme : tout élément de l'ensemble vide est un *porte-clé*, ce qui signifie précisément que l'assertion : “ $\forall x \in A, x$  est un porte-clé” est vraie pour  $A = \emptyset$ . De façon générale, toute propriété portant sur les éléments d'un ensemble est systématiquement vérifiée par l'ensemble vide.

Si  $(A_i)_{i \in I}$  est une famille de parties disjointes de  $X$ , non vides, dont l'union est égale à  $X$ , on dit qu'elle réalise une *partition* de  $X$ .

On note  $A \setminus B$  la *différence ensembliste* de  $A$  et  $B$ , c'est à dire l'ensemble des éléments qui sont dans  $A$ , mais pas dans  $B$  :

$$A \setminus B = \{x \in X, x \in A, x \notin B\} = A \cap B^c.$$

Soient  $X$  et  $Y$  deux ensembles. On appelle *produit cartésien* de  $X$  et  $Y$ , et l'on note  $X \times Y$ , l'ensemble des couples  $(x, y)$  avec  $x \in X$  et  $y \in Y$ .

Soient  $X$  et  $Y$  deux ensembles, on note  $Y^X$  l'ensemble des applications de  $X$  vers  $Y$ . On peut représenter chaque application par une partie de  $X \times Y$  qui, pour tout  $x$ , contient un unique couple du type  $(x, y)$  (l'élément  $y$  est l'image de  $x$  par l'application considérée). L'ensemble des couples  $(x, f(x))$ , qui est une partie de  $X \times Y$ , est appelé *graphe* de l'application  $f$ .

On peut identifier une partie  $A$  d'un ensemble  $X$  à sa *fonction indicatrice*<sup>2</sup>  $\mathbb{1}_A$ , qui à chaque élément  $x$  de  $X$  associe la valeur 1 ou 0, selon que  $x$  soit dans  $A$  ou pas. Chaque partie pouvant ainsi être représentée (ou "codée", pour utiliser un terme informatique) à une application de  $X$  dans  $\{0, 1\}$ , on note parfois  $2^X$  l'ensemble des parties de  $X$ .

**Définition A.1.2.** (Autour de la notion d'application ( $\circ$ ))

Soient  $X$  et  $Y$  deux ensembles, et  $f$  une application de  $X$  dans  $Y$ . Pour tout  $y \in Y$ , on appelle image réciproque de  $y$ , et l'on note<sup>3</sup>  $f^{-1}(\{y\})$  (ou  $f^{-1}(y)$ ) l'ensemble des antécédents de  $y$  :

$$f^{-1}(y) = \{x, y = f(x)\}.$$

On définit de la même manière l'image réciproque d'un ensemble  $B \subset Y$  par

$$f^{-1}(B) = \{x, f(x) \in B\}.$$

On dit que  $f$  est *injective* si deux éléments de  $X$  ne peuvent avoir la même image, c'est-à-dire si l'image réciproque de tout  $y \in Y$  contient au plus un élément.

On dit que  $f$  est *surjective* si tout élément de l'espace d'arrivée  $Y$  a au moins un antécédent, c'est-à-dire si l'image réciproque de tout  $y \in Y$  contient au moins un élément.

On dit que  $f$  est *bijective* si elle est injective et surjective, c'est-à-dire si l'image réciproque de tout élément de l'ensemble d'arrivée contient exactement un élément.

**Remarque A.1.3.** Toutes les opérations ensemblistes peuvent être traduites en terme de fonctions indicatrices. Par exemple si, pour  $C \subset X$ , on définit  $\mathbb{1}_C$  comme la fonction qui vaut 1 sur  $C$ , 0 à l'extérieur de  $C$ , on a

$$\mathbb{1}_{A \cup B} = \max(\mathbb{1}_A, \mathbb{1}_B), \quad \mathbb{1}_{A \cap B} = \min(\mathbb{1}_A, \mathbb{1}_B) = \mathbb{1}_A \times \mathbb{1}_B, \quad \mathbb{1}_{A^c} = 1 - \mathbb{1}_A.$$

## A.1.2 Structures fondamentales : relations et structures algébriques

### Relations

**Définition A.1.4.** (Relation, relation d'équivalence, classes d'équivalence ( $\circ$ ))

Soit  $X$  un ensemble. Une relation est la donnée d'une partie  $R$  de  $X \times X$ , dénotée par le symbole  $\mathcal{R}$  selon la convention

$$(x, x') \in R \iff x \mathcal{R} x'.$$

On parle de *relation d'équivalence* si elle vérifie les propriétés suivantes :

2. Le terme de fonction *caractéristique* est parfois utilisé, mais nous l'évitons ici car il prend un autre sens dans le contexte des probabilités. On prendra néanmoins garde au fait que le terme de fonction indicatrice prend lui aussi un autre sens en *analyse convexe*, et donc en optimisation, désignant une fonction associée à un ensemble qui prend la valeur 0 dans l'ensemble, et  $+\infty$  à l'extérieur.

3. On prendra garde à la confusion possible avec l'application inverse d'une bijection, notée également  $f^{-1}$ . Pour distinguer l'application considérée ici de cet inverse défini (quand c'est possible) de  $Y$  dans  $X$ , on utilise en général la notation ensembliste  $f^{-1}(\{y\})$ , qui rappelle que l'on considère ici une application qui à un ensemble (une partie de  $Y$ ) associe un ensemble (une partie de  $X$ ), qui peut être vide, ou non réduite à un singleton.

- (i) (*réflexivité*) Pour tout  $x \in X$ ,  $x \mathcal{R} x$ .
- (ii) (*symétrie*) Pour tous  $x, y \in X$ ,  $x \mathcal{R} y \iff y \mathcal{R} x$ .
- (iii) (*transitivité*) Pour tous  $x, y, z \in X$ ,

$$x \mathcal{R} y \text{ et } y \mathcal{R} z \implies x \mathcal{R} z.$$

Pour tout  $x \in X$ , on appelle classe d'équivalence l'ensemble

$$\bar{x} = \{y \in X, y \mathcal{R} x\} \in \mathcal{P}(X).$$

L'ensemble  $\bar{X}$  constitué de ces classes est appelé espace quotient, ce que l'on note  $\bar{X} = X / \mathcal{R}$ .

L'application qui à  $x \in X$  associe sa classe  $\bar{x}$  est par construction une surjection, appelée *surjection canonique*.

**Remarque A.1.5.** La notion de classes d'équivalence semble se limiter à formaliser différemment la notion de *partition* d'un ensemble. De fait, à toute partition d'un ensemble, i.e.  $X = \bigcup X_i$  (union disjointe), on peut associer canoniquement la relation d'équivalence  $x \mathcal{R} y$  si  $x$  et  $y$  appartiennent au même  $X_i$ . Cette notion est beaucoup plus féconde que cette version ensembliste dès que  $X$  est muni d'une structure, et que la relation d'équivalence respecte cette structure (dans un sens qui dépend de la structure en question). L'espace  $\bar{X}$  des classes d'équivalence hérite alors de la structure de l'espace initial, c'est un espace de même type (groupe, espace vectoriel, espace métrique, ...), qui est "plus petit" puisqu'il existe une surjection de  $X$  vers  $\bar{X}$  (la surjection canonique). L'exemple le plus simple est  $\mathbb{Z}$  quotienté par la relation :  $x \mathcal{R} y$  si et seulement si  $x - y$  est pair. On a deux classes d'équivalences, notés  $\bar{0}$  et  $\bar{1}$ . On peut définir sur l'espace quotient une addition  $\bar{x} + \bar{y} = \overline{x + y}$  (on peut vérifier que ça ne dépend pas du représentant choisi : la somme de deux entiers de même parité est paire, impaire si les parités sont différentes), de telle sorte que l'espace quotient, noté  $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ , est aussi un groupe additif. Dans un tout autre contexte, celui des fonctions mesurables (voir le chapitre B dédié à ces questions), il sera extrêmement fécond d'introduire la relation d'équivalence  $f \mathcal{R} g$  si l'ensemble des points en lesquels  $f$  et  $g$  diffèrent est négligeable. L'espace quotient contient des classes de fonctions, et il hérite des structures de l'espace initial (en particulier la structure d'espace vectoriel).

**Définition A.1.6.** (Relation d'ordre, majorant ( $\circ$ ))

Soit  $X$  un ensemble. Une relation d'ordre sur  $X$  est la donnée d'une partie  $\mathcal{O}$  de  $X \times X$ , dénotée par le symbole  $\leq$  selon la convention

$$(x, x') \in \mathcal{O} \iff x \leq x',$$

qui vérifie les propriétés suivantes :

- (i) (*réflexivité*) pour tout  $x \in X$ ,  $x \leq x$ ,
- (ii) (*antisymétrie*) si  $x \leq y$  et  $y \leq x$  alors  $x = y$ ,
- (iii) (*transitivité*) pour tous  $x, y, z \in X$ ,

$$x \leq y \text{ et } y \leq z \implies x \leq z.$$

On écrit  $x < y$  si  $x \leq y$  et  $x \neq y$ . On dit que l'ordre est *total* si, pour tout  $x \neq y$ , on a  $x < y$  ou  $y < x$ . On dit qu'il est *partiel* dans le cas contraire. Lorsque l'ordre est partiel, deux éléments peuvent ne pas être comparables.

On dit que  $M$  est un *majorant* de  $A \subset X$  si  $x \leq M$  pour tout  $x \in A$ . Si  $A \subset M$  admet un plus petit majorant, on l'appelle *borne supérieure* de  $A$ . On définit de la même manière un *minorant* d'un ensemble, et une *borne inférieure*.

**Exercice A.1.1.** a) Montrer que la relation d'inclusion sur l'ensemble des parties d'un ensemble  $X$  est une relation d'ordre. À partir de quel cardinal de  $X$  l'ordre n'est-il que partiel?

b) Proposer une relation d'ordre sur l'ensemble des partitions d'un ensemble.

c) Décrire les éléments maximaux et minimaux des relations d'ordre évoquées ci-dessus.

**Remarque A.1.7.** Les relations d'équivalence et d'ordre peuvent être encodées par des *graphes*. Pour la relation d'équivalence, on peut considérer l'ensemble  $E \subset X \times X$  des points en relation comme décrivant les arêtes d'un graphe. Cet ensemble est symétrique, de telle sorte que l'on peut identifier  $(x, y) \in E$  et  $(y, x) \in E$ ,  $E$  contient toutes les boucles  $(x, x)$  (réflexivité), et les composantes connexes du graphes sont des *cliques* (i.e. le sous-graphe correspondant est complet : il contient toutes les arêtes possibles entre les sommets).

Pour une relation d'ordre, l'ensemble  $E \subset X \times X$  d'arêtes n'est pas symétrique (ou plutôt il ne l'est que dans le cas d'un graphe éclaté qui ne contient que des boucles, qui représente une relation d'ordre partiel d'un type extrême, où deux éléments distincts ne sont jamais comparables), on parle de graphe *orienté*. Il contient aussi toutes les boucles (réflexivité), vérifie la propriété de transitivité  $(x, y) \in E$  et  $(y, z) \in E$  implique  $(x, z) \in E$ , et ne contient *aucun cycle*, i.e. il n'est pas possible, partant d'un point, de se déplacer en suivant les flèches pour se retrouver au point de départ. On dit que le graphe est *acyclique*.

### A.1.3 Cardinalité

**Définition A.1.8.** (Équipotence)

On dit que deux ensembles  $X$  et  $Y$  sont *équipotents* s'il existe une bijection de  $X$  dans  $Y$ . On écrira alors  $X \simeq Y$  ou <sup>4</sup>  $\text{Card}(X) = \text{Card}(Y)$ .

**Notation A.1.9.** S'il existe une injection de  $X$  dans  $Y$ , on écrit  $X \lesssim Y$ , ou  $\text{Card}(X) \leq \text{Card}(Y)$ . Si de plus il n'existe pas de bijection entre les deux ensembles, on écrira  $X < Y$  ou  $\text{Card}(X) < \text{Card}(Y)$ .

**Théorème A.1.10.** On note  $\mathcal{P}(X)$  l'ensemble des parties de  $X$ . On a

$$\text{Card}(X) < \text{Card}(\mathcal{P}(X)).$$

*Démonstration.* Supposons qu'il existe une surjection  $\varphi$  de  $X$  dans  $\mathcal{P}(X)$ . On introduit

$$A = \{x \in X, x \notin \varphi(x)\}.$$

Comme  $\varphi$  est surjective, il doit exister  $x$  tel que  $\varphi(x) = A$ . Si  $x \in A$ , alors  $x \in \varphi(x)$  d'où  $x \notin A$ . Si  $x \notin A = \varphi(x)$ , alors  $x \in A$ . On a donc contradiction dans les deux cas, ce qui exclut l'existence d'une telle application  $\varphi$ .  $\square$

**Remarque A.1.11.** Malgré le caractère rudimentaire de sa démonstration, la proposition précédente est très générale et profonde. Dans le cas d'un ensemble fini, elle exprime simplement l'inégalité  $n < n!$ . Dans le cas d'ensembles infinis, elle permet de construire différents niveaux d'infini arbitrairement "grands" : partant d'un ensemble  $X$  infini, son ensemble de parties est d'une cardinalité strictement plus grand puisqu'il n'existe pas de bijection entre les deux. On peut itérer en considérant l'ensemble des parties de l'ensemble des parties, etc ..., pour construire formellement une suite d'ensembles infinis de "cardinaux" strictement croissants.

**Définition A.1.12.** (Ensemble dénombrable)

On dit que l'ensemble  $X$  est dénombrable si  $X$  est fini<sup>5</sup>, ou si  $X \simeq \mathbb{N}$ , i.e. s'il est en bijection avec  $\mathbb{N}$ . Un ensemble infini dénombrable est donc énumérable : si l'on note  $\varphi$  la bijection de  $\mathbb{N}$  vers  $X$ , et  $x_n = \varphi(n)$ , l'ensemble  $X$  est exactement la collection des  $x_n$ , et l'on note  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ , ou simplement  $(x_n)$ , la suite associée.

**Proposition A.1.13.** Une union dénombrable d'ensembles infinis dénombrables est dénombrable.

4. On prendra garde à cette notation  $\text{Card}(X) = \text{Card}(Y)$  qui exprime simplement l'existence d'une bijection entre deux ensembles. Dans le cas d'ensembles finis, cela correspond bien à l'identité des cardinaux, mais pour des ensembles infinis, il faut lire comme un tout cette identité, qui implique des "quantités" ( $\text{Card}(X)$  et  $\text{Card}(Y)$ ) qui n'ont pas été définies.

5. Certains auteurs considèrent que l'attribut dénombrable est restreint aux ensemble infinis. Nous faisons ici le choix de considérer qu'un ensemble fini est dénombrable, ce qui permet de simplifier l'énoncé d'un grand nombre de propriétés. Ce choix impose de préciser *infini dénombrable* pour un ensemble qui est en bijection avec  $\mathbb{N}$ .

	9					
$X_2$	5	8				
$X_1$	2	4	7			
$X_0$	0	1	3	6		

FIGURE A.1.1 – Énumération d'une réunion dénombrable d'ensembles dénombrables

*Démonstration.* Nous établissons la propriété dans le cas où l'union et les ensembles sont infinis. Soit  $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une famille d'ensembles infinis dénombrables. On peut énumérer les éléments de chaque  $X_n$  :  $X_n = \{x_n^k, k \in \mathbb{N}\}$ . On peut énumérer les éléments de la réunion de la façon suivante :

$$x_0^0, x_0^1, x_1^0, x_0^2, x_1^1, x_2^0, x_0^3, \dots$$

comme illustré par la figure A.1.1. Dans le cas où certains des ensembles sont finis, ou si la réunion est finie, ou si les ensembles partagent certains de leurs éléments, la construction précédente permet d'établir une bijection entre la réunion et une partie de  $\mathbb{N}$ , cette réunion est donc finie ou infinie dénombrable.  $\square$

**Proposition A.1.14.** Un produit fini d'ensembles dénombrables est dénombrable.

*Démonstration.* On considère  $N$  ensembles dénombrables  $X_1, \dots, X_N$ , pour lesquels on se donne une énumération, et l'on note  $P_k \subset X_1 \times \dots \times X_N$  les éléments du produit qui ne font intervenir que les  $k$  premiers termes de chacun des  $X_i$  dans l'énumération choisie. Son cardinal est le nombre de mots de  $N$  lettres que l'on peut constituer à partir d'un alphabet de cardinal  $k$ , qui est  $k^N$ , il est donc fini. Le produit des  $X_i$  est inclus dans la réunion des  $P_k$ , il est donc dénombrable comme union dénombrable d'ensembles finis (proposition A.1.13).  $\square$

**Exercice A.1.2. (••)** On considère l'ensemble  $X = \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$  des suites infinies de 0 ou 1.

- 1) Montrer que  $X$  n'est pas dénombrable.
- 2) Montrer que le sous-ensemble  $X_0$  des suites constantes au delà d'un certain rang est dénombrable.
- 3) Montrer que l'ensemble  $X_{per}$  des suites périodiques au delà d'un certain rang est dénombrable.
- 4) On définit l'application  $\varphi_N$  qui à tout  $x \in X$  associe la valeur moyenne des  $N$  premiers termes. Montrer que, pour tout  $x \in X_{per}$  (et donc a fortiori tout  $x \in X_0$ ), la quantité  $\varphi_N(x)$  admet une limite quand  $N$  tend vers  $+\infty$ . Montrer que cette propriété n'est pas vraie pour tous les éléments de  $X$ .
- 5) L'ensemble des éléments de  $X$  pour lesquels  $\varphi_N(x)$  converge lorsque  $N$  tend vers  $+\infty$  est-il dénombrable ?

### Structures algébriques élémentaires

**Définition A.1.15.** (Loi de composition interne)

Soit  $X$  un ensemble, une *loi de composition interne* est une application de  $X \times X$  dans  $X$ . On note en général  $x \star y$  (ou  $x + y$ , ou  $x \bullet y$ , ou simplement  $xy$ , selon le contexte) l'image de  $(x, y)$  par cette application. La loi est dite *commutative* si  $x \star y = y \star x$  pour tout couple  $(x, y) \in X \times X$ . La loi est dite *associative* si  $(x \star y) \star z = x \star (y \star z)$  pour tous  $x, y, z \in X$ .

**Définition A.1.16.** (Loi de composition externe)

Soient  $X$  et  $Y$  deux ensemble, une *loi de composition externe* est une application de  $X \times Y$  (ou  $Y \times X$ ) dans  $X$

L'archétype de la loi de composition externe est la multiplication d'un vecteur par un réel (ou un élément d'un corps), qui est, avec l'addition entre deux vecteurs (loi de composition interne), à la base de la notion d'*espace vectoriel*.

**Définition A.1.17.** (Magma)

Un magma est un ensemble muni d'une loi de composition interne (sans aucune condition sur cette loi). Ce magma est dit *unifère* s'il possède un élément neutre, i.e. un élément  $e \in X$  tel que  $e \star x = x \star e = x$  pour tout  $x \in X$ .

**Exercice A.1.3.** Soit  $X$  un ensemble de cardinal  $N$  fini. Quel est le nombre de magmas sur  $X$ ? De magmas commutatifs sur  $X$ ?

**Définition A.1.18.** (Monoïde)

Un monoïde est un ensemble muni d'une loi de composition interne associative, qui admet un élément neutre.

**Exercice A.1.4.** On se place sur  $X = [0, 1]$ . Pour toute paire de lois de Bernoulli de paramètres  $p$  et  $q$ , on considère l'expression de la probabilité que parmi deux tirages de v.a. suivant ces lois, l'une au moins des valeurs soient 1, qui s'exprime

$$p \oplus q = 1 - (1 - p)(1 - q) = p + q - pq.$$

Montrer que  $X$  muni de  $\oplus$  est un monoïde abélien. Quel est le lien entre  $\oplus$  et l'addition de deux réels?

**Définition A.1.19.** (Groupe)

Un *groupe* est un ensemble  $G$  muni d'une loi de composition interne, qui vérifie les propriétés suivantes

- (i) La loi est *associative*, i.e.  $(x \star y) \star z = x \star (y \star z)$  pour tous  $x, y, z \in G$
- (ii) Il existe un élément neutre :

$$\exists e \in G, \quad x \star e = e \star x = x \quad \forall x \in G.$$

- (iii) Tout élément admet un inverse :

$$\forall x \in G, \quad \exists y \in G, \quad x \star y = y \star x = e.$$

On notera  $x^{-1}$  l'inverse de  $x$ .

Le groupe est dit commutatif (ou *abélien*) si  $x \star y = y \star x$  pour tous  $x, y \in G$ .

**Exercice A.1.5.** Montrer que, dans la définition ci-dessus, il suffit de demander que la loi soit associative, qu'il existe un élément neutre à gauche ( $e \star x = x$ ) pour tout  $x$ , et que tout élément admette un inverse à gauche (pour tout  $x$ , il existe  $y$  tel que  $y \star x = e$ ).  
Montrer que l'inverse d'un élément est unique

**Définition A.1.20.** (Morphisme / isomorphisme de groupe)

Soient  $(G, \star)$  et  $(G', *)$  deux groupes. On dit que l'application  $f$  de  $G$  dans  $G'$  est un morphisme (ou homomorphisme) si elle respecte la structure de groupe, i.e.

$$f(x \star y) = f(x) * f(y)$$

On parle d'*isomorphisme* s'il s'agit d'une bijection.

**Définition A.1.21.** (Sous-groupe)

Soit  $(G, \star)$  un groupe. et  $H \subset G$  une partie qui contient  $e$ , et telle que

$$x \star y \in H \quad \forall x, y \in H \text{ et } x^{-1} \in H \quad \forall x \in H.$$

On appelle  $H$  un sous-groupe de  $G$ , c'est un groupe pour la même loi  $\star$ .

**Proposition A.1.22.** (Sous-groupe engendré)

Soit  $(G, \star)$  un groupe et  $S$  une partie de  $G$ . On appelle sous-groupe engendré par  $S$ , et l'on note  $\langle S \rangle$ , le plus petit sous-groupe contenant  $S$ , i.e. l'intersection de tous les sous-groupe contenant  $S$ . Ce groupe  $\langle S \rangle$  est constitué des produits d'éléments ou d'inverses d'éléments de  $S$ .

**Définition A.1.23.** (Partie génératrice)

Soit  $(G, \star)$  un groupe. On a qu'une partie  $S$  de  $G$  est *génératrice* si  $G = \langle S \rangle$ . On dit que  $G$  est de type fini s'il admet une partie génératrice finie.

La richesse de la structure de groupe repose sur les relations entre éléments, du type  $x \star y = z$ . De ce point de vue, le *groupe libre* engendré par un ensemble, tel que décrit ci-après joue un rôle singulier, un cas extrême dans cette grande famille, comme un groupe qui ne repose sur aucunes relations autres que celles imposées par la structure de groupe.

**Exemple A.1.1.** (Groupe libre)

Soit  $S$  un ensemble, et  $S'$  un ensemble disjoint de  $S$  en bijection avec  $S$ . On va considérer  $S \cup S'$  comme un *alphabet* permettant d'écrire des mots de longueur finie arbitraire, avec une loi de composition qui est la concaténation, en considérant que chaque lettre  $s$  de  $S$  a un unique  $s'$  dans  $S'$ , sorte d'inverse, de telle sorte que l'on peut faire disparaître les chaînes  $ss'$  ou  $s's$  qui apparaissent au sein d'un mot. Plus précisément, on considère l'ensemble  $X$  des mots finis constitué de lettres de  $S$  et  $S'$ , auquel on adjoint le mot vide, et l'on considère la relation d'équivalence suivante : deux mots  $x$  et  $y$  sont équivalents si l'on peut passer de l'un à l'autre en ajoutant ou enlevant des chaînes de type  $ss'$  ou  $s's$ . L'ensemble quotient, noté  $F_S$ , est un groupe (non commutatif) pour la loi de concaténation, d'élément neutre le mot vide.

**Exercice A.1.6.** Décrire le groupe libre engendré par un singleton.

**Exemple A.1.2.** (Groupe libre engendré par une paire)

Si  $S$  est fini, on peut représenter le groupe libre associé par un arbre. La figure A.1.2 propose une telle représentation dans le cas d'un cardinal 2. On introduit l'alphabet "cardinal"  $S = \{e, n\}$  (est - nord),  $S' = \{e', n'\} = \{w, s\}$  (ouest - sud). Le mot  $nne'$  est une feuille de l'arbre représenté par un point, ainsi que son inverse  $x^{-1} = ne'n'n' = nwss$ . Noter que si l'on représente l'inverse en retournant l'ordre de ses lettres, on trouve le symétrique de  $x$  par rapport au point central, qui correspond au mot vide. On distinguera bien  $F_S$  du groupe additif  $\mathbb{Z}^2$ . Chaque élément de ce dernier peut être représenté par une suite finie de directions (en partant de l'origine), mais il existe plusieurs (une infinité) chemins conduisant à une même destination. Ainsi  $ne$  est différent de  $en$  dans le groupe libre, alors que ces chemins correspondent au même élément  $(1, 1)$  de  $\mathbb{Z}^2$ . De ce point de vue, on peut identifier  $F_S$  à l'ensemble des chemins finis issus de 0. On notera d'ailleurs que  $\mathbb{Z}^2$  est dénombrable, alors que  $F_S$  ne l'est pas (voir exercice A.1.2).

**Définition A.1.24.** (Anneau / corps)

Un *anneau* est un ensemble  $A$  muni de deux lois de composition internes, notées  $+$  et  $\star$ , avec :

- (i)  $(A, +)$  est un groupe abélien,
- (ii) La loi  $\star$  est associative et distributive vis à vis de la loi  $+$ , i.e.

$$x \star (y + z) = x \star y + x \star z, \quad (y + z) \star x = y \star x + z \star x \quad \forall x, y, z \in G$$

- (iii) La loi  $\star$  admet un élément neutre<sup>6</sup>




FIGURE A.1.2 – Groupe libre engendré par 2 éléments

On parle de *corps* si tout élément admet un inverse pour la loi  $\star$ , c'est à dire que  $(A, \star)$  est un groupe.

**Définition A.1.25.** (Espace vectoriel)

Soit  $(K, +, \star)$  un corps. Un  $K$ -*espace vectoriel*  $E$  est un groupe abélien (loi  $+$ ) munie d'une loi de composition externe à gauche, notée ici par simple juxtaposition :

$$(\lambda, x) \in K \times E \mapsto \lambda x,$$

telle que l'on ait, pour tous  $x, y$  dans  $E$ ,  $\lambda, \mu$  dans  $K$ ,

$$\lambda(x + y) = \lambda x + \lambda y, (\lambda + \mu)x = \lambda x + \mu x, \lambda(\mu x) = (\lambda \star \mu)x, 1_K x = x,$$

où  $1_K \in K$  est l'élément neutre de la loi  $\star$ .

Étant donnés un corps  $K$  et un ensemble  $S$ , on peut construire un espace vectoriel, en quelque sorte minimisaliste<sup>7</sup>, constitué des *combinaisons linéaires formelles* d'éléments  $e \in S$ , comme décrit ci-après.

**Définition A.1.26.** (Combinaisons linéaires formelles, espace vectoriel libre.)

Soit  $K$  un corps et  $S$  un ensemble. On appelle combinaison linéaire formelle une expression du type

$$\sum_{x \in S} \lambda_x x, \quad \lambda_x \in K \quad \forall x \in S,$$

où les  $\lambda_x$  sont tous nuls sauf un nombre fini (ce qui, signifie que les termes correspondants n'apparaissent pas dans la somme). La multiplication d'une telle expression par  $\mu \in K$  est obtenue en multipliant tous les

6. Cette condition n'est pas demandée par certains auteurs. Pour éviter toute ambiguïté, on pourra appeler anneau *unifère* un anneau pour lequel on a bien un élément neutre pour la première loi. On pourra parler de pseudo-anneau quand cette propriété quand il n'y a pas d'élément neutre.

7. On pourra se convaincre que cette démarche donne un sens à ce que le bon sens rechigne à envisager : *l'addition de choux et de carottes*, selon le principe imparable '1 chou + 1 carotte = 1 chou + 1 carotte', en préservant la correspondance rassurante '1 chou + 1 chou = 2 choux'. Nous laissons en exercice l'addition de 2 carottes, et en question subsidiaire l'addition d'une moissonneuse-batteuse et de  $\pi$  flans aux pruneaux.



coefficients par  $\mu$ . Pour sommer deux expressions, on garde les termes qui n'apparaissent que dans l'une ou l'autre, et si les deux partagent un élément de  $S$ , on somme simplement les coefficients.

On obtient de cette façon un espace vectoriel appelé *espace vectoriel libre sur  $K$  engendré par  $S$* . Chaque élément de  $K$  peut être identifié à une application de  $S$  dans  $K$  qui affecte une valeur non nulle à un nombre fini d'éléments de  $K$ .

La somme ci-dessus doit être vue comme une expression globale, il ne s'agit pas à proprement parler d'une loi de composition interne.

**Exemple A.1.3.** L'espace vectoriel des polynômes réels en  $X$  peut être vu comme le  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel libre engendré par les  $(X^n)_{n \in \mathbb{N}}$ .

### Lois de composition internes et modélisation

Les lois de compositions internes et les structures qu'elle induisent (groupes, anneaux, corps, ...) constituent le socle de l'algèbre, dont une bonne part des développements n'est pas directement reliée la représentation du monde réel (en dehors de la notion d'espace vectoriel, à la base de l'analyse fonctionnelle). Il peut néanmoins être fécond d'avoir une idée claire de ces notions, qui "résonnent" parfois avec le monde réel, même si le cœur de l'algèbre en est assez éloigné. Il est par ailleurs sain, dans l'approche de modélisation, d'avoir conscience des structures que l'on utilise, qui représentent en quelque sorte l'essence des objets que l'on manipule. Il nous paraît en particulier fécond, lorsque l'on manipule un ensemble multiplement structuré<sup>8</sup> comme l'ensemble des nombres réels (construit dans la section A.1.4 ci-après), de garder à l'esprit que l'on n'utilise qu'une partie des structures associées à cet ensemble. À titre d'illustration, lorsque l'on définit une mesure comme une application qui à une partie associe un nombre réel, l'espace d'arrivée de cette application est  $\mathbb{R}_+$ , qu'il est pertinent de considérer comme un *monoïde* muni de l'addition. À aucun moment (tout du moins tant qu'on ne s'intéresse pas aux mesures sur les espaces produits) on n'est amené à multiplier deux mesures, on ne fait que les sommer. On peut définir sur ce monoïde une soustraction (on retire d'une certaine quantité une quantité inférieure), mais il n'est ni nécessaire ni pertinent dans ce contexte de considérer que  $m_1 - m_0$ , avec  $m_0 \leq m_1$  correspond à la somme de  $m_1$  avec  $-m_0$ , "inverse" de  $m_0$  pour la loi '+'. Concernant la structure de groupe, qui n'intervient a priori que de façon très élémentaire en analyse ( $\mathbb{R}$  vu comme groupe additif abélien), précisons qu'elle peut néanmoins intervenir de façon non triviale dans des situations concrètes, lorsque l'on considère un ensemble de transformations qui laissent un ensemble invariant. L'exemple le plus élémentaire est le *groupe symétrique*  $\mathcal{S}_N$ , ensemble des bijections d'un ensemble à  $N$  éléments muni de la loi de composition. Un autre exemple fécond correspond au groupe des transformations du plan qui laissent invariant une figure géométrique, ou plus généralement un ensemble de points du plan.

#### A.1.4 L'ensemble des réels : construction et structures afférentes

Il existe de multiples manières de construire l'ensemble  $\mathbb{R}$  des réels munis de ses structures principales. La plupart des ouvrages privilégient une approche axiomatique et abstraite, nous décrivons ici une démarche plus ancrée sur la pratique quotidienne des nombres réels et leur utilisation effective, en nous en tenant ici à ce qui est strictement utile pour ce cours.

La construction proposée peut sembler périlleuse : on utilisera ci-dessous des propriétés métriques de cet ensemble, en particulier la complétude, pour définir certaines opérations comme la multiplication. Or la notion même de distance, qui est une application à image dans  $\mathbb{R}$ , nécessite que la droite des réels soit bien définie. On pourra cependant vérifier que la notion de métrique et de convergence d'une suite ne nécessite qu'une structure d'ordre sur  $\mathbb{R}$  (qui est définie dès la proposition A.1.31), la notion de valeur absolue (définie d'emblée), et l'addition entre deux réels (définition A.1.34), qui ne nécessite pas de structure métrique sur  $\mathbb{R}$  lui-même.

Au-delà de ces questions de cohérence de la construction, les paragraphes qui suivent contiennent des

8. L'ensemble  $\mathbb{R}$  peut être muni de la totalité des structures présentées précédemment, ainsi que d'autres qui sont présentées dans ce document (ordre total, groupe, anneau, corps, espace vectoriel, structure d'espace métrique complet, espace mesurable, espace mesuré, ...).

développement assez fastidieux visant à définir des opérations du type de celles pratiquées par les écoliers dès leur plus jeune âge, en particulier l'addition (ou la soustraction) entre nombres décimaux. Nous avons ici une petite difficulté supplémentaire liée au fait que ces opérations posées commencent *par la droite*, c'est à dire du côté où un nombre réel non décimal est infini, ce qui nécessite une adaptation de la procédure.

Nous supposons construit l'ensemble  $\mathbb{Z}$  muni des deux lois '+' et '×' qui en font un anneau (voir définition A.1.24), muni de la relation d'ordre total usuel. Et nous définissons l'ensemble  $\mathbb{R}$  à l'aide de la représentation décimale décrite ci-dessous.

**Définition A.1.27.** (Ensemble des réels)

On définit l'ensemble  $\mathbb{R}$  comme  $\{+, -\} \times \mathbb{N} \times \llbracket 0, 9 \rrbracket^{\mathbb{N}^*}$ , c'est-à-dire de l'ensemble des

$$\pm a_0, a_1 a_2 \dots a_k \dots$$

avec  $a_0 \in \mathbb{N}$ , et les  $a_k$  (appelées *décimales*) sont des entiers entre 0 et 9. On appelle *nombre réel* l'un de ces objets. On appelle nombre *décimal* un nombre dont l'écriture décimale est finie, c'est à dire que  $a_n$  est identiquement nul au-delà d'un certain rang, et l'on note  $\mathbb{D}$  l'ensemble de ces nombres. On exclut *a priori* les nombres dont l'écriture finit par une infinité de 9 consécutifs, mais on prendra la liberté d'autoriser ponctuellement cette pathologie d'écriture<sup>9</sup>, qui concerne les nombres décimaux. Tout nombre décimal peut en effet s'écrire

$$\pm a_0, a_1 \dots a_r 000 \dots \text{ avec } a_r \geq 1, \text{ ou } \pm a_0, a_1 \dots (a_r - 1) 999 \dots,$$

On appellera *propre* l'écriture d'un décimal sans l'infinité de 9.

Pour tout  $a \in \mathbb{R}$ , on note  $-a$  le nombre obtenu en changeant le signe de  $a$ , qu'on appelle l'*opposé* de  $a$ , et  $|a|$  (valeur absolue de  $a$ ) le nombre obtenu en remplaçant le signe par '+'. On dira qu'un réel est strictement positif si son signe est '+' et que ses décimales ne sont pas toutes nulles, et strictement négatif si son opposé est strictement positif. 'Positif' signifie strictement positif ou nul, de même pour 'négatif'. Le nombre  $0 = +0.0000 \dots$  peut s'écrire aussi  $0 = -0.0000 \dots$ , c'est le seul nombre à la fois positif et négatif.

**Définition A.1.28.** (Troncature entière, partie entière)

On appelle *troncature entière* de  $a = \pm a_0, a_1 \dots$  l'entier relatif  $\pm a_0 \in \mathbb{Z}$ , et *partie entière* de  $a$  l'entier  $+a_0$  si  $a$  est positif, et  $-a_0 - 1$  si  $a$  est strictement négatif. La partie entière de  $-1.3$  est ainsi  $-2$ , et sa troncature entière est  $-1$ .

**Remarque A.1.29.** La représentation décimale traditionnelle des réels décrite ci-dessus privilégie la notion de troncature,  $\mathbb{R}$  est ainsi représenté en miroir, symétriquement par rapport à l'origine 0, qui se voit jouer de fait un rôle singulier. Nous verrons que ce choix est très adapté à la multiplication, mais moins à l'addition (définir l'addition entre nombres de signes différents demande un peu de soin). Signalons que l'on pourrait imaginer une autre convention, plus respectueuse de l'addition, invariante par translation, en représentant un nombre par un entier relatif (la partie entière), plus un nombre du type  $0, a_0 a_1 \dots$ , de telle sorte que par exemple  $-1,23$  s'écrirait  $(-2) + 0.77$ . Selon cette écriture, il serait non trivial de construire l'opposé d'un nombre (alors que c'est immédiat avec la représentation-miroir que nous privilégions), ainsi que le produit entre deux nombres de signes différents. Nous utiliserons ponctuellement cette vision des choses lors de la construction de l'addition entre deux nombres de signes distincts.

**Théorème A.1.30.** L'ensemble  $\mathbb{D}$  des nombres décimaux est infini dénombrable, l'ensemble  $\mathbb{R}$  des nombres réels est infini non dénombrable.

*Démonstration.* L'ensemble  $\mathbb{D}$  contenant  $\mathbb{N}$ , il est au moins infini dénombrable. Il s'écrit par ailleurs comme union des  $\mathbb{D}_n$ , qui sont les nombres décimaux dont les décimales sont nulles au-delà du rang  $n$ . Chacun de ces ensembles étant dénombrable (en multipliant par  $10^n$  on retrouve les entiers),  $\mathbb{D}$  est dénombrable comme réunion d'ensembles dénombrables (proposition A.1.13).

<sup>9</sup>. Il est prudent de garder cette possibilité, du fait que ces objets sont susceptibles d'apparaître spontanément, comme lorsque l'on définira des sommes du type  $0.111 \dots + 0.888 \dots$ .

Montrons maintenant, en suivant une démarche proche de la démonstration du théorème A.1.10, que l'intervalle  $[0, 1[$  n'est pas dénombrable. Supposons qu'il le soit, on peut alors énumérer ses éléments

$$\begin{aligned} r_1 &= 0, \mathbf{a}_1^1 a_1^2 a_1^3 \dots \\ r_2 &= 0, a_2^1 \mathbf{a}_2^2 a_2^3 \dots \\ r_3 &= 0, a_3^1 a_3^2 \mathbf{a}_3^3 \dots \\ &\vdots = 0, \vdots \end{aligned}$$

On construit alors un nombre par le procédé d'*extraction diagonale de Cantor* (décimales indiquées en gras ci-dessus), chaque décimale de ce nombre étant définie selon le principe suivant : si la  $n$ -ième décimale de  $r_n$  est différente de 1, on la fixe à 1, si elle est égale à 1, on la fixe à 2 (par exemple). On construit ainsi un nombre réel en écriture propre qui par construction ne peut pas figurer dans la liste ci-dessus, qui est pourtant une énumération exhaustive de  $[0, 1[$ . On en déduit par contradiction que  $[0, 1[$  n'est pas dénombrable.  $\square$

**Proposition A.1.31.** (Relation d'ordre total)

L'ensemble  $\mathbb{R}$  admet une relation d'ordre total  $\leq$ .

*Démonstration.* Soient  $a = a_0, a_1 \dots$  et  $b = b_0, b_1 \dots$  deux éléments de  $\mathbb{R}$  positifs et proprement écrits. S'ils sont différents, il existe un plus petit  $k \in \mathbb{N}$  tel que  $a_k \neq b_k$ . Si  $a_k < b_k$ , on dit que  $a < b$ , et  $b < a$  dans le cas contraire. On dit que tout négatif est inférieur à tout positif, et que, pour deux nombres  $a$  et  $b$  négatifs, on a  $a < b$  si et seulement si  $-b < -a$ . Cette relation d'ordre permet de définir la notion d'intervalles de type  $[a, b]$ ,  $]a, b[$ ,  $[a, b[$ ,  $]a, b]$ .  $\square$

**Proposition A.1.32.** Toute partie non vide majorée de  $\mathbb{R}$  admet une borne supérieure (voir définition A.1.6).

*Démonstration.* Soit  $A$  une partie de  $\mathbb{R}$  majorée. On suppose dans un premier temps que  $A$  contient au moins un nombre strictement positif. Il existe

$$m_0 = \max_{a \in A} \{P_0(a)\} \geq 0,$$

où  $P_k$  associe à un réel sa  $k$ -ième décimale (ou sa troncature entière pour  $k = 0$ ). On introduit  $A_0 = \{a \in A, P_0(a) = m_0\}$ , et l'on pose

$$m_1 = \max_{a \in A_0} \{P_1(a)\} \in \llbracket 0, 9 \rrbracket.$$

On construit ainsi par récurrence le nombre  $M = m_0, m_1 m_2 \dots$  qui est une borne supérieure de  $A$  par construction. Si  $A$  ne contient que des nombres négatifs, on procède de façon analogue en considérant l'ensemble  $-A$  et en remplaçant le max par un min.  $\square$

**Définition A.1.33.** (Supremum - infimum - maximum - minimum)

Soit  $A$  une partie de  $\mathbb{R}$ . On note  $\sup(A)$  sa borne supérieure (on dit qu'elle vaut  $+\infty$  si  $A$  n'est pas majoré). Si elle appartient à  $A$ , on l'appelle le plus grand élément de  $A$ , ou maximum de  $A$ , qu'on écrit  $\max(A)$ .

Si  $A$  est majoré,  $M = \sup A$  si et seulement si  $M$  majore  $A$  et s'il existe une suite  $x_n$  d'éléments de  $A$  qui tend vers  $M$ . On appellera  $x_n$  une suite maximisante.

On définit symétriquement les notions d'infimum, de plus petit élément, et de suite minimisante.

**Définition A.1.34.** (Addition sur les réels en écriture décimale)

On définit l'addition sur  $\mathbb{R}$  de la façon suivante : soient  $a = a_0, a_1 \dots$  et  $b = b_0, b_1 \dots$  deux éléments de  $\mathbb{R}$  positifs et proprement écrits. Pour alléger les notations, nous proposons de présenter la construction de la somme  $c = c_0, c_1 \dots$  comme un algorithme informatique, c'est à dire en gardant la notation  $c_k$  pour désigner une quantité dont la valeur est susceptible de changer au fil de la construction. On pose dans un premier temps  $c_k = a_k + b_k$ , et l'on définit  $\alpha = (\alpha_k)$  comme une suite identiquement nulle au départ. Si  $c_k \geq 10$ , on remplace sa valeur par  $c_k - 10$  et l'on pose  $\alpha_{k-1} = 1$ . Noter que dans ce cas la nouvelle valeur de  $c_k$  est inférieure ou égale à 8 (car  $a_k + b_k$  est inférieur ou égal à 18). Si  $c$  se termine par une infinité de 9 consécutifs (à partir d'un rang  $k$ ), alors d'après la remarque précédente la zone en question est vierge de toute

retenue, on nettoie l'écriture en mettant à 0 tous les 9, et l'on rajoute 1 à  $c_{k-1}$ , qui est donc au maximal égal à 9, et sans menace de retenue puisque  $\alpha_{k-1}$  est nécessairement égal à 0 d'après ce qui précède. On obtient donc un  $c = (c_k)$  qui est soit décimal, soit non décimal et non stationnaire à 9. L'étape finale consiste à prendre en compte les retenues dans la somme finale. On considère pour cela les suites (nécessairement finies) de 9 consécutifs. Considérons une de ces suites de longueur maximale<sup>10</sup>  $c_k c_{k+1} \dots c_\ell = 99 \dots 9$ , encadrée donc par des décimales non égales à neuf. Toujours selon le même argument que la somme de deux naturels  $\leq 9$  est  $\leq 18$ , on a nécessairement

$$\alpha_{k-1} = \alpha_k = \dots = \alpha_{\ell-1} = 0.$$

Si  $\alpha_\ell = 0$ , on laisse la suite de 9 inchangée, et si  $\alpha_\ell = 1$ , on remplace tous les 9 par des 0, et l'on rajoute 1 à  $c_{k-1}$  (qui est  $\leq 8$  par hypothèse). En dehors de ces paquets de 0 l'ajout de  $\alpha_k$  à  $c_k$  peut se faire directement. On obtient ainsi un nombre réel en écriture décimale, que l'on définit comme la somme de  $a$  et  $b$ .

Il s'agit maintenant de définir la somme entre un nombre positif et un nombre négatif. On commence par considérer un nombre de l'intervalle  $] -1, 0[$ ,  $a = -0, a_1 a_2 \dots$  (écriture propre), auquel on ajoute  $+1$ . Si  $a$  est décimal,  $a = -0, a_1 a_2 \dots a_p$ , la somme est définie comme

$$1 + a = 0, c_1 c_2 \dots c_p, \quad c_i = 9 - a_i \text{ pour } i = 1, \dots, p-1, \quad c_p = 10 - a_p.$$

Si le nombre est non décimal, on définit simplement la différence par  $b_i = 9 - a_i$  pour tout  $i$ . On considère maintenant un réel  $a > 0$  et un entier  $b < 0$ . On utilise la décomposition formelle (formelle car on n'a pas encore défini l'addition entre  $a$  et  $b$ )

$$a + b = a_0 + 0, a_1 a_2 \dots - b_0 = a_0 - b_0 + 0, a_1 a_2 \dots$$

Si l'entier  $a_0 - b_0$  est positif ou nul, on se ramène à la somme de deux réels positifs déjà définie. Si cet entier est strictement négatif, on définit la somme comme

$$a + b = -c_0, c_1 \dots \text{ avec } c_0 = |a_0 - b_0| - 1 \text{ et } 0, c_1 c_2 \dots = 1 - 0, a_1 a_2 \dots$$

(cette dernière somme a déjà été définie précédemment). Pour finir, on considère maintenant  $a > 0$  et  $b < 0$  non entier. On écrit

$$a + b = a_0 + 0, a_1 a_2 \dots - b_0 - 1 + (1 - 0, b_1 \dots) = a_0 - b_0 - 1 + 0, a_1 a_2 \dots + (1 - 0, b_1 b_2 \dots).$$

Le terme entre parenthèses a été défini précédemment comme un réel de l'intervalle  $]0, 1[$ . On sait effectuer sa somme avec  $0, a_1 a_2 \dots$  (tous deux positifs). Si cette somme est dans l'intervalle  $]0, 1[$ , on se retrouve dans la situation précédente. Sinon, on l'écrit  $1 + 0, d_1 d_2 \dots$ , et l'on est une nouvelle fois ramené à donner un sens à la somme d'un entier  $a_0 - b_0 - 1 + 1 = a_0 - b_0$  avec un nombre du type  $0, d_1 d_2 \dots$ , cas qui a déjà été traité.

**Proposition A.1.35.** Soit  $(x_n)$  une suite de réels majorée et croissante. Alors  $(x_n)$  converge vers une limite  $\ell \in \mathbb{R}$ , qui est la borne supérieure de l'ensemble des termes de la suite.

*Démonstration.* L'ensemble  $X$  des termes de la suite est majoré, il admet donc une borne supérieure  $\ell \in \mathbb{R}$ , telle que  $x_n \leq \ell$  pour tout  $n$ . Pour tout  $\varepsilon > 0$ , il existe un terme de la suite supérieur à  $\ell - \varepsilon$ . la suite étant croissante, tous les termes de la suite sont dans l'intervalle  $[\ell - \varepsilon, \ell]$ , d'où la convergence de  $x_n$  vers  $\ell$ .  $\square$

Pour toute suite  $(x_n)$  de réels, le supremum des  $x_k$  pour  $k$  plus grand que  $n$  est soit identiquement égal à  $+\infty$  (si la suite n'est pas majorée), soit décroissant en  $n$ . Dans le second cas cette quantité converge donc vers  $-\infty$  ou une limite réelle. De même l'infimum des  $x_k$  pour  $k$  plus grand que  $n$  est identiquement  $-\infty$ , ou réel croissant, et converge dans ce cas vers  $+\infty$  ou une limite réelle. Ces conséquences directes de la proposition précédente permettent de définir les notions de  $\limsup$  et  $\liminf$ .

**Définition A.1.36.** (Limite inférieure, limite supérieure ( $\bullet\bullet$ ))

Soit  $x_n$  une suite réelle, on définit

$$\limsup_{n \rightarrow +\infty} x_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left( \sup_{k \geq n} x_k \right) \in [-\infty, +\infty], \quad \liminf_{n \rightarrow +\infty} x_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left( \inf_{k \geq n} x_k \right) \in [-\infty, +\infty],$$

10. C'est-à-dire qu'elle n'est pas contenue dans une suite de 9 strictement plus longue.

**Exercice A.1.7.** (Limites supérieure et inférieure (●))

a) Donner les  $\limsup$  et  $\liminf$  de la suite  $(x_n)$  dans les cas suivants

$$x_n = \frac{1}{n}, \quad x_n = n, \quad x_n = (-1)^n, \quad x_n = \sin(n).$$

b) Que peut-on dire d'une suite dont la  $\liminf$  et la  $\limsup$  ont la même valeur finie ?

**Exercice A.1.8.** (●) Soient  $(x_n)$  et  $(y_n)$  deux suites réelles. Montrer que

$$\sup_n (x_n + y_n) \leq \sup(x_n) + \sup(y_n).$$

Donner un exemple pour lequel il y a en fait égalité, et un exemple pour lequel l'inégalité est stricte.

**Définition A.1.37.** (Convergence d'une suite de réels (●))

On dit qu'une suite  $(a_n)$  de réels tend vers 0 si sa valeur absolue peut être rendue arbitrairement petite au-delà d'un certain rang, c'est à dire :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, |a_n| < \varepsilon \quad \forall n \geq N.$$

On dit qu'une suite  $(a_n)$  de réels tend vers une limite  $a$  si  $|a_n - a|$  tend vers 0.

Le fait d'avoir défini une relation d'ordre total et une addition sur  $\mathbb{R}$  permet de donner un sens à la définition générale d'une métrique, selon la définition I.2.1, page 11. Cette définition peut être appliquée à  $\mathbb{R}$  lui-même, pour définir la distance canonique basée sur la valeur absolue de la différence entre deux nombres.

**Proposition A.1.38.** (Métrique sur  $\mathbb{R}$ )

L'application  $(x, y) \in \mathbb{R} \mapsto d(x, y) = |x - y|$  définit une distance sur  $\mathbb{R}$ .

*Démonstration.* La séparation est immédiate, ainsi que la symétrie. Soient maintenant 3 réels  $x, y$ , et  $z$ . Si  $x - y$  et  $y - z$  sont de même signe, on a

$$|x - y| + |y - z| = |x - z|,$$

et s'il sont de signes opposés, on a

$$|x - z| = |x - y + (y - z)| \leq \max(|x - y|, |y - z|) \leq |x - y| + |y - z|.$$

dans les deux cas, l'inégalité triangulaire est vérifiée. □

**Proposition A.1.39.** L'espace métrique  $(\mathbb{R}, d)$  est complet (voir définition I.5.3, page 21).

*Démonstration.* On considère une suite de Cauchy dans  $\mathbb{R}$  (défini par A.1.27), notée<sup>11</sup>  $(a^n)$ . La petite difficulté pour montrer que la suite converge est que, pour  $n \in \mathbb{N}$ , il est possible que  $a_k^n$  oscille entre deux valeurs successives, puisque deux nombres qui ne s'identifient que sur les  $k - 1$  premières décimales peuvent être arbitrairement proches. Plus précisément, si l'on fixe  $r \in \mathbb{N}$ , alors  $|a - b| < 10^{-r}$  impose l'alternative suivante :

1. les décimales de  $a$  et  $b$  s'identifient jusqu'au rang  $r - 1$ , et diffèrent d'une unité au  $r$ -ème rang ;
2. ces décimales diffèrent d'une unité dès un certain rang  $\ell < r$ , par exemple  $b_\ell = a_\ell + 1$ , et dans ce cas  $a_i = 9$  et  $b_i = 0$  pour  $\ell + 1 \leq i \leq r$ .

---

11. On prendra garde à la notation  $a^n$ , où  $n$  ne représente pas une puissance mais un indice :  $a^n \in \mathbb{R}$  désigne simplement le  $n$ -ième terme de la suite. Chaque terme  $a^n$  est lui-même défini par une infinité de chiffres, les  $a_k^n$  pour  $k = 0, 1, \dots$

Considérons maintenant une suite de Cauchy dans  $\mathbb{R}$  en écriture décimale,  $(a^n) = (a_k^n)$  (l'indice  $k$  représente comme précédemment les décimales, et  $n$  l'indice du terme de la suite). Si toutes les décimales se stabilisent au delà d'un certain rang, c'est qu'il existe  $\ell = (\ell_k)$  tel que

$$\forall k \in \mathbb{N}, \exists N_k, \forall n \geq N_k, a_k^n = \ell_k,$$

on a alors convergence de  $a^n$  vers  $\ell$ . Si ce n'est pas le cas, notons  $k_0$  le plus petit des indices  $k$  tels que  $a_k^n$  ne se stabilise jamais. Comme  $a^p$  et  $a^q$  deviennent arbitrairement proches, d'après l'alternative énoncée ci-dessus, la décimale  $a_{k_0}^n$  oscille nécessairement entre deux valeurs distantes de 1, disons  $\ell_{k_0}$  et  $\ell_{k_0} + 1$ , les indices précédents se stabilisant. D'après la remarque faite en préambule de cette démonstration, pour tout  $r \in \mathbb{N}$  grand, tous les termes de la suite pour  $n \geq r$  prennent nécessairement l'une ou l'autre des formes

$$\ell_0, \ell_1 \dots \ell_{k_0-1} \ell_{k_0} 999999 \dots 99 \underbrace{9}_r \dots \quad \text{ou} \quad \ell_0, \ell_1 \dots \ell_{k_0-1} (\ell_{k_0} + 1) 000000 \dots 00 \underbrace{0}_r \dots,$$

qui implique la convergence vers le décimal  $\ell_0, \ell_1 \dots \ell_{k_0-1} (\ell_{k_0} + 1) 000 \dots$  (la première forme correspond à l'écriture impropre de ce même décimal).  $\square$

**Définition A.1.40.** (Produit de deux réels)

On définit le produit de deux réels par passage à la limite à partir du produit entre deux décimaux, qui lui-même découle du produit entre deux entiers. La démarche repose sur les trois étapes décrites suivantes :

1. (Produit par une puissance de 10)

En premier lieu, nous définissons le produit entre un réel et une puissance de 10. Pour tout réel  $a = a_0, a_1 a_2 \dots$ , tout entier naturel  $n$ , on définit  $10^n \times a$  comme le réel obtenu en décalant vers la droite la virgule de  $n$  pas. On définit  $10^{-n} \times a$  comme le nombre obtenu en décalant la virgule de  $n$  pas vers la gauche.

2. (Produit entre deux décimaux)

Soient  $a = a_0, a_1 \dots a_n$  et  $b = b_0, b_1 \dots b_m$  deux nombres décimaux. On définit le produit  $a \times b$  comme

$$a \times b = \underbrace{(10^n \times a)}_{\in \mathbb{N}} \times \underbrace{(10^m \times b)}_{\in \mathbb{N}} \times 10^{-m-n}.$$

3. (Produit entre deux réels)

Soient  $a = +a_0, a_1 a_2 \dots$  et  $b = +b_0, b_1 b_2 \dots$  deux nombres réels. Pour tous  $n \geq 0, m \geq n$ , on note  $a_{n,m}$  le nombre décimal obtenu en ne conservant que les décimales entre  $n$  et  $m$ . Le nombre  $a$  est ainsi limite de la suite  $(a_{0,n})$  quand  $n$  tend vers  $+\infty$ , de même pour  $b$ . Montrons que la suite de décimaux  $(a_{0,n} \times b_{0,n})$  est de Cauchy dans  $\mathbb{R}$ . On a, pour tous  $p, q$  avec  $p < q$ ,

$$\begin{aligned} a_{0,q} \times b_{0,q} - a_{0,p} \times b_{0,p} &= (a_{0,p} + a_{p+1,q}) \times (b_{0,p} + b_{p+1,q}) - a_{0,p} \times b_{0,p} \\ &= a_{p+1,q} \times b_{0,p} + a_{0,p} \times b_{p+1,q} + a_{p+1,q} \times b_{p+1,q}, \end{aligned}$$

qui est majoré en valeur absolue par  $|b| \times 10^{-p} + |a| \times 10^{-p} + 10^{-2p}$ , qui tend vers 0 quand  $p$  et  $q$  tendent vers  $+\infty$ . La suite  $(a_{0,n} \times b_{0,n})$ , de Cauchy, converge donc vers une limite. Le produit  $a \times b$  est défini comme cette limite.

**Définition A.1.41.** (Droite numérique achevée)

On appelle droite numérique achevée, et l'on note  $\mathbb{R}$ , l'ensemble  $\overline{\mathbb{R}}$  auquel on rajoute deux points noté  $+\infty$  et  $-\infty$ .

La relation d'ordre sur  $\mathbb{R}$  est étendue à  $\overline{\mathbb{R}}$  par  $-\infty < +\infty$  et, pour tout réel  $a$ ,  $-\infty < a < +\infty$ .

### A.1.5 Inégalités fondamentales

**Proposition A.1.42.** (Inégalité arithmético-géométrique)

Soient  $x_1, \dots, x_n$  des réels positifs ou nuls, et  $(\alpha_n) \in ]0, +\infty[^n$  une famille de poids. On a

$$(x_1^{\alpha_1} \dots x_n^{\alpha_n})^{1/\alpha} \leq \frac{1}{\alpha} \sum_{i=1}^n \alpha_i x_i,$$

avec  $\alpha = \sum \alpha_i$ .

*Démonstration.* Par concavité de la fonction logarithme, on a

$$\frac{1}{\alpha} \sum \alpha_n \log x_n \leq \log \left( \frac{1}{\alpha} \sum \alpha_n x_n \right),$$

d'où l'inégalité en prenant l'exponentielle.  $\square$

**Proposition A.1.43.** (Inégalité de Young)

Soient  $a$  et  $b$  deux réels positifs ou nuls, et  $p, q$  deux réels  $> 0$  conjugués, i.e. tels que  $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ . On a alors

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}.$$

*Démonstration.* C'est une conséquence de l'inégalité arithmético-géométrique (proposition A.1.42), avec  $\alpha_1 = 1/p$ ,  $\alpha_2 = 1/q$ ,  $x_1 = a^p$ , et  $x_2 = b^q$ .  $\square$

**Proposition A.1.44.** (Inégalité de Hölder)

Soient  $p$  et  $q$  deux réels positifs conjugués, i.e. tels que  $1/p + 1/q = 1$ , et  $\theta = (\theta_i) \in [0, +\infty[^d$ . Pour tous  $x = (x_i), y = (y_i) \in \mathbb{R}^d$ , on a

$$\sum_{i=1}^d |\theta_i x_i y_i| \leq \left( \sum_{i=1}^d \theta_i |x_i|^p \right)^{1/p} \left( \sum_{i=1}^d \theta_i |y_i|^q \right)^{1/q}.$$

*Démonstration.* Remarquons en premier lieu que cette inégalité est 1-homogène vis à vis de  $x$  et  $y$  : si elle est valable pour  $x$  et  $y$ , elle est aussi valable pour  $\lambda x$  et  $\mu y$ , quels que soient les réels  $\lambda$  et  $\mu$ . Il suffit donc de la démontrer dans le cas particulier où  $\sum \theta_i |x_i|^p = \sum \theta_i |y_i|^q = 1$ , c'est-à-dire de montrer que, pour  $x$  et  $y$  ainsi normalisés, on a

$$\sum_{i=1}^d |\theta_i x_i y_i| \leq 1.$$

Cette inégalité résulte directement de l'inégalité de Young (proposition A.1.43) :

$$\sum_{i=1}^d |\theta_i x_i y_i| \leq \sum_{i=1}^d \theta_i \left( \frac{|x_i|^p}{p} + \frac{|y_i|^q}{q} \right) = \frac{1}{p} \sum_{i=1}^d \theta_i |x_i|^p + \frac{1}{q} \sum_{i=1}^d \theta_i |y_i|^q = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1,$$

ce qui conclut la preuve.  $\square$

**Proposition A.1.45.** (Inégalité de Minkovski)

Soit  $p \in [1, +\infty]$ , et  $\theta = (\theta_i) \in [0, +\infty[^d$ . Pour tous  $x = (x_i), y = (y_i) \in \mathbb{R}^d$ , on a

$$\left( \sum_{i=1}^d \theta_i |x_i + y_i|^p \right)^{1/p} \leq \left( \sum_{i=1}^d \theta_i |x_i|^p \right)^{1/p} + \left( \sum_{i=1}^d \theta_i |y_i|^p \right)^{1/p}.$$

*Démonstration.* L'inégalité est immédiate pour le cas  $p = +\infty$ . Pour  $p \in [1, +\infty[$ , on écrit

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^d \theta_i |x_i + y_i|^p &= \sum_{i=1}^d \theta_i |x_i + y_i| |x_i + y_i|^{p-1} \leq \sum_{i=1}^d \theta_i (|x_i| + |y_i|) |x_i + y_i|^{p-1} \\ &= \sum_{i=1}^d \theta_i |x_i| |x_i + y_i|^{p-1} + \sum_{i=1}^d \theta_i |y_i| |x_i + y_i|^{p-1}. \end{aligned}$$

On applique alors l'inégalité de Hölder (proposition A.1.44) à chacun des deux termes de la somme avec les indices  $p$  et  $p/(p-1)$ , pour obtenir

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^d \theta_i |x_i + y_i|^p &\leq \left( \sum_{i=1}^d \theta_i |x_i|^p \right)^{1/p} \left( \sum_{i=1}^d \theta_i |x_i + y_i|^p \right)^{(p-1)/p} \\ &\quad + \left( \sum_{i=1}^d \theta_i |y_i|^p \right)^{1/p} \left( \sum_{i=1}^d \theta_i |x_i + y_i|^p \right)^{(p-1)/p}. \end{aligned}$$

On divise les deux membres de cette inégalité par  $(\sum \theta_i |x_i + y_i|^p)^{1-1/p}$  (si cette quantité est nulle, l'inégalité à démontrer est trivialement vérifiée), pour obtenir l'inégalité annoncée.  $\square$

## A.2 Pour aller plus loin (●●●●)

### A.2.1 Théorie des ensembles, cardinalité

**Axiome A.2.1.** (Axiome du choix (●●●))

Soit  $(X_i)_{i \in I}$  une famille d'ensembles. Il existe une application qui à chaque ensemble  $X_i$  associe un élément  $x_i$  de cet ensemble.

**Théorème A.2.2.** (Cantor-Bernstein (●●●●))

Si  $X \lesssim Y$  et  $Y \lesssim X$ , on a  $X \simeq Y$ . En d'autres termes, s'il existe une injection de  $X$  dans  $Y$ , et une injection de  $Y$  dans  $X$ , alors il existe une bijection entre  $X$  et  $Y$ .

### A.2.2 Complété d'un espace métrique (●●●●)

**Définition A.2.3.** Soit  $(X, d)$  un espace métrique. On appelle complété de cet espace la donnée d'un espace métrique complet  $(\bar{X}, \bar{d})$  muni d'une isométrie

$$T : (X, d) \longrightarrow (\bar{X}, \bar{d})$$

dont l'image est dense dans  $\bar{X}$ .

**Théorème A.2.4.** (Complété d'un espace métrique)

Tout espace métrique admet un complété, qui est unique à isométrie près.

*Démonstration.* Soit  $(X, d)$  un espace métrique. On munit l'espace des suites dans  $X$  de la relation d'équivalence

$$x = (x_n)_{n \in \mathbb{N}}, x' = (x'_n)_{n \in \mathbb{N}}, x \mathcal{R} x' \iff d(x_n, x'_n) \longrightarrow 0$$

On note  $C$  l'ensemble des suites de Cauchy dans  $X$ , et  $\bar{X} = C / \mathcal{R}$  l'espace quotient. Pour  $\bar{x}, \bar{x}'$  dans  $\bar{X}$ ,  $(x_n) \in \bar{x}, (x'_n) \in \bar{x}'$ , la quantité  $d(x_n, x'_n)$  converge vers une limite qui ne dépend pas des représentants choisis. En effet, on a

$$d(x_p, x'_p) - d(x_q, x'_q) \leq d(x_p, x_q) + d(x_q, x'_q) + d(x'_q, x'_p) - d(x_q, x'_q) = d(x_p, x_q) + d(x'_q, x'_p)$$

qui tend vers 0 quand  $p, q$  tendent vers  $+\infty$ . On montre de la même manière que son opposé  $d(x_q, x'_q) - d(x_p, x'_p)$  est majoré par une quantité qui tend vers 0. La valeur absolue de  $d(x_p, x'_p) - d(x_q, x'_q)$  tend donc vers 0 quand  $p$  et  $q$  tendent vers  $+\infty$ . La suite  $d(x_n, x'_n)$  est donc de Cauchy dans  $\mathbb{R}$ , donc converge vers une limite  $\ell \in \mathbb{R}$ . On montre immédiatement que cette limite ne dépend pas du représentant choisi du fait de l'adjacence des suites d'une même classe. On note  $\bar{d}(\bar{x}, \bar{x}')$  cette limite.

On montre tout aussi immédiatement que  $\bar{d}(\cdot, \cdot)$  est une distance sur  $\bar{X}$ .



On note  $T$  l'application qui à une suite constante dans  $X$  (donc de Cauchy) associe sa classe dans  $\overline{X}$ . Cette application est par construction une isométrie de  $X$  vers  $\overline{X}$ . Montrons que son image est dense dans  $\overline{X}$ . Soit  $\overline{x}$  une classe de  $\overline{X}$ , et  $(x_n)$  l'un de ses représentants. On note  $\overline{x_n}$  la classe de la suite constante égale à  $x_n$ . On a

$$\bar{d}(\overline{x_n}, \overline{x}) = \lim_q \bar{d}(x_n, x_q),$$

qui tend vers 0 quand  $n$  tend vers l'infini du fait du caractère de Cauchy de  $(x_n)$ .

Montrons maintenant que  $\overline{X}$  muni de  $\bar{d}$  est un espace métrique complet. On considère une suite  $(\overline{x^n})$  de Cauchy dans  $\overline{X}$ . Pour tout  $n$ , comme on l'a vu précédemment, la classe  $\overline{x^n}$  peut être approchée par la classe d'une suite constante écrite  $\overline{u_n}$ , avec  $u_n \in X$ , à  $1/n$  près. On considère maintenant la suite  $u = (u_n)$ . Cette suite est de Cauchy par construction. En effet, on a

$$d(u_p, u_q) = \bar{d}(\overline{u_p}, \overline{u_q}) \leq \bar{d}(\overline{u_p}, \overline{x^p}) + \bar{d}(\overline{x^p}, \overline{x^q}) + \bar{d}(\overline{x^q}, \overline{u_q}) \leq \frac{1}{p} + \bar{d}(\overline{x^p}, \overline{x^q}) + \frac{1}{q}.$$

On note  $\overline{u}$  sa classe. On a

$$\bar{d}(\overline{x^n}, \overline{u}) \leq \bar{d}(\overline{x^n}, \overline{u_n}) + \bar{d}(\overline{u_n}, \overline{u}),$$

qui tend vers 0 par construction. □

### A.2.3 Topologie générale (●●●●)

**Définition A.2.5.** (Topologie, ouverts, fermés)

Soit  $X$  un ensemble. On appelle topologie sur  $X$  la donnée d'une famille  $\mathcal{T}$  de parties de  $X$ , qu'on appelle les *ouverts*, telle que

- (i) l'ensemble vide et  $X$  appartiennent à  $\mathcal{T}$ ,
- (ii) toute union d'ouverts est un ouvert,
- (iii) toute intersection finie d'ouverts est un ouvert.

On appelle fermé le complémentaire d'un ouvert.

On appelle le couple  $(X, \mathcal{T})$  un *espace topologique*.

**Définition A.2.6.** (Finesse)

Soient  $\mathcal{T}$  et  $\mathcal{T}'$  deux topologie sur  $X$ . On dit que  $\mathcal{T}'$  est *plus fine* que  $\mathcal{T}$  si  $\mathcal{T} \subset \mathcal{T}'$ , i.e. si tout ouvert de  $\mathcal{T}$  est ouvert de  $\mathcal{T}'$ .

**Définition A.2.7.** (Topologies discrète et grossière)

Tout ensemble  $X$  peut être muni de la topologie *discrète*, pour laquelle tout singleton, et donc toute partie, est un ouvert. Toute partie est donc à la fois ouverte et fermée pour la topologie discrète. C'est la plus fine des topologies dont on puisse équiper  $X$ . À l'opposé, pour la topologie *grossière*, seuls  $\emptyset$  et  $X$  sont des ouverts. C'est la topologie la moins fine.

**Définition A.2.8.** (Voisinage)

Soit  $(X, \mathcal{T})$  un espace topologique, et  $x \in X$ . On appelle voisinage de  $x$  toute partie de  $X$  qui contient un ouvert contenant  $x$ . On note  $\mathcal{V}(x)$  l'ensemble des voisinage de  $x$ .

**Définition A.2.9.** (Espace topologique séparé)

Un espace topologique  $(X, \mathcal{T})$  est dit *séparé* si pour tous  $x, x'$  dans  $X$ , distincts, il existe des voisinage  $U$  et  $U'$  de  $x$  et  $x'$ , respectivement, avec  $U \cap U' = \emptyset$ .

La topologie discrète est séparée, la topologie grossière ne l'est pas (dès que l'ensemble comporte au moins 2 éléments).

**Proposition A.2.10.** Tout espace métrique muni de la topologie associée est séparé.

**Définition A.2.11.** Une application d'un espace topologique  $(X, \mathcal{T})$  dans un espace topologique  $(X', \mathcal{T}')$  est dite *continue* si l'image réciproque de tout ouvert est un ouvert.

**Exercice A.2.1.** Montrer qu'une application d'un espace topologique  $(X, \mathcal{T})$  dans un espace topologique  $(X', \mathcal{T}')$  est continue si et seulement si l'image réciproque de tout fermé est un fermé.

**Proposition A.2.12.** L'application identité de  $(X, \mathcal{T}')$  dans  $(X, \mathcal{T})$  est continue si et seulement si  $\mathcal{T}'$  est plus fine que  $\mathcal{T}$ .

**Exercice A.2.2.** a) Décrire l'ensemble des applications continues de  $(X, \mathcal{T})$  dans  $(X', \mathcal{T}')$  lorsque  $\mathcal{T}'$  est la topologie grossière sur  $X'$ .

b) Décrire l'ensemble des applications continues de  $(X, \mathcal{T})$  dans  $(X', \mathcal{T}')$  lorsque  $\mathcal{T}$  est la topologie discrète sur  $X'$ .

**Définition A.2.13.** (Topologie induite)

Soit  $X$  un espace topologique et  $A \subset X$ . L'ensemble des intersections d'ouverts de  $X$  avec  $A$  munit  $A$  d'une topologie, appelée *topologie induite*.

**Définition A.2.14.** (Connexité)

Soit  $X$  un espace topologique. On dit que  $X$  est *connexe* si les seules parties de  $X$  à la fois ouvertes et fermées sont  $X$  et  $\emptyset$ . On dit que  $A \subset X$  est connexe si  $A$  muni de la topologie induite est connexe.

**Proposition A.2.15.** L'espace  $X$  est connexe s'il n'admet aucune partition<sup>12</sup> en deux ouverts.

**Proposition A.2.16.** Une union de parties connexes d'intersection non vide est connexe.

*Démonstration.* Soit  $C$  l'union d'une famille  $(C_i)_{i \in I}$  de parties connexes, et  $x \in \cap C_i$ . Considérons une partition de  $C$  pour la topologie induite :

$$C = (U_1 \cup U_2) \cap C,$$

où  $U_1$  et  $U_2$  sont des ouverts de  $X$ . Le point  $x$  est nécessairement dans l'un des deux ouverts, par exemple  $x \in U_1$ . Pour tout  $C_i$ , l'union disjointe des ouverts  $U_1$  et  $U_2$  recouvre  $C_i$ . Comme  $C_i$  est connexe, l'intersection d'un des deux ensembles avec  $C_i$  est nécessairement vide, comme ça ne peut pas être  $U_1$  qui contient  $x \in C_i$ , c'est  $U_2$ . On a donc  $U_2 \cap C_i = \emptyset$  pour tout  $i$ . Ainsi  $C$  n'admet aucune partition en deux ouverts (non vides),  $C$  est donc connexe.  $\square$

**Définition A.2.17.** (Composantes connexes)

Soit  $X$  un espace topologique. Pour tout  $x \in X$  on note  $C_x$  la plus grande partie connexe contenant  $x$ , définie comme l'union des connexes contenant  $x$  (qui est bien connexe d'après la proposition précédente). Pour  $x \neq y$ , on a  $C_x = C_y$  ou  $C_x \cap C_y = \emptyset$ , toujours d'après la proposition précédente. On peut donc introduire la relation d'équivalence suivante :  $x \mathcal{R} y$  si  $C_x = C_y$ . Les classe d'équivalence de cette relation sont appelées *composantes connexes* de  $X$ .

**Remarque A.2.18.** Un espace connexe est un espace qui ne possède qu'une seule composante connexe, qui est l'espace entier. Pour la topologie discrète, tout ensemble  $X$  est *totalelement discontinu*, c'est à dire que la composante connexe de chaque point est réduite à lui-même. Pour la topologie grossière, tout ensemble est connexe.

## Suites

---

12. On rappelle que les membres d'une partition doivent être non vides.

**Définition A.2.19.** (Suites convergentes)

Soit  $(x_n)$  une suite d'éléments de  $(X, \mathcal{T})$ . On dit que cette suite converge vers  $x \in X$  si, pour tout ouvert  $U$  contenant  $x$ , il existe  $N$  tel que, pour tout  $n \geq N$ ,  $x_n \in U$ .

**Exercice A.2.3.** Décrire l'ensemble des suites admettant une limite dans le cas où la topologie est discrète, et dans le cas où la topologie est grossière.

**Proposition A.2.20.** (Unicité de la limite dans un espace séparé)

Soit  $(X, \mathcal{T}')$  un espace séparé. Alors toute suite convergente converge vers une limite unique.

**Compacité****Définition A.2.21.** (Espace topologique compact (●))

Soit  $(X, \mathcal{T})$  un espace topologique, et  $K$  une partie de  $X$  (qui peut être  $X$  lui-même). On dit que  $K$  est *compact* s'il vérifie la propriété de *Borel-Lebesgue* : de tout recouvrement de  $K$  par des ouverts on peut extraire un recouvrement fini :

$$K \subset \bigcup_{i \in I} U_i, \quad U_i \text{ ouvert } \forall i \in I \implies \exists J \subset I, \quad J \text{ fini, tel que } K \subset \bigcup_{i \in J} U_i.$$

**Exercice A.2.4.** Décrire les compacts de  $(X, \mathcal{T})$  lorsque  $\mathcal{T}$  est la topologie discrète (respectivement grossière)

L'exercice précédent illustre de façon caricaturale que moins il y a d'ouverts (c'est à dire plus la topologie est grossière), plus il y a de compacts. C'est cette dualité qui motive la construction de topologies les plus grossières possibles<sup>13</sup> de façon à avoir le plus de compacts possibles. On prendra néanmoins garde au fait qu'une suite dans un compact (au sens de la topologie générale), n'admet pas nécessairement de sous-suite convergente.

---

13. Il est néanmoins nécessaire de conserver la propriété de séparation pour pouvoir espérer construire des objets comme limites de suites.

