

Nom

1. Anomena les parts dels òrgans reproductors i la seva utilitat.





(2 punts)

	Masculins	Femenins
1	Uretra - Evacua orina i condueix semen durant l'ejaculació	Vagina - òrgan que uneix l'exterior del cos amb l'úter, per on surt el fetus durant el part i on el penis ejacula durant la copulació.
2	Testicle - produeix espermatozoides	Coll uterí
3	Pròstata - És una glàndula que expulsa el semen durant l'ejaculació i impedeix que orina i semen es puguin barrejar.	Trompa de fal·lopi - Condudeix l'òvul cap a l'úter. És el lloc on es pot fecundar l'òvul.
4	Vesícula seminal- Produeix la major part del líquid seminal (semen)	Úter - La gestació de l'òvul fecundat es produeix a l'úter. Quan no és produeix fecundació, mensualment expulsa l'endometri.
5	Conducte deferent - És el conducte pel qual els espermatozoides arriben a la vesícula seminal.	Ovaris - Als ovaris maduren els òvuls abans de sortir a les trompes de fal·lopi.

Paulino Posada pàg. 1 de 6

2. Explica quina diferència hi ha durant la fecundació entre bessons univitelins i bivitelins.

Els besson univitelins procedeixen del mateix zigot i es desenvolupen en la mateixa bossa amniòtica. Comparten informació genètica idèntica i sempre són del mateix sexe.

Els bessons bivitelins es desenvolupen a partir de dos zigots diferents en bosses amniòtiques independents. Poden ser del mateix sexe o de sexes diferents depenent de la combinació de cromosomes.

Els bessons univitelins poden ser del mateix sexe? Raona la teva resposta. Sí, sempre ho són perquè la seva infomació genètica és idèntica.

(1 punt)

Paulino Posada pàg. 2 de 6

3. Quins mètodes anticonceptius coneixes. Explica breument el funcionament i els avantatges i desavantatges.

(3 punts)

Abstenció periòdica

- + Barat
- Molt insegur en la protecció anticonceptiva.. No protegeix del contagi de MTS.

Preservatius masculi i femeni

- + Protegeixen del contagi de MTS.
- Poden resultar insegurs si no s'utilitzen correctament i incòmodes.

DIU

- + Molt segur en la protecció anticonceptiva.
- No protegeix del contagi de MTS. Col·locació per professional.

Diafragma

- No protegeix del contagi de MTS. Relativament insegur en la protecció anticonceptiva.

Píndola anticonceptiva

- + Molt segura en la protecció anticonceptiva.
- No protegeix del contagi de MTS. Pot tenir efectes secundaris negatius.

Vasectomia i lligadura de trompes

- + Molt segures en la protecció anticonceptiva. Vasectomia operació molt senzilla.
- No protegeixen del contagi de MTS. Permanents.

Paulino Posada pàg. 3 de 6

- 4. Quin mètode anticonceptiu recomanaries Raona les teves respostes.
 - a.) A una jove que té por a contagiar-se d'una MTS sexual i que comenta que la seva parella no vol utilizar preservatiu masculí perquè li sembla complicat posar-li-ho.

Preservatiu femení, perquè ofereix màxima protecció al contagi de MTS.

- b.) A una parella estable que s'ha fet una revisió mèdica que confirma que no té cap MTS i que considera la possiblitat de tenir fills en el futur. *DIU perquè és segur i reversible*.
- c.) A una parella sense MTS que ha decidit que no procrearà.

 Vasectomia, perquè és una operació senzilla i econòmica.

 (3 punts)

Paulino Posada pàg. 4 de 6

5. Quines de les següents MTS estan causades per infecció amb bacteris i quines amb virus? Quines són més fàcils de tractar i de curar? Raona la teva resposta. SIDA, gonorrea, herpes genital, hepatitis B, sífilis,

(2 punts)

SIDA, hepres genital i hepatitis B - infeccions víriques Gonorrea, i sífilis - infeccions bacterianes

Les infeccions bacterianes es poden tractar i curar amb antibiòtics. Les víriques són més complicades de tractar i sovint no arriben a desapareixer.

6. Omple els buits amb les paraules adients.

(1 punt)

En la reproducció humana la unió dels òrgans masculí i femení s'anomena _copulació__. En aquest procés l'home ejacula i la __fecundació__ es produeix quan un _espermatozoide_ es junta amb un _ôvul_, formant un zigot.

El zigot creix al _*úter*_ . Aixì, durant la _*gestació*_ es va formant el _*fetus*_ . Passats aproximadament _*nou mesos*_, quan el fetus està preparat per viure fora de la mare es produeix el _*part*_.

Paulino Posada pàg. 5 de 6

7. Quina relació té la gestació subrogada amb la fecundació in vitro?

(1 punt)

En la gestació subrogada una dona, a la qual se li implanta un zigot produït per fecundació in vitro, gesta el fetus i, una vegada nascut el bebé, l'entrega a les persones amb les quals ha contractat la gestació.

8. En quins casos consideraries justificat abortar, tenir descendencia per gestació subrogada o contractar serveix sexuals a canvi de diners?

(1 punt)

Per puntuar en aquesta resposta, s'havia de argumentar els tres aspectes demanats en l'enunciat.

Qualsevol opinió expressada es acceptada com a vàlida.

A manera d'exemple segueixen tres possibles respostes.

- Considero justificat abortar quan la vida de la mare corr perill.
- No considero justificada la gestació subrogada mai, perquè converteix la procreació en una gestió econòmica desfavorable per a la dona gestant.
- No considero el contracte de serveis sexuals justificat mai, perquè falta el respecte a la dignitat humana.

Suma punts 14

Paulino Posada pàg. 6 de 6