

# Inferência Estatística II

## Testes de hipóteses específicos

---



Prof. Paulo Cerqueira Jr - cerqueirajr@ufpa.br

Faculdade de Estatística - FAEST

Instituto de Ciências Exatas e Naturais - ICEN

<https://github.com/paulocerqueirajr> 

# Introdução

# Introdução

- Existem uma série de testes de hipóteses, cada um com sua finalidade.
- Para uma amostra, temos alguns testes:
  - Teste de normalidade
  - Teste-t comparação de grupos (independentes e pareados);
  - Testes não-paramétricos Wilcoxon;
  - Teste para média populacional com variância desconhecida (Teste t de Student).

# Testes para duas amostra

# Testes para duas amostra

---

- Existem uma série de testes de hipóteses, cada um com sua finalidade.
- Para duas amostra, temos alguns testes:
  - Teste para a comparação de médias com variância conhecida (Teste  $Z$ );
  - Teste para a comparação de médias com variância desconhecida (Teste t de **Student** comparação de grupos);
  - Teste para a comparação de variâncias;
  - Teste para comparação de amostras dependentes (Teste t de **Student** comparação de grupos pareado)

# Teste para Comparação das médias

---

- Queremos comparar:

$$\begin{array}{ll} & \times \quad (i) H_1 : \mu_1 \neq \mu_2. \text{ (bilateral)} \\ H_0 : \mu_1 = \mu_2 & \times \quad (ii) H_1 : \mu_1 > \mu_2. \text{ (Unilateral à direita)} \\ & \times \quad (iii) H_1 : \mu_1 < \mu_2. \text{ (Unilateral à esquerda)} \end{array}$$

**CASO 1:** Mesma variância, conhecida. ( $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$ ).

- Estatística para o teste:

$$Z = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sigma \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}}} \sim N(0, 1).$$

# Exemplo

**Exemplo:** Vamos supor que os níveis de QI entre meninos e meninas da décima série sejam normalmente distribuídos, cada um com desvio padrão populacional de 25. Uma professora quer saber se a média do QI entre meninos e meninas da turma é diferente, então ela seleciona duas amostras aleatórias — uma de meninos e outra de meninas — cada uma com tamanho 40, e registra os níveis de QI. Vamos realizar o teste Z para duas amostras para determinar se a média dos níveis de QI é diferente entre meninos e meninas, com nível de significância de 5%.

Os dados:

```
1 # Definindo os dados:
2 qi_meninos = c( 79,118,99,117,98,102,112,111,102,73,114,97,114,122,
3                90,115,84,105,84,126,83,96,111,151,147,103,104,118,
4                132,108,95,118,121,88,94,92,94,109,105,123)
5 qi_meninas = c( 99,128,89,107,99,104,119,112,105,93,84,91,113,129,
6                100,105,94,115,114,106,113,116,116,131,117,123,134,
7                128,112,101,105,89,101,118,124,72,104,119,145,133)
8 dados <- data.frame(grupo = rep(c("Meninas", "Meninos")),
9                    qi = c(qi_meninos, qi_meninas))
10 head(dados)
```

	grupo	qi
1	Meninas	79
2	Meninos	118
3	Meninas	99
4	Meninos	117
5	Meninas	98
6	Meninos	102

# Exemplo

---

**Passo 1:**  $H_0 : \mu_A = \mu_B$  contra  $H_1 : \mu_A \neq \mu_B$

**Passo 2:**

$$Z = \frac{\bar{X}_A - \bar{X}_B - (\mu_A - \mu_B)}{\sigma \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}}} \sim N(0, 1)$$

**Passo 3:** Sob  $H_0$ , temos  $Z = \frac{\bar{X}_A - \bar{X}_B}{\sqrt{50} \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}}} \sim N(0, 1)$ ,

$$RC = \{Z \in \mathbb{R} : |Z| < z_c\}$$

Logo,

$$0,025 = P(Z < z_1 | Z \sim N(0, 1)) \quad \text{e} \quad 0,025 = P(Z > z_2 | Z \sim N(0, 1)).$$

Assim, temos  $z_1 = -1,96$  e  $z_2 = 1,96$ . E a regra de decisão é dada por

Rejeitar  $H_0$  se  $|Z| < 1,96$ .





# Exemplo

Passo 4: O valor observado da estatística é

$$z_0 = \frac{106.350 - 110.175}{\sqrt{50} \sqrt{\frac{1}{40} + \frac{1}{40}}} = -1.710592$$

**Passo 5:** Como o valor observado de  $Z$  pertence a RC, rejeitamos  $H_0$ , e concluímos que há evidências de que a média dos níveis de QI é a mesma entre meninos e meninas.

## Importante

- Poderíamos construir um I.C. para a diferença  $\theta = \mu_A - \mu_B$ !!!
- Em que:

$$\text{IC}(\theta, \gamma) = \left( \bar{X}_A - \bar{X}_B \pm z_{\alpha/2} \sigma \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}} \right)$$

# Exemplo

```
1 library(BSDA)
2 z.test(x=qi_meninos, y=qi_meninas, mu=0, sigma.x=25, sigma.y=25, alternative = "two.sided")
```

Two-sample z-Test

```
data:  qi_meninos and qi_meninas
z = -0.68424, p-value = 0.4938
alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 -14.781532    7.131532
sample estimates:
mean of x mean of y
 106.350   110.175
```

# Teste para Comparação das médias

---

**CASO 2:** Mesma variância, desconhecida.

- Neste caso, a estatística para o teste:

$$T = \frac{\bar{X}_A - \bar{X}_B - (\mu_A - \mu_B)}{S_p \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}}} \sim t_{n+m-2},$$

onde

$$S_p^2 = \frac{(n-1)S_A^2 + (m-1)S_B^2}{n+m-2}.$$

- Este teste é conhecido como **teste t para duas amostras!**

# Teste para Comparação das médias

---

**CASO 3:** Variâncias desiguais e desconhecidas.

- Pode-se provar que a estatística

$$T = \frac{\bar{X}_A - \bar{X}_B - (\mu_A - \mu_B)}{\sqrt{\frac{S_A^2}{n} + \frac{S_B^2}{m}}},$$

sob  $H_0$ , tem uma distribuição aproximadamente t-Student com graus de liberdade, dados aproximadamente por

$$v = \frac{(x + y)^2}{\frac{x^2}{n-1} + \frac{y^2}{m-1}},$$

com  $x = \frac{S_A^2}{n}$  e  $y = \frac{S_B^2}{m}$ .

- Este teste é conhecido como **Problema de Behrens-Fisher!**.



# Exemplo

- Os dados:

```
1 # Peso de homens e mulheres
2 peso.m <- c(38.9, 61.2, 73.3, 21.8, 63.4,
3            64.6, 48.4, 48.8, 48.5)
4 peso.h <- c(67.8, 60, 63.4, 76, 89.4,
5            73.3, 67.3, 61.3, 62.4)
6 # Criando um data frame
7 dados <- data.frame(
8     grupo = rep(c("Mulheres",
9                  "Homens"), ea
10    peso = c(peso.m, peso.h)
11    )
12 head(dados)
```

```
  grupo peso
1 Mulheres 38.9
2 Mulheres 61.2
3 Mulheres 73.3
4 Mulheres 21.8
5 Mulheres 63.4
6 Mulheres 64.6
```


- Medidas de resumo:

```
1 library(dplyr)
2 group_by(dados, grupo) %>%
3   summarise(
4     freq = n(),
5     media = mean(peso, na.rm = TRUE),
6     vari = var(peso, na.rm = TRUE)
7   )
```

```
# A tibble: 2 × 4
  grupo      freq media  vari
  <chr>    <int> <dbl> <dbl>
1 Homens         9  69.0  87.9
2 Mulheres        9  52.1 243.
```

# Exemplo

```
1 library("ggpubr")
2 ggboxplot(dados, x = "grupo", y = "peso",
3           color = "grupo", palette = c("#00AFBB", "#E7B800"),
4           ylab = "Peso", xlab = "Grupos")
```





# Exemplo

---

A construção formal do teste.

**Passo 1:**  $H_0 : \mu_A = \mu_B$  contra  $H_1 : \mu_A \neq \mu_B$

**Passo 2:**

$$T = \frac{\bar{X}_A - \bar{X}_B - (\mu_A - \mu_B)}{\sqrt{\frac{S_A^2}{n} + \frac{S_B^2}{m}}}$$

# Exemplo

---

**Passo 3:** Sob  $H_0$ , temos  $T = \frac{\bar{X}_A - \bar{X}_B}{\sqrt{\frac{s_A^2}{n} + \frac{s_B^2}{m}}} \sim t_v$

$$RC = \{T \in \mathbb{R} : T < t_1 \text{ ou } T > t_2\},$$

com

$$0,025 = P(T < t_1 | T \sim t_v) \quad \text{e} \quad 0,025 = P(T > t_2 | T \sim t_v).$$

Agora,

$$v = \frac{((87.9/9) + (243/9))^2}{(87.9/9)^2/8 + (243/9)^2/8} = 13.1179798 \simeq 14$$

Portanto,

$$t_1 = -2.1447867 \quad \text{e} \quad t_2 = 2.1447867.$$

E a regra de decisão é dada por: Rejeitar  $H_0$  se  $T < -2.1447867$  ou  $T > 2.1447867$ .



# Exemplo

---

**Passo 4:** O valor observado da estatística é

$$t_0 = \frac{69.0 - 52.1}{\sqrt{\frac{87.9}{9} + \frac{243}{9}}} = 2.7871451.$$

**Passo 5:** Como o valor observado de  $T$  pertence a RC, rejeitamos  $H_0$ , e concluimos que há evidências de que os dois tipos de vigas têm resistências médias diferentes.

# Exemplo

```
1 res <- t.test(peso ~ grupo, data = dados, var.equal = FALSE)
2 res
```

Welch Two Sample t-test

data: peso by grupo

t = 2.7842, df = 13.114, p-value = 0.01538

alternative hypothesis: true difference in means between group Homens and group Mulheres is not equal to 0

95 percent confidence interval:

3.795858 29.981920

sample estimates:

mean in group Homens	mean in group Mulheres
68.98889	52.10000

# Teste para Comparação das Variâncias

# Teste para Comparação das Variâncias

---

$$H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2$$

A estatística do teste será

$$F = \frac{S_1^2 / \sigma_1^2}{S_2^2 / \sigma_2^2} \sim F_{n-1, m-1}$$

**Exemplo:** Queremos verificar se duas máquinas produzem peças com a mesma homogeneidade quanto à resistência à tensão. Para isso, sorteamos duas amostras de seis peças de cada máquina, e obtivemos as seguintes resistências:

- Máquina A: 145, 127, 136, 142, 141, 137
- Máquina B: 143, 128, 132, 138, 142, 132

# Exemplo

---

**Passo 1:**  $H_0 : \sigma_A^2 = \sigma_B^2$  contra  $H_1 : \sigma_A^2 \neq \sigma_B^2$

**Passo 2:**

$$F = \frac{S_A^2 / \sigma_A^2}{S_B^2 / \sigma_B^2} \sim F_{5,5}$$

**Passo 3:** Sob  $H_0$ , temos que  $F = \frac{S_A^2}{S_B^2} \sim F_{5,5}$

Fixando  $\alpha = 0,05$ , a RC é dada por

$$RC = \{F < F_1 \text{ ou } F > F_2\},$$

com  $F_1$  e  $F_2$  tais que

$$0,025 = P(F < F_1 | F \sim F_{5,5}) \quad \text{e} \quad 0,025 = P(F > F_2 | F \sim F_{5,5})$$



# Exemplo

---

Temos então,  $F_2 = 7,15$  e  $F_1 = 1/7,15 = 0,14$ . Assim, a regra de decisão é:

Rejeitar  $H_0$  se  $F < 0,14$  ou  $F > 7,15$ .

**Passo 4:** Com os dados apresentados, temos  $S_A^2 = 40$  e  $S_B^2 = 37$ . Portanto, o valor observado da estatística é  $F_o = 40/37 = 1,08$ .

**Passo 5:** Como o valor observado da estatística não pertence a RC, aceitamos  $H_0$  e concluimos que as máquinas produzem com a mesma variabilidade.

# Exemplo

```
1 A <- c(145, 127, 136, 142, 141, 137)
2 B <- c(143, 128, 132, 138, 142, 132)
3 dados <- data.frame(
4     grupo = rep(c("A",
5                 "B")),
6     res = c(A, B)
7 )
8 head(dados)
```

```
  grupo res
1     A 145
2     B 127
3     A 136
4     B 142
5     A 141
6     B 137
```

```
1 res.ftest <- var.test(res ~ grupo, data = dados)
2 res.ftest
```

F test to compare two variances

data: res by grupo

F = 0.6676, num df = 5, denom df = 5, p-value = 0.6683

alternative hypothesis: true ratio of variances is not equal to 1

95 percent confidence interval:

0.09341832 4.77094592

sample estimates:

ratio of variances

0.667603

# Duas Populações Normais dependentes

# Duas Populações Normais dependentes

---

Aqui temos duas amostras  $X_1, X_2, \dots, X_n$  e  $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ , só que agora as observações são pareadas, isto é, temos uma amostra de pares

$$(X_1, Y_1), (X_2, Y_2), \dots, (X_n, Y_n)$$

Se definirmos a v.a.  $D = X - Y$ , teremos uma amostra  $D_1, D_2, \dots, D_n$ , resultante da diferença dos valores entre cada par. Reduzimos o problema de duas populações a um problema de uma única população, já visto anteriormente. Assim,

$$\overline{D} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n D_i = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - Y_i) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i = \overline{X} - \overline{Y}$$

terá distribuição  $N(\mu_D, \sigma_D^2/n)$ .

# Duas Populações Normais dependentes :

---

Considerando

$$S_D^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (D_i - \bar{D})^2,$$

temos que

$$T = \frac{\sqrt{n}(\bar{D} - \mu_D)}{S_D} \sim t_{n-1}$$

Como  $\mu_D = E(D) = E(X - Y) = E(X) - E(Y) = \mu_1 - \mu_2$ , testar  $H_0 : \mu_D = 0$  é equivalente a testar  $H_0 : \mu_1 = \mu_2$ .

# Exemplo

---

**Exemplo:** Cinco operadores de certo tipo de máquina são treinados em máquinas de duas marcas diferentes, A e B. Mediu-se o tempo em que cada um deles gasta na realização de uma mesma tarefa, e os resultados estão na tabela a seguir.

Operador	Marca A	Marca B
A	80	75
B	72	70
C	65	60
D	78	72
E	85	78

Ao nível de significância de 10%, poderíamos afirmar que a tarefa realizada na Máquina A demora mais que na Máquina B?

# Exemplo

---

**Passo 1:**

$$H_0 : \mu_A = \mu_B \times H_1 : \mu_A > \mu_B$$

Essas hipóteses são equivalentes a

$$H_0 : \mu_D = 0 \times H_1 : \mu_D > 0$$

**Passo 2:**

$$T = \frac{\sqrt{n}(\bar{D} - \mu_D)}{S_D} \sim t_4$$

**Passo 3:** Como é o mesmo operador que realiza a tarefa nas duas máquinas, dizemos que as variáveis são emparelhadas. Sob  $H_0$ , temos  $T = \frac{\sqrt{n}\bar{D}}{S_D} \sim t_4$ . Assim, com  $\alpha = 0,10$ , temos

$$P(T > t_c | T \sim t_4) = 0,10.$$

Portanto,  $t_c = 1,533$ , logo, a regra de decisão é: Rejeitar  $H_0$  se  $T > 1,533$ .





# Exemplo

---

**Passo 4:** Da Tabela de dados acima, obtemos os valores de  $D$ :

$$d_i : \quad 5, 2, 5, 6, 7$$

e, portanto,

$$\bar{d} = 5, \quad \text{e} \quad s_D^2 = 3,5$$

Logo, o valor observado da estatística  $\hat{e}$

$$t_o = (\sqrt{5} \times 5) / \sqrt{3,5} = 5,98$$

**Passo 5:** Como o valor observado pertence a RC, rejeitamos  $H_0$ , ou seja, demora-se mais para realizar a tarefa na máquina A.

Podemos construir um I.C. para  $\mu_D$ , adotando  $\gamma = 0,90$ :

$$IC(\mu_D; 90\%) = \bar{D} \pm t_{\alpha/2} \times \sqrt{s_D^2 / n}$$

$$IC(\mu_D; 90\%) = 5 \pm 1,78 = [3,22 ; 6,78]$$

# Exemplo

```
1 ma <- c(80, 72, 65, 78, 85)
2 mb <- c(75, 70, 60, 72, 78)
3
4 dados <- data.frame(
5     grupo = rep(c("antes", "depois"), each=5),
6     tempo = c(ma, mb)
7 )
8 head(dados)
```

	grupo	tempo
1	antes	80
2	antes	72
3	antes	65
4	antes	78
5	antes	85
6	depois	75

```
1 group_by(dados, grupo) %>%
2   summarise(
3     freq = n(),
4     media = mean(tempo, na.rm = TRUE),
5     desvio = sd(tempo, na.rm = TRUE)
6   )
```

```
# A tibble: 2 × 4
  grupo    freq media desvio
  <chr>  <int> <dbl>  <dbl>
1 antes      5    76    7.71
2 depois     5    71    6.86
```