

# Inferência Estatística II

## Testes de hipóteses específicos - Aula 2

---



Prof. Paulo Cerqueira Jr - cerqueirajr@ufpa.br

Faculdade de Estatística - FAEST

Instituto de Ciências Exatas e Naturais - ICEN

<https://github.com/paulocerqueirajr> 

# Introdução

# Introdução

- Os testes não-paramétricos são muito úteis na ausência de normalidade ou na aplicação em variáveis em a natureza é não numérica.
- Para uma amostra, temos alguns testes:
  - Teste  $\chi^2$  de aderência;
  - Teste  $\chi^2$  de homogeneidade;
  - Teste  $\chi^2$  de independência.

# Teste $\chi^2$ de aderência

# Teste $\chi^2$ de aderência

Objetivo: Verificar se uma população  $P$  segue uma distribuição especificada  $P_0$ .

- Seja  $X$  uma v.a. que caracteriza uma população  $P$ . Suponha que esta variável está categorizada em  $s$  classes  $A_1, A_2, \dots, A_s$ , com  $p_i = P(X \in A_i), i = 1, 2, \dots, s$ . Queremos testar

$$H_0 : p_1 = p_{10}, p_2 = p_{20}, \dots, p_s = p_{s0} \quad \text{versus} \quad H_1 : p_j \neq p_{j0}, \text{ para algum } j,$$

onde  $p_{i0}$  são os valores especificados pela hipótese  $H_0$ , ou seja, são as probabilidades conhecidas que determinam  $P_0$ .

**Tabela 1:** Frequências observadas (O) e esperadas (E)

Frequências	$A_1$	$A_2$	$\dots$	$A_s$	Total
Observadas	$O_1$	$O_2$	$\dots$	$O_s$	$n$
Esperadas	$E_1$	$E_2$	$\dots$	$E_s$	$n$

# Teste $\chi^2$ de aderência

---

O valor esperado, sob  $H_0$ , para a classe  $A_i$  é dado por

$$E_i = n \times p_{i0}, \quad i = 1, 2, \dots, s.$$

A estatística do teste é dada por

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^s \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i},$$

que sob  $H_0$  tem distribuição qui-quadrado com  $s - 1$  graus de liberdade. A regra de decisão consiste em rejeitar  $H_0$ , ao nível  $\alpha$ , se o valor da estatística for grande, ou seja, a região crítica do teste é dada por

$$RC = \{\chi_{obs}^2 > k\},$$

onde  $k$  é tal que  $P\{\chi_{s-1}^2 > k\} = \alpha$ .

# Teste $\chi^2$ de aderência

Exemplo: Um estudo sobre acidentes de trabalho numa indústria revelou que, em 150 acidentes, obtemos a distribuição da Tabela 1. O objetivo é testar a hipótese que os acidentes ocorrem com igual frequência nos 5 dias da semana.

Tabela 1: Acidentes de trabalho nos dias da semana

Dia	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Total
$O_i$	32	40	20	25	33	150

Solução:

1. Hipóteses:

- $H_0$ : Os acidentes ocorrem com igual frequência nos 5 dias ( $p_1 = p_2 = \dots = p_5 = 0.2$ ).
- $H_1$ : Pelo menos um dia tem frequência diferente dos demais.

2. Cálculo das Frequências Esperadas ( $E_i$ ):

Sob  $H_0$ , cada dia deve ter:

$$E_i = n \times p_{i0} = 150 \times 0.2 = 30 \quad (\text{para todos os dias})$$





# Teste $\chi^2$ de aderência

---

## 3. Estatística do Teste ( $\chi^2$ ):

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^5 \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} = \frac{(32 - 30)^2}{30} + \frac{(40 - 30)^2}{30} + \frac{(20 - 30)^2}{30} + \frac{(25 - 30)^2}{30} + \frac{(33 - 30)^2}{30}$$

$$\chi^2 = \frac{4}{30} + \frac{100}{30} + \frac{100}{30} + \frac{25}{30} + \frac{9}{30} = 7.933$$

## 4. Região Crítica ( $\alpha = 0.05$ ):

- Graus de liberdade:  $s - 1 = 4$ .
- Valor crítico da tabela  $\chi^2_{4;0.05} = 9.488$ .
- Regra de decisão: Rejeitar  $H_0$  se  $\chi^2_{obs} > 9.488$ .

## 5. Conclusão:

Como  $7.933 < 9.488$ , **não rejeitamos  $H_0$** . Não há evidências estatísticas para afirmar que os acidentes ocorrem com frequências diferentes nos dias da semana.

# Teste $\chi^2$ de aderência

---

Tabela de Cálculo Detalhado:

Dia	$O_i$	$E_i$	$(O_i - E_i)^2 / E_i$
Segunda	32	30	0.133
Terça	40	30	3.333
Quarta	20	30	3.333
Quinta	25	30	0.833
Sexta	33	30	0.300
Total	150	150	7.933

# Teste $\chi^2$ de aderência

Exemplo: Considere os dados abaixo, que supostamente são uma amostra de tamanho 30 de uma distribuição normal, de média 10 e variância 25.

Dados	--	--	--	--	--
1,04	1,73	3,93	4,44	6,37	6,51
7,61	7,64	8,18	8,48	8,57	8,65
9,71	9,87	9,95	10,01	10,52	10,69
11,72	12,17	12,61	12,98	13,03	13,16
14,11	14,60	14,64	14,75	16,68	22,14

Solução:

1. Hipóteses:

- $H_0$ : Os dados seguem uma  $N(10, 25)$
- $H_1$ : Os dados **não** seguem uma  $N(10, 25)$

# Teste $\chi^2$ de aderência

## 2. Organizar os dados em classes

- Primeiro, devemos agrupar os dados em **k intervalos (classes)**. Como temos 30 observações, uma sugestão é usar  $k \approx \sqrt{n}$ , ou seja, **5 ou 6 classes**.
- Vamos usar **6 classes** com amplitudes aproximadamente iguais. Como os dados variam de 1,04 a 22,14, dividimos esse intervalo:
  - Amplitude total:  $22,14 - 1,04 = 21,10$
  - Amplitude de cada classe:  $21,10/6 \approx 3,52$

As classes ficam:

Classe	Intervalo	Frequência Observada ( $O_i$ )
1	[1,04; 4,56)	4
2	[4,56; 8,08)	4
3	[8,08; 11,60)	10
4	[11,60; 15,12)	10
5	[15,12; 18,64)	1

Classe	Intervalo	Frequência Observada ( $O_i$ )
6	[18, 64; 22, 16]	1
Total		30

# Teste $\chi^2$ de aderência

## 3. Calcular Frequências Esperadas ( $E_i$ )

- Com base na  $N(10, 25) = N(10, 5^2)$ , para cada classe calculamos a probabilidade  $p_i$  de um valor cair naquele intervalo, e multiplicamos por  $n = 30$ :
- Utilizando a padronização, temos que  $Z = \frac{x-\mu}{\sigma} = \frac{x-10}{5} \sim N(0, 1)$
- Calculamos:

Classe	Intervalo	$Z$ lim.inf	$Z$ lim. sup	$p_i$ (usando tabela normal)	$E_i = 30$
1	[1, 04; 4, 56)	-1.79	-1.09	$\Phi(-1.09) - \Phi(-1.79) = 0.1379 - 0.0367 = 0.1012$	3.04
2	[4, 56; 8, 08)	-1.09	-0.38	$0.3516 - 0.1379 = 0.2137$	6.41
3	[8, 08; 11, 60)	-0.38	0.32	$0.6255 - 0.3516 = 0.2739$	8.22
4	[11, 60; 15, 12)	0.32	1.02	$0.8461 - 0.6255 = 0.2206$	6.62
5	[15, 12; 18, 64)	1.02	1.73	$0.9582 - 0.8461 = 0.1121$	3.36
6	[18, 64; 22, 16]	1.73	2.43	$0.9925 - 0.9582 = 0.0343$	1.03

# Teste $\chi^2$ de aderência

---

## 4. Estatística do teste qui-quadrado

A fórmula é:

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$

Calculando cada termo:

Classe	$O_i$	$E_i$	$(O_i - E_i)^2 / E_i$
1	4	3.04	0.3032
2	4	6.41	0.9061
3	10	8.22	0.3855
4	10	6.62	1.7257
5	1	3.36	1,6576
6	1	1.03	0.0009
Total	$\chi^2 = 4,9789$		

# Teste $\chi^2$ de aderência

---

5. Grau de liberdade (a média e variância são **especificadas** e não estimadas)

$$gl = \text{nº de classes} - 1 - \text{nº de parâmetros estimados} = 6 - 1 = 5$$

6. Valor crítico: Para  $\alpha = 0,05$ , e  $gl = 5$ , temos:

$$\chi^2_{0,05;5} \approx 11,07$$

7. Conclusão: Como:

$$\chi^2_{\text{calculado}} = 4,9789 < 11,07 = \chi^2_{\text{crítico}}$$

**Não rejeitamos** a hipótese nula. Dessa forma, os dados são compatíveis com uma distribuição normal  $N(10, 25)$ , ao nível de significância de 5%.



# Teste $\chi^2$ de aderência

Exercício: Gols por Partida de um Time de Futebol

Um analista esportivo quer saber se o número de **gols por partida** marcados por um determinado time em uma temporada segue uma **distribuição de Poisson**, com média de  $\lambda = 1,5$  gols por jogo. Ele coleta os dados de **40 jogos** e registra a **frequência de gols por partida**:

Número de Gols	Frequência Observada
0	5
1	14
2	12
3	6
4	2
5 ou mais	1
Total	40

**Objetivo:** Testar, ao nível de 5% de significância, se a distribuição do número de gols por jogo segue uma **distribuição de Poisson** com  $\lambda = 1,5$ .

# Teste $\chi^2$ de Homogeneidade

# Teste $\chi^2$ de Homogeneidade

Objetivo: Comparar duas ou mais populações.

Suponha novamente que a v.a.  $X$  assume valores em  $s$  categorias, e deseja-se comparar a distribuição da v.a.  $X$  em  $r$  populações  $P_1, \dots, P_r$ , com base em amostras de cada população.

**Tabela:** Frequências observadas (O) nas amostras de cada população

População	$A_1$	$A_2$	$\dots$	$A_s$	Total
$P_1$	$O_{11}$	$O_{12}$	$\dots$	$O_{1s}$	$n_1$
$P_2$	$O_{21}$	$O_{22}$	$\dots$	$O_{2s}$	$n_2$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$P_r$	$O_{r1}$	$O_{r2}$	$\dots$	$O_{rs}$	$n_r$
Total	$n_1$	$n_2$	$\dots$	$n_s$	$n$

Neste caso, os valores esperados sob  $H_0$  para a população  $i$  na categoria  $A_j$  são dados por

$$E_{ij} = \frac{n_i \times n_j}{n}, \quad i = 1, 2, \dots, r; \quad j = 1, 2, \dots, s.$$

# Teste $\chi^2$ de Homogeneidade

---

- Estatística do Teste:

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^s \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}$$

- Distribuição sob  $H_0$ :  $\chi^2$  com  $(r - 1) \times (s - 1)$  graus de liberdade.
- Região Crítica: Rejeitar  $H_0$  se  $\chi_{obs}^2 > k$ , onde  $P(\chi_{(r-1)(s-1)}^2 > k) = \alpha$ .

# Teste $\chi^2$ de Homogeneidade

Exemplo: Uma prova básica de estatística foi aplicada a 100 alunos de Ciências Humanas e a 100 alunos de Biológicas. As notas foram classificadas segundo os graus A, B, C, D e E (onde D o aluno não recebe o crédito e E o aluno foi reprovado).

- **Objetivo:** Testar se as distribuições de notas são iguais entre alunos de Ciências Humanas e Biológicas.

**Tabela:** Resultados da prova

Aluno de	A	B	C	D	E	Total
C. Humanas	15	20	30	20	15	100
C. Biológicas	8	23	18	34	17	100
<b>Total</b>	23	43	48	54	32	200

Solução:

## 1. Definição das Hipóteses

- $H_0$  : As distribuições das notas são as mesmas para ambos os grupos (Humanas e Biológicas).
- $H_1$  : As distribuições diferem entre os grupos.

# Teste $\chi^2$ de Homogeneidade

2. Cálculo das Frequências Esperadas ( $E_{ij}$ ): Sob  $H_0$ , as frequências esperadas são calculadas por:

$$E_{ij} = \frac{(\text{Total da linha } i) \times (\text{Total da coluna } j)}{\text{Total geral}}$$

Exemplo para Célula (Humanas, A):

$$E_{11} = \frac{100 \times 23}{200} = 11.5$$

Tabela de Valores Esperados:

Aluno de	A	B	C	D	E
C. Humanas	11.5	21.5	24	27	16
C. Biológicas	11.5	21.5	24	27	16

# Teste $\chi^2$ de Homogeneidade

---

## 3. Cálculo da Estatística Qui-Quadrado $\chi^2$

$$\chi^2 = \sum \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}$$

### Cálculos Parciais:

- Humanas, A:  $\frac{(15-11.5)^2}{11.5} = 1.09$
- Biológicas, D:  $\frac{(34-27)^2}{27} = 1.81$

### Valor Total de $\chi^2$ :

$$\chi_{\text{obs}}^2 \approx 13.14 \quad (\text{soma de todas as contribuições})$$

## 4. Determinação da Região Crítica

- **Graus de Liberdade:**  $(r - 1)(c - 1) = (2 - 1)(5 - 1) = 4$
- **Valor Crítico ( $\alpha = 0.05$ ):**  $\chi_{4;0.05}^2 = 9.488$  (da tabela qui-quadrado).

# Teste $\chi^2$ de Homogeneidade

---

## 5. Decisão e Conclusão

- **Regra de Decisão:** Rejeitar  $H_0$  se  $\chi_{\text{obs}}^2 > 9.488$ .
- **Resultado:** Como  $13.14 > 9.488$ , **rejeitamos  $H_0$** .

6: **Conclusão:** Há evidências estatísticas ( $\alpha = 0.05$ ) de que as distribuições de notas diferem entre alunos de Ciências Humanas e Biológicas.



# Teste $\chi^2$ de Homogeneidade

Tabela de Resumo do Teste Qui-Quadrado de Homogeneidade

Categoria	Grupo	O <sub>ij</sub> (Observado)	E <sub>ij</sub> (Esperado)	(O <sub>ij</sub> - E <sub>ij</sub> ) <sup>2</sup> / E <sub>ij</sub>	Contribuição para $\chi^2$
A	Humanas	15	11.5	$\frac{(15-11.5)^2}{11.5} = 1.09$	1.09
A	Biológicas	8	11.5	$\frac{(8-11.5)^2}{11.5} = 1.07$	1.07
B	Humanas	20	21.5	$\frac{(20-21.5)^2}{21.5} = 0.10$	0.10
B	Biológicas	23	21.5	$\frac{(23-21.5)^2}{21.5} = 0.10$	0.10
C	Humanas	30	24	$\frac{(30-24)^2}{24} = 1.50$	1.50
C	Biológicas	18	24	$\frac{(18-24)^2}{24} = 1.50$	1.50
D	Humanas	20	27	$\frac{(20-27)^2}{27} = 1.81$	1.81
D	Biológicas	34	27	$\frac{(34-27)^2}{27} = 1.81$	1.81
E	Humanas	15	16	$\frac{(15-16)^2}{16} = 0.06$	0.06

Categoria	Grupo	O <sub>ij</sub> (Observado)	E <sub>ij</sub> (Esperado)	(O <sub>ij</sub> - E <sub>ij</sub> ) <sup>2</sup> / E <sub>ij</sub>	Contribuição para $\chi^2$
E	Biológicas	17	16	$\frac{(17-16)^2}{16} = 0.06$	0.06
Total		200	200	Soma	$\chi^2 = 13.14$

# Teste $\chi^2$ de Homogeneidade

Exercício: Preferência de Gêneros de Jogos entre Plataformas

Um estudo investigou se a preferência por gêneros de jogos eletrônicos é homogênea entre jogadores de PC e Console. Foram entrevistados 400 jogadores, e os resultados estão na tabela abaixo:

Plataforma	Ação	RPG	Estratégia	Esportes	Total
PC	60	80	70	30	240
Console	40	50	30	40	160
Total	100	130	100	70	400

**Objetivo:** Testar se a distribuição de preferências por gêneros é a mesma para jogadores de PC e Console ( $\alpha = 0.05$ ).

# Teste $\chi^2$ de Independência

# Teste $\chi^2$ de Independência

---

**Objetivo:** Verificar se duas v.a.'s qualitativas são independentes.

- Sejam  $X \in Y$  duas v.a.'s qualitativas com  $r$  e  $s$  categorias, respectivamente.
- Seja  $p_{ij}$  a probabilidade de um indivíduo ser classificado nas categorias  $i$  e  $j$  ( $i = 1, \dots, r$  e  $j = 1, \dots, s$ ) simultaneamente.
- Seja  $p_i = \sum_{j=1}^s p_{ij}$  a probabilidade marginal de um indivíduo ser classificado na categoria  $i$  da v.a.  $X$ , e  $p_j = \sum_{i=1}^r p_{ij}$  a probabilidade marginal de um indivíduo ser classificado na categoria  $j$  da v.a.  $Y$ .
- A hipótese de independência pode ser escrita como

$$H_0 : p_{ij} = p_i \times p_j, \text{ para todo par}(i, j),$$

e a hipótese alternativa  $H_1 : p_{ij} \neq p_i \times p_j$ , para algum par( $i, j$ ).

# Teste $\chi^2$ de Independência

---

- A estatística do teste é dada por

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^s \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}.$$

Novamente temos

$$E_{ij} = \frac{n_i \times n_j}{n}, \quad i = 1, 2, \dots, r \quad j = 1, 2, \dots, s,$$

e a regra de decisão consiste em rejeitar  $H_0$ , ao nível  $\alpha$ , se o valor da estatística for grande, ou seja, a região crítica do teste é dada por

$$RC = \{\chi_{obs}^2 > k\},$$

onde  $k$  é tal que  $P\{\chi_{(r-1) \times (s-1)}^2 > k\} = \alpha$ .

# Teste $\chi^2$ de Independência

---

**Exemplo:** Suponha que o grau de satisfação de consumidores de um produto está sendo estudado, em diferentes classes de renda familiar. Para uma amostra de 300 consumidores, obteve-se os resultados na Tabela. É possível afirmar que a renda influencia o grau de satisfação?

**Tabela:** Grau de satisfação e renda dos consumidores

Renda	Grau de satisfação		
	Insatisfeito	Satisfeito	Muito satisfeito
Faixa A	55	30	15
Faixa B	28	45	27
Faixa C	8	40	52

# Teste $\chi^2$ de Independência

---

Solução:

- **Passo 1: Definir as hipóteses**
  - $H_0$  (Hipótese nula): A renda e o grau de satisfação são independentes (não há relação).
  - $H_1$  (Hipótese alternativa): A renda e o grau de satisfação são dependentes (há relação).
- **Passo 2: Calcular as frequências esperadas ( $E_{ij}$ )**

A fórmula para calcular as frequências esperadas é:

$$E_{ij} = \frac{\text{Total da linha } i \times \text{Total da coluna } j}{\text{Total geral}}$$



# Teste $\chi^2$ de Independência

Aplicando aos dados da tabela de valores esperados:

Renda	Insatisfeito	Satisfeito	Muito satisfeito	Total
Faixa A	$\frac{100 \times 91}{300} = 30.33$	$\frac{100 \times 115}{300} = 38.33$	$\frac{100 \times 94}{300} = 31.33$	100
Faixa B	$\frac{100 \times 91}{300} = 30.33$	$\frac{100 \times 115}{300} = 38.33$	$\frac{100 \times 94}{300} = 31.33$	100
Faixa C	$\frac{100 \times 91}{300} = 30.33$	$\frac{100 \times 115}{300} = 38.33$	$\frac{100 \times 94}{300} = 31.33$	100
Total	91	115	94	300

- **Passo 3: Calcular a estatística qui-quadrado ( $\chi^2$ )**

A fórmula é:

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^s \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}$$

# Teste $\chi^2$ de Independência

Calculando para cada célula:

Célula ( $O_{ij}, E_{ij}$ )	Cálculo	Contribuição para $\chi^2$
(55, 30.33)	$\frac{(55-30.33)^2}{30.33}$	19.88
(30, 38.33)	$\frac{(30-38.33)^2}{38.33}$	1.81
(15, 31.33)	$\frac{(15-31.33)^2}{31.33}$	8.56
(28, 30.33)	$\frac{(28-30.33)^2}{30.33}$	0.18
(45, 38.33)	$\frac{(45-38.33)^2}{38.33}$	1.17
(27, 31.33)	$\frac{(27-31.33)^2}{31.33}$	0.60
(8, 30.33)	$\frac{(8-30.33)^2}{30.33}$	16.34
(40, 38.33)	$\frac{(40-38.33)^2}{38.33}$	0.07
(52, 31.33)	$\frac{(52-31.33)^2}{31.33}$	13.65

Célula ( $O_{ij}, E_{ij}$ )	Cálculo	Contribuição para $\chi^2$
—	—	62.26

# Teste $\chi^2$ de Independência

---

- **Passo 4:** Para uma tabela  $r \times s$ , os graus de liberdade são:  
 $gl = (r - 1) \times (s - 1) = (3 - 1) \times (3 - 1) = 4$ .
- **Passo 5:**
  - **Nível de significância ( $\alpha$ ):** Vamos adotar  $\alpha = 0.05$ .
  - **Valor crítico ( $\chi^2_{4;0.05}$ ):** Consultando a tabela qui-quadrado, encontramos **9.488**.

**Regra de decisão:**

- Se  $\chi^2_{\text{obs}} > \chi^2_{\text{crítico}}$ , rejeitamos  $H_0$ .

**Resposta final:** Rejeitamos  $H_0$ , concluindo que há evidências estatísticas para afirmar que **a renda influencia o grau de satisfação** dos consumidores, ao nível de 5% de significância..

# Teste $\chi^2$ de Independência

## Observações:

1. A Tabela de valores observados é denominada *Tabela de Contingência*  $r \times s$  ( $r$  linhas e  $s$  colunas);
2. No caso de tabelas  $2 \times 2$ , em que ocorrer algum valor esperado menor que 5, deve-se usar um outro teste de independência, denominado *Teste Exato de Fisher*;
3. Quando ocorrem valores esperados menores que 5, o teste  $\chi^2$  não apresenta bons resultados.

# Teste $\chi^2$ de Independência

Exercício: Influência do Gênero do Jogador na Preferência por Categorias de Jogos Eletrônicos

Uma empresa de jogos eletrônicos deseja investigar se o **gênero do jogador** está associado à **preferência por categorias de jogos**. Para isso, foi realizada uma pesquisa com **200 jogadores**, e os resultados estão na tabela abaixo:

Gênero	Ação/Aventura	Esportes	Estratégia	Total
Masculino	50	30	20	100
Feminino	20	40	40	100
Total	70	70	60	200

**Pergunta:** Com base nos dados, teste a hipótese de que **o gênero do jogador é independente da preferência por categoria de jogo** (use  $\alpha = 0.05$ ).