

EE5609: Matrix Theory

Assignment-10

M Pavan Manesh
EE20MTECH14017

Abstract—This document explains how to find the basis for the given vector space

Download all latex-tikz codes from

<https://github.com/pavanmanesh/EE5609/tree/master/Assignment10>

From (2.0.3) and (2.0.4),

$$\begin{aligned} (T^2 - I)(T - 3I) &= \begin{pmatrix} 8 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 9 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & -4 & 0 \\ 2 & 1 & -2 \end{pmatrix} \\ \Rightarrow (T^2 - I)(T - 3I) &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (2.0.5) \end{aligned}$$

1 PROBLEM

For the linear operator T

$$T \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3x_1 \\ x_1 - x_2 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 \end{pmatrix} \quad (1.0.1)$$

Prove that

$$(T^2 - I)(T - 3I) = 0 \quad (1.0.2)$$

2 SOLUTION

Expressing (1.0.1) in matrix form

$$T = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad (2.0.1)$$

Using (2.0.1), We can write that

$$\begin{aligned} T^2 &= \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \\ \Rightarrow T^2 &= \begin{pmatrix} 9 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 9 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (2.0.2) \end{aligned}$$

$$T^2 - I = \begin{pmatrix} 8 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 9 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (2.0.3)$$

$$T - 3I = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & -4 & 0 \\ 2 & 1 & -2 \end{pmatrix} \quad (2.0.4)$$