

Eksperyment — *sytuacja wysokiego ryzyka*

Pacjent zwykle unika sytuacji wyzwalających — i nigdy się nie przekonuje, że je przetrwa. Ten eksperyment daje pierwszy bezpieczny test.

CZAS: 1 sytuacja × 30–60 min Po 4 tyg. abstynencji

ŹRÓDŁO: Marlatt & Gordon (1985); Bennett-Levy i wsp. (2004)

JAK UŻYWAĆ

Eksperyment behawioralny dla osób w fazie utrzymania (po 4+ tygodniach abstynencji). Cel: **w kontrolowanych warunkach** wejść w sytuację, której do tej pory unikałeś/-aś, i sprawdzić, czy *na pewno* sięgnięcie jest jedynym możliwym rozwiązaniem. Karta prowadzi przez 4 etapy: A) wybór sytuacji, B) plan bezpieczeństwa, C) realizacja z notatkami, D) refleksja. **Nigdy bez wcześniejszego planu** i bez wiedzy terapeuty.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Marlatt i Gordon w modelu zapobiegania nawrotom (RP) zwrócili uwagę na **paradoks unikania**: pacjent, który stale unika sytuacji wyzwalających, nigdy nie zbuduje *poczucia kompetencji* w radzeniu sobie z nimi. Pierwszy nieplanowany kontakt (np. niespodziewana impreza) trafia w nieprzygotowany mózg — wysokie ryzyko nawrotu. Eksperyment w kontrolowanych warunkach daje **dowód własnej skuteczności** (ang. *self-efficacy*, Bandura 1977) — najlepszy predyktor utrzymania abstynencji w 12-miesięcznym badaniu kontrolnym (ang. *follow-up*) (Witkiewitz & Marlatt 2004).

01 ☉ A • Wybór sytuacji

Zacznij od **średnio trudnej** (5–7 na skali 10), *nie* najtrudniejszej. Stopniowo wspinasz się po drabinie ekspozycji. Wybierz **jedną** sytuację na ten eksperyment.

SYTUACJA, KTÓRĄ WYBIERAM

— konkret: gdzie, kiedy, z kim, jak długo

PRZEWIDYWANA TRUDNOŚĆ

— skala 0–10, najlepiej 5–7

Przykłady średnich: spotkanie rodzinne 2 h (alkohol na stole, ale nie centralny), kolacja w restauracji (gdzie inni piją), przejście koło baru w drodze do pracy, impreza w pracy 1 h. **UNIKAJ na początek:** bachelor / wesele / nieplanowana impreza znajomych, samotny wieczór po stresującym dniu.

02 📝 B • Plan bezpieczeństwa

Pięć elementów planu **przed** wejściem w sytuację. Bez planu — to nie eksperyment, tylko ekspozycja na nawrót.

1 • CZAS TRWANIA

— max 1 h na początku

2 • OSOBA TOWARZYSZĄCA

— ktoś, kto wie o eksperymencie

3 • SYGNAŁ WYJŚCIA

— gdy głód $\geq 7/10$, wychodzę

4 • PLAN PO

— co robię zaraz po wyjściu

03 C · W trakcie — mini-dziennik

Co 15 min (lub w trakcie najsilniejszego głodu) odnotuj. Możesz to robić w telefonie, w toalecie.
Każda chwila pomiaru = chwila uważności.

CZAS	GŁÓD 0–10	CO CZUJĘ / CO MYŚLĘ	CO ROBIĘ W TEJ CHWILI
Start			
+15 min			
+30 min			
+45 min			
Koniec			

04 D · Po — refleksja

CZY SIĘGNAŁEM/-AM?

— jeśli tak, to **NIE** jest porażka. Lapsus → karta „Plan awaryjny”

CO NAJBARDZIEJ MNIE ZASKOCZYŁO?

— jedna obserwacja

CO ZROBIĘ INACZEJ NASTĘPNYM RAZEM?

Klucz: Bandura (1977) wprowadził pojęcie *poczucia własnej skuteczności* (ang. *self-efficacy*) — wiary, że poradzę sobie w danej sytuacji. W metaanalizie Witkiewitz & Marlatt (2004) **poczucie skuteczności mierzone po 4 tygodniach abstynencji przewidywało utrzymanie po 12 miesiącach silniej niż ciężkość uzależnienia, motywacja czy jakość terapii**. Każdy ukończony eksperyment buduje tę kompetencję. Pierwszy wynik najtrudniejszy — kolejne są coraz łatwiejsze.