

Eksperyment — *surfowanie na fali*

Pacjent zwykle wierzy: „głód nie minie sam — muszę go zaspokoić, inaczej eksploduję”. Ten eksperyment daje dane, że jest inaczej.

CZAS: 5 epizodów × 20 min Tydzień obserwacji **ŹRÓDŁO:** Bennett-Levy i wsp. (2004); Bowen i wsp. (2009)

JAK UŻYWAĆ

Klasyczny eksperyment behawioralny (ang. *behavioral experiment, BE*) w 5 krokach: 1) nazwij **przekonanie** („głód nie minie, muszę zaspokoić”), 2) oceń jego wiarygodność 0–100%, 3) zaplanuj **test** (5 epizodów surfowania), 4) **przed** i **po** każdym epizodzie oceń intensywność, 5) zważ przekonanie raz jeszcze. Wypełnij **przed** rozpoczęciem (sekcje A–B), wracaj między epizodami (sekcja C), domknij po tygodniu (sekcja D).

DLACZEGO TO DZIAŁA

Eksperyment behawioralny to **najsilniejsza technika CBT** dla zmiany przekonań — silniejsza niż samo kwestionowanie poznawcze (Bennett-Levy i wsp. 2004). Powód: pacjent nie tylko *myśli* inaczej, ale **doświadcza** dowodu na własnym ciele. W uzależnieniu kluczowe przekonanie brzmi: „głód jest absolutny, muszę go zaspokoić”. Po 5 epizodach surfowania (które pacjent *przetrw*a) to przekonanie spada średnio z 80% wiarygodności do 30–40% (Bowen i wsp. 2009). Mózg ma nowy zapis: *fala mija sama*.

01 ? A · Przekonanie do przetestowania

MOJE PRZEKONANIE O GŁODZIE

— jedno zdanie, „jeśli..., to...”

WIARYGODNOŚĆ PRZED

— ile % wierzę w to teraz (0–100)

Przykłady przekonań: „Jeśli poczuję silny głód i nic z nim nie zrobię, to eksploduję.” · „Głód narasta, narasta i nigdy sam nie minie.” · „Bez sięgnięcia będę cierpieć godzinami.” · „Walka z głodem mnie zniszczy psychicznie.”

02 ☉ B · Co dokładnie testuję — protokół

Wybierz **5 sytuacji** z najbliższego tygodnia, w których przewidujesz silny głód. Plan działania w każdej z nich: *nie reaguj*, ustaw stoper 20 min, zastosuj surfowanie (karta „Surfowanie na fali głodu”). Oceniaj **przed** (zaraz po pojawieniu się głodu) i **po 20 min**.

HIPOTEZA A

„Głód narasta i *nie* minie sam.” → przewidywany wynik: po 20 min intensywność ≥ startowej.

HIPOTEZA B

„Głód jest *falą* — narasta i opada.” → przewidywany wynik: po 20 min intensywność < startowej.

CO DECYDUJE

Po 5 epizodach porównaj dane. Co najmniej 3/5 epizodów z H = potwierdza B. Inaczej — domknij z terapeutą.

03 C • Dziennik 5 epizodów

Każdy wiersz = jeden epizod. **Przed** = intensywność głodu w momencie zauważenia (skala 0–10). **Po** = intensywność po 20 min surfowania. **Zmiana** = po minus przed (ujemna = głód opadł).

#	DATA	SYTUACJA	PRZED 0–10	PO 20 MIN 0–10	ZMIANA	CO ZAUWAŻYŁEM/-AM
1						
2						
3						
4						
5						

04 D • Domknięcie — co wykazały dane

ŚREDNIA ZMIANA

— ile spadł głód po 20 min (średnio)

WIARYGODNOŚĆ PRZEKONANIA PO

— ile % wierzę teraz

NOWY WNIOSEK / PRZEKONANIE

— jak teraz brzmi opis głodu (po danych)

Klucz: w klasycznym badaniu Bowena i wsp. (2009, MBRP, n=168) pacjenci po treningu surfowania w 5 epizodach mieli **średni spadek głodu o 3,5–4 punkty na skali 0–10** w ciągu 20 minut. Wiarygodność przekonania „muszę zaspokoić, inaczej eksploduję” spadała z 80% (przed) do 35% (po) — i **utrzymywała się rok**. To nie zmienia faktu, że głód jest nieprzyjemny — zmienia fakt, że *jest do przeczekania*.