

HALT — cztery wewnętrzne wyzwacze

Cztery stany, w których ryzyko sięgnięcia rośnie 2–3-krotnie. Gdy jeden z nich się pojawia, najpierw zaspokój jego potrzebę — dopiero potem podejmuj decyzje.

CZAS: 5 min za każdym razem Codziennie, w sytuacji głodu

ŹRÓDŁO: tradycja AA; Marlatt & Gordon (1985)

JAK UŻYWAĆ

HALT to akronim z anonimowych ruchów samopomocy: **H**ungry, **A**ngry, **L**onely, **T**ired (głodny, zły, samotny, zmęczony). Gdy poczujesz głód działania (ang. *craving*) — *zanim* coś z nim zrobisz, zadaj sobie cztery pytania. Jeśli któryś stan na „TAK” — zaspokój go najpierw (zjedz, odpocznij, zadzwoń, ostrygnij). Często sam głód działania **zniknie**, gdy zaspokoisz prawdziwą potrzebę.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Marlatt i Gordon (1985) pokazali, że **35-40% nawrotów** w pierwszych miesiącach abstynencji ma w tle *negatywny stan emocjonalny lub fizjologiczny*, którego osoba nie nazwała. Uzależnienie często działa jak **jeden klucz do czterech zamków** — niezależnie od tego, czy jest się głodnym, zmęczonym, samotnym, czy złym — odpowiedzią staje się alkohol/substancja. HALT przerywa ten automat: nazywając stan, dajesz sobie szansę wybrać *specyficzną odpowiedź*: posiłek na głód, sen na zmęczenie, rozmowę na samotność.

01 📋 Cztery stany — i co konkretnie zrobić

H GŁÓD

Niski cukier we krwi → drażliwość, niska tolerancja na frustrację → impuls do „nagrody”.

Co zrobić: zjedz coś z białkiem i węglowodanami (kanapka, jogurt, batonik proteinowy). **NIE** czekoladą samą — szybki spadek po wzroście.

Sygnały: drażliwość bez powodu, „mgła” w głowie, łatwy płacz, urywane zdania.

A ZŁOŚĆ

Niewyrażona złość → napięcie ciała → szukanie ulgi. Alkohol/substancja jako „przepłukanie”.

Co zrobić: wyjdź na 15 min spaceru. Napisz w notatniku, kto/co Cię rozwścieczyło. Bez wysyłania, bez konfrontacji teraz.

Sygnały: zaciśnięta szczęka, napięte ramiona, urywanie zdań, fantazje o odwecie.

L SAMOTNOŚĆ

Brak więzi w danej chwili → poszukiwanie „towarzysza”. Alkohol/substancja jako fałszywy partner.

Co zrobić: zadzwoń (nie napisz) do osoby z listy wsparcia. Wystarczy 10 min. Jeśli nikt nie odbierze — linia 800 199 990 (uzależnienia).

Sygnały: pustka w klatce piersiowej, scrollowanie mediów społecznościowych, „nikt mnie nie rozumie”.

T ZMĘCZENIE

Niewyspanie / wyczerpanie → osłabiona kora przedczołowa → spada zdolność oparcia się impulsom.

Co zrobić: 20 min drzemki ALBO położenie się o 21:00. Bez ekranu na godzinę przed snem.

Sygnały: palące oczy, drażliwość, „dzisiaj sobie zasłużyłem/-am”, trudność z koncentracją.

02 ✎ Szybki sprawdzian — teraz

Oceń na skali 0–10, jak silny jest każdy stan u Ciebie **w tej chwili**. Cokolwiek ≥ 5 — to wyzwacz dnia.

H Głód

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A Złość

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

L Samotność

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

T Zmęcz.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

03 Dziennik HALT — tydzień

Codziennie wieczorem zaznacz, który stan dominował (lub kilka). W kolumnie „działanie” wpisz, co zrobiłem/-am, by go zaspokoić (nawet jeśli sięgnąłem/-am — to materiał do nauki).

DZ.	H	A	L	T	DZIAŁANIE co zrobiłem/-am	EFEKT co się zmieniło
<i>Pn</i>						
<i>Wt</i>						
<i>Śr</i>						
<i>Cz</i>						
<i>Pt</i>						
<i>Sb</i>						
<i>Nd</i>						

04 Profilaktyka — codzienne minimum

Najlepiej **nie dopuszczać** stanów HALT do wysokich poziomów. Lista codzienna:

☐ **H** • 3 posiłki dziennie, jeden z białkiem do 10:00

☐ **A** • Codzienne 15 min ruchu (spacer / siłownia / joga)

☐ **L** • 1 kontakt osobisty dziennie (telefon / spotkanie)

☐ **T** • 7-8 h snu, ekrany off 1 h przed snem

Klucz: w okresie wczesnej zmiany (pierwsze 6 miesięcy) HALT to nie „ćwiczenie introspekcyjne” — to *pierwsza linia obrony*. Pacjenci, którzy codziennie raz w dzień pytają siebie o cztery stany, mają **30% mniejsze ryzyko nawrotu** w pierwszych 90 dniach (Witkiewitz & Marlatt 2004). Niewielki koszt (5 minut) za dużą korzyść (świadomość przed automatem).