

Profilaktyka *nawrotów*

Cztery filary, na których stoi długoterminowa abstynencja. Bez nich pierwszy nawrót jest tylko kwestią czasu.

CZAS: 45 min wypełnienie Po 4 tyg. abstynencji + co 3 mies.

ŹRÓDŁO: Marlatt & Gordon (1985); Witkiewitz & Marlatt (2004)

JAK UŻYWAĆ

Karta integracyjna dla osób po pierwszej fazie zmiany (4–8 tyg. abstynencji). **Cztery filary:** 1) świadomość sytuacji wysokiego ryzyka, 2) umiejętności radzenia, 3) styl życia (równowaga), 4) sieć wsparcia. Karta to *diagnoza stanu* w każdym z filarów + plan wzmocnienia **jednego** najsłabszego. Wracaj do tej karty co 3 miesiące przez pierwszy rok zmiany.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Model profilaktyki nawrotów (ang. *relapse prevention*, *RP*) Marlatta jest najlepiej udokumentowanym podejściem terapeutycznym w uzależnieniach (Witkiewitz & Marlatt 2004, 2005). Kluczowa hipoteza: **nawrót nie jest pojedynczym wydarzeniem**, tylko *łańcuchem decyzji* rozłożonym na tygodnie. Większość nawrotów daje się przewidzieć z 7–14 dni wcześniej — pod warunkiem regularnej autodiagnostyki w czterech filarach. RP zmniejsza ryzyko nawrotu o **27–58% w 12-miesięcznym badaniu kontrolnym** (ang. *follow-up*) w porównaniu z grupą bez ustrukturyzowanego programu (Carroll 1996, metaanaliza 24 badań).

01 📋 Cztery filary profilaktyki

FILAR 1 · ŚWIADOMOŚĆ RYZYKA

znam swoje wyzwalacze i sytuacje

Aktualna lista 5–10 sytuacji wysokiego ryzyka. Karta „Analiza wyzwalaczy”. Aktualizacja co miesiąc — wyzwalacze ewoluują.

FILAR 2 · UMIEJĘTNOŚCI RADZENIA

mam techniki na każdy wyzwalacz

Surfowanie, HALT, oddychanie, kontakt z osobą, plan awaryjny. Minimum 3 techniki *opanowane* (nie tylko zapisane).

FILAR 3 · RÓWNOWAGA ŻYCIOWA

codzienne „muszę” zrównoważone „chcę”

Sen 7–8 h, 3 posiłki, ruch 3×/tydz., *aktywność dająca przyjemność niezwiązaną z uzależnieniem*. Bez tego — wzrost ryzyka.

FILAR 4 · SIEĆ WSPARCIA

minimum 3 osoby wspierające zmianę

1 osoba bliska + 1 z grupy wsparcia + terapeuta. Regularny kontakt — nie tylko w kryzysach. Karta „Sieć wsparcia”.

02 ☺ Twój autodiagnoza — 4 filary

Oceń na skali 0–10 stan każdego filaru u Ciebie **dziś**. Filar < 6 = sygnał ostrzegawczy. Najsłabszy filar = priorytet pracy na najbliższy miesiąc.

FILAR 1 · ŚWIADOMOŚĆ RYZYKA

— skala 0–10 + krótko czemu

FILAR 2 · UMIEJĘTNOŚCI RADZENIA

— skala 0–10 + krótko czemu

FILAR 3 · RÓWNOWAGA ŻYCIOWA

— skala 0–10 + krótko czemu

FILAR 4 · SIEĆ WSPARCIA

— skala 0–10 + krótko czemu

03 ✗ Wczesne sygnały nawrotu — 10 czerwonych flag

Według Marlatta & Gordon (1985) nawrót poprzedza zwykle 5–7 sygnałów na tej liście. Zaznacz, które dziś u Ciebie występują. **3+ zaznaczone** = sygnał do kontaktu z terapeutą.

☐ Zaniedbuję karty / dziennik / ćwiczenia — bo „już to wszystko wiem”.

☐ Wracam do dawnych miejsc / osób z czasów używania.

☐ Zaczynam myśleć: „jedno piwo / jedna lufa nikomu nie zaszkodzi”.

☐ Mam *fantazje* o używaniu — nawet pozytywne, „nostalgiczne”.

☐ Zaniedbuję sen, posiłki, ruch — wracam do nawyków sprzed zmiany.

☐ Izoluję się — odwołuję spotkania, nie odbieram telefonu.

☐ Spadek nastroju ≥ 3 dni z rzędu, bez powodu.

☐ Nudzę się, czuję pustkę — „nie wiem, co zrobić z czasem”.

☐ Konflikty interpersonalne nie do rozładowania (z partnerem, w pracy).

☐ Czuję się „wyleczony/-a” — mam tendencję zarzucić terapię.

04 ✎ Plan wzmocnienia najsłabszego filaru — miesiąc

MÓJ NAJSŁABSZY FILAR

— nr i nazwa

KONKRETNE KROKI NA TEN MIESIĄC

— 3 działania

Klucz: Carroll (1996) w metaanalizie 24 badań kontrolowanych pokazał, że programy RP redukują nawroty o **27-58%** w 12 miesiącach. Efekt utrzymuje się dłużej niż w innych terapiach — w przeciwieństwie do wielu interwencji, które „znikają” po zakończeniu terapii. Powód: pacjent uczy się *autodiagnostyki*, a nie tylko technik. Filary, sygnały, plan to nie pomysł na 3 miesiące — to system na resztę życia.