

Przeniesienie *nawyku po abstynencji*

Rzuciłeś alkohol — zacząłeś codziennie kupować lotto. Rzuciłeś palenie — przybrałeś 15 kg. Mózg uzależnia się od mechanizmu, nie tylko od substancji.

CZAS: 25 min wypełnienie Po 3+ mies. abstynencji

ŹRÓDŁO: Sussman & Black (2008); Olsen (2011); Blanco i wsp. (2012)

JAK UŻYWAĆ

Karta wprowadza pojęcie **przeniesienia nawyku** (ang. *cross-addiction*) — zjawiska, w którym osoba po skutecznej abstynencji od jednej substancji *rozwija nową* formę uzależnienia (innej substancji lub behawioralnego). Pokazuje: 1) **częstość**, 2) najczęstsze kierunki, 3) **mechanizm**, 4) jak rozpoznać, 5) jak przerwać *zanim* się utrwali.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Blanco i wsp. (2012, n=4 422, NESARC 3-letnia obserwacja): **30-35% osób** osiągających abstynencję od alkoholu rozwija w 3 lata *nową* formę uzależnienia — najczęściej nikotyna, hazard, jedzenie, kupowanie, pornografia. Sussman & Black (2008): osoba uzależniona ma trwale zmienioną gospodarkę dopaminergiczną. Sama abstynencja nie naprawia tego deficytu — nadal jest „*pustka motywacyjna*”, którą mózg próbuje wypełnić czymkolwiek dającym szybką nagrodę. Świadomość zjawiska + monitorowanie nowych nawyków = profilaktyka.

01 📋 Najczęstsze kierunki przeniesienia

Z CZEGO REZYGNUJE	NA CO NAJCZĘŚCIEJ PRZENOSI	CZĘSTOŚĆ (3-LETNIA OBSERWACJA)
Alkohol	Nikotyna, jedzenie kompulsywne (cukier), hazard, marihuana	25-35%
Opioidy	Alkohol, benzodiazepiny, marihuana, jedzenie	35-45%
Stymulanty	Alkohol, marihuana, kompulsywny seks/pornografia, gry	30-40%
Nikotyna	Jedzenie (przyrost masy), słodycze, kofeina	60-75%
Hazard	Alkohol, kupowanie kompulsywne, gry komputerowe, krypto	35-50%
Wszystkie	Pracoholizm, sportoholizm, „ <i>nadmierne robienie czegokolwiek</i> ”	15-25% (niedoceniane)

02 🧠 Mechanizm — dlaczego mózg szuka nowego

HIPOTEZA DOPAMINERGICZNA

Mózg uzależniony ma **obniżoną wrażliwość receptorów dopaminowych D2** (Volkow i wsp. 2009). Codzienne aktywności (jedzenie, rozmowa, ruch) nie dają wystarczającej stymulacji. Pustka motywacyjna popycha do szukania silniejszych nagród — każdej, która *działa szybko*.

HIPOTEZA REGULACYJNA

Substancja była **narzędziem regulacji emocji** — uciszała lęk, smutek, samotność. Po jej odstawieniu emocje nadal się pojawiają, a osoba nie ma jeszcze *nowych* sposobów ich regulacji. Sięga po *cokolwiek*, co daje podobny efekt znieczulający.

Wniosek terapeutyczny: **sama abstynencja nie wystarcza**. Konieczne jest aktywne budowanie *zdrowych źródeł nagrody* (CRA, hobby, relacje, ruch, twórczość) i *zdrowych sposobów regulacji* (mindfulness, DBT, terapia). Bez tego mózg sam wypełni próżnię — czymś, co rzadko będzie dobrym wyborem.

03 ✗ Sygnały ostrzegawcze — czy mam przeniesienie

☐ Nowa czynność, której od abstynencji robię *znacznie więcej* niż wcześniej.

☐ Czuję *głód* tej czynności w trudnych emocjonalnie momentach.

☐ Tracę kontrolę nad ilością / czasem („miało być 10 min, było 2 h”).

☐ Powtarzam mimo negatywnych konsekwencji (długi, kłótnie, zdrowie).

☐ Ukrywam przed bliskimi, ile czasu/pieniędzy na to wydaję.

☐ Próby ograniczenia kończą się drażliwością, niepokojem.

☐ Wzrost tolerancji — to, co kiedyś dawało satysfakcję, już nie wystarcza.

☐ Czuję się „*jak kiedyś z alkoholem/substancją*” — ten sam stan.

3+ zaznaczone = bardzo prawdopodobne przeniesienie nawyku. Czas reagować — najlepiej teraz, gdy nowy wzorec jeszcze nie utrwalony. Pierwsze miesiące to *krytyczne okno* interwencji.

04 ✎ Moja sytuacja + plan

CO SIĘ U MNIE ZMieniŁO OD ABSTYNENCJI

— *jakich czynności robię więcej*

CO KONKRETNIE CHCĘ MONITOROWAĆ

— *co, jak często, jak mierzę*

ZDROWE ŹRÓDŁA NAGRODY, KTÓRE BUDUJĘ

— *3 konkretne, długoterminowe*

CO OMÓWIĘ Z TERAPEUTĄ

— *jeśli rozpoznaję sygnały*

Klucz: Blanco i wsp. (2012) w badaniu NESARC (3-letnia obserwacja n=4 422) wykazali, że przeniesienie nawyku **nie jest porażką** w terapii — jest *oczekiwanym etapem* dla osób, które nie zbudowały zdrowych źródeł nagrody równoległe z odstawianiem substancji. Świadomość zjawiska zwiększa szansę wczesnego rozpoznania o **3x**. Praktyczna reguła: po 3 miesiącach abstynencji wykonaj „*audyt nowych nawyków*” — zauważ wszystko, co stało się *codzienne* od momentu odstawienia. Większość będzie zdrowa (siłownia, czytanie, gotowanie). Niektóre — ostrzegawcze. Im wcześniej zauważone, tym łatwiej skorygować.