

Ruch jest *lekiem*

Sesja 30-minutowa to ekwiwalent niskiej dawki stymulantu. Efekt utrzymuje się 1–2 godziny. Najsilniejsza interwencja nefarmakologiczna.

CZAS: 8 min czytania 20–30 min ruchu codziennie

ŹRÓDŁO: Ratey (2008, „Spark”); Cerrillo-Urbina i wsp. (2015, meta-analiza); Pontifex i wsp. (2013)

JAK UŻYWAĆ


Wprowadź **20–30 minut intensywnego ruchu** dziennie. „Intensywny” znaczy: trudno mówić pełnymi zdaniami. Najlepiej **rano** (efekt na cały dzień) lub **przed trudnym zadaniem** (efekt 1–2 godziny). Aerobik (bieg, rower, pływanie) silniejszy niż siłowy. Najsilniej działa **regularność**, nie intensywność jednorazowa.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Aktywność fizyczna jest jedną z **najsilniej** udokumentowanych interwencji nefarmakologicznych w ADHD. Ratey (2008, *Spark*): ruch zwiększa dopaminę i noradrenalinę — **dokładnie te neuroprzekaźniki**, na które działają stymulanty. Cerrillo-Urbina i wsp. (2015, meta-analiza): poprawa uwagi $d = 0,84$, hamowania $d = 0,56$, pamięci roboczej $d = 0,47$. Efekty **porównywalne z niską dawką leku**. Mechanizm: (1) natychmiastowy wzrost katecholamin (dopamina, noradrenalina); (2) długoterminowa **neuroplastyczność** — białko BDNF wspiera wzrost hipokampa i kory przedczołowej; (3) regulacja osi stresu; (4) poprawa snu.

01

Co dzieje się w mózgu



02

Cztery wymiary skutecznej dawki

1 · INTENSYWNOŚĆ

Tętno 70%+ maksymalnego (220 minus wiek, $\times 0,7$). Możesz rozmawiać, ale z wysiłkiem. „Spacer” pod sklep nie wystarczy — efekt katecholaminowy wymaga przyśpieszenia oddechu.

2 · CZAS TRWANIA

20–30 minut daje pełen efekt katecholaminowy. Poniżej 15 minut — efekt minimalny. Powyżej 45 minut — bez dodatkowej korzyści dla uwagi.

3 · CZĘSTOŚĆ

3–5 razy w tygodniu. Codziennie idealnie, ale 3× to próg, poniżej którego brak efektu kumulacyjnego (Ratey 2008). Dwa razy w tygodniu < brak.

4 · CZAS DNIA

Rano — efekt na cały dzień + reguluje rytm dobowy. **Lub przed trudnym zadaniem** — 20 min biegu, potem od razu do pracy, dopóki katecholaminy działają (1–2 godziny).

03 ◎ Aktywności sprawdzające się szczególnie w ADHD

SPORTY DRUŻYNOWE

Koszykówka, piłka nożna, siatkówka. **Aktywność + społeczność + zmienność** — idealne dla mózgu ADHD. Stała pora treningów dodaje rutynę.

SZTUKI WALKI

Karate, judo, brazylijskie jiu-jitsu, boks. **Dyscyplina + intensywność + uważność**. Pontifex i wsp. (2013): silne efekty na hamowanie reakcji.

BIEG + MUZYKA

Najprostsze i najtańsze. Słuchawki z energetyczną muzyką. Niska bariera wejścia — można zacząć dziś. **30 minut, 3× w tygodniu.**

TANIEC, JOGA Z DYNAMIKĄ

Vinyasa, ashtanga, taniec, zumba. **Zmienność rytmu + skupienie na ciele**. Dla osób, które mają problem z monotonią biegu.

Czego unikać: długiego, monotonnego cardio bez stymulacji (samotne wiostowanie 60 min na maszynie). Mózg ADHD szybko porzuca to, co nudne. Wybierz coś, co Cię *angażuje* — to ważniejsze niż „optymalna” forma ruchu.

04 ✎ Twój plan startowy — od jutra

WYBRANA AKTYWNOŚĆ

— jedna, której nie znienawidzę

STAŁA PORA

— godzina + dni tygodnia

WYZWALACZ W KALENDARZU

— alarm 15 min wcześniej

PIERWSZY MIKRO-KROK JUTRO

— np. „założyć buty”

Klucz: Cerrillo-Urbina i wsp. (2015): efekt jednorazowej sesji ruchu na uwagę to $d = 0,84$ — **porównywalny z dawką stymulanta**. Różnica: lek działa do popołudnia; sesja ruchu działa 1-2 godziny. Ale ruch ma jedno, czego lek nie ma — *kumulację długofalową* przez BDNF i neuroplastyczność. Mózg po 6 miesiącach regularnego ruchu **fizycznie się zmienia** (Ratey 2008): więcej połączeń w korze przedczołowej, większy hipokamp. To nie metafora — to obraz w rezonansie.