

Szyny zamiast decyzji

Każda decyzja zużywa dopaminę, której masz mało. Rutyna zamienia decyzję w automat.

CZAS: 15 min planu + 30-60 dni wdrożenia Jedna rutyna naraz

ŹRÓDŁO: Clear (2018, „Atomic Habits”); Fogg (2020, „Tiny Habits”); Lally i wsp. (2010); Safren i wsp. (2017)

JAK UŻYWAĆ

Wybierz **jedną** rutynę — poranną albo wieczorną. Zapisz **5-7 kroków** w stałej kolejności. Wydrukuj i przyklej w widocznym miejscu (lustro, lodówka). Powtarzaj **tę samą** sekwencję codziennie przez 6 tygodni. Dopiero potem dodaj drugą.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Funkcje wykonawcze w ADHD są ograniczone — każda decyzja („co teraz?”) zużywa **tę samą pulę** dopaminy, której potrzebujesz do trudnych zadań w ciągu dnia. Rutyna *omija* mechanizm decyzji: mózg jedzie po szynach. Lally i wsp. (2010, *European Journal of Social Psychology*): automatyzacja nawyku trwa średnio 66 dni (zakres 18-254). Dla ADHD — bliżej górnej granicy, ale jest możliwa. Clear (2018): łączenie nowego nawyku z istniejącym (*habit stacking*) skraca ten czas o ~30%.

01 Dwie kotwice dnia — poranek i wieczór

RUTYNA PORANNA

ustawia cały dzień

Przykład (5-7 kroków):

- 1 · Budzik — wstajesz od razu (Mel Robbins: 5-4-3-2-1)
- 2 · Toaleta, woda, mycie
- 3 · Lek ADHD (*po jedzeniu*)
- 4 · Śniadanie z białkiem
- 5 · Ubranie
- 6 · Klucze + portfel + telefon ze stałego miejsca
- 7 · Wyjście

RUTYNA WIECZORNA

przygotowuje jutro

Przykład (5-7 kroków):

- 1 · Kolacja + sprzątnięcie stołu
- 2 · Plan na jutro (3 zadania)
- 3 · Ubranie + plecak na jutro
- 4 · Higiena (zęby, prysznic)
- 5 · Telefon do ładowania w drugim pokoju
- 6 · Książka / podcast
- 7 · Spanie o stałej porze

02 Cztery zasady automatyzacji

1 · ABSURDALNIE MAŁY START

Fogg (2020): nie „30 min ćwiczeń” — **2 pompki**. Nie „medytacja 20 min” — **3 oddechy**. Małość chroni przed wymówką. Wzrost przychodzi sam, gdy nawyk się ugruntuje.

2 · ŁĄCZENIE Z ISTNIEJĄCYM

Clear (2018), *habit stacking*: „po umyciu zębów **wzmę lek**”. „Po włączeniu czajnika **zapiszę 3 zadania na dziś**”. Wyzwalacz musi być nieunikniony.

3 · TA SAMA SEKWENCJA

Powtarzalność = automatyzm. Nie zmieniaj porządku kroków przez 6 tygodni. **Nuda jest celem** — to znak, że nawyk staje się automatyczny.

4 · WIDOCZNA LISTA

Wydrukuj sekwencję A4 — przyklej na lustrze w łazience, na drzwiach, na lodówce. Mózg ADHD *nie zapamięta sekwencji* z głowy przez 2-3 tygodnie. **Sterowanie wzrokiem.**

03 Twoja pierwsza rutyna — zaplanuj 7 kroków

Wybierz **jedną** rutynę (poranną LUB wieczorną — nie obie). Zapisz dokładne kroki i godzinę startu. Pierwszy krok musi być *nieunikniony* (alarm, godzina) — to wyzwalacz.

WYBIERAM RUTYNĘ

— „poranna” lub „wieczorna”

GODZINA STARTU

— ta sama każdego dnia

1

2

3

4

5

6

7

04 Sześć tygodni — śledzenie automatyzacji

Codziennie zaznacz kółko, jeśli wykonałeś/-aś **całą** sekwencję. Brakujące = informacja, nie porażka. Po 6 tygodniach większość przypadków przechodzi w automat.

	<i>Pn</i>	<i>Wt</i>	<i>Śr</i>	<i>Cz</i>	<i>Pt</i>	<i>Sb</i>	<i>Nd</i>
Tydzień 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Tydzień 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Tydzień 3	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Tydzień 4	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Tydzień 5	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Tydzień 6	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Klucz: Rutyny to *szyny kolejowe* dla mózgu ADHD. Im więcej zachowań na szynach, tym mniej decyzji, tym więcej energii zostaje na to, co naprawdę ważne. Lally i wsp. (2010): średni czas automatyzacji nawyku to 66 dni — w ADHD bliżej 80–90 dni. Nie zniechęcaj się, jeśli po 3 tygodniach nadal wymaga to wysiłku. To **nie znaczy, że nie działa** — znaczy, że jeszcze nie skończyłeś/-aś.