

Ukryta *epidemia*

Kobiety z ADHD diagnozowane średnio 10 lat później niż mężczyźni. Nie dlatego, że mają rzadziej — dlatego, że mają inaczej.

CZAS: 10 min czytania Po podejrzeniu lub świeżej diagnozie

ŹRÓDŁO: Hinshaw i wsp. (2012, longitudinalne); Quinn i Madhoo (2014); Young i wsp. (2020)

JAK UŻYWAĆ

Naucz się rozpoznawać **kobietą prezentację** ADHD: dominuje typ nieuwagowy (marzycielski, „cicha”), internalizujący (lęk, depresja, perfekcjonizm), maskujący (kompensacja kosztem wyczerpania). Sprawdź **czerwone flagi** diagnostyczne i cykliczne nasilenie objawów w cyklu menstruacyjnym.

DLACZEGO TO DZIAŁA

ADHD u kobiet jest **systematycznie niedodiagnozowane** (Hinshaw, 2002). Częstość występowania jest praktycznie taka sama jak u mężczyzn (3–4%), ale diagnozowanych jest 3–4x rzadziej. Przyczyny: (1) stereotyp ADHD = „hiperaktywny chłopiec”; (2) kobiety częściej prezentują **typ nieuwagowy** bez widocznej hiperaktywności; (3) internalizacja — zamiast buntu, lęk i depresja; (4) **maskowanie** kosztem wyczerpania. Quinn i Madhoo (2014): wahania *estrogenu* (cykl, ciąża, menopauza) wpływają na objawy — niski estrogen = niska dopamina = nasilenie ADHD. Young i wsp. (2020): średni wiek diagnozy u kobiet 35–40 lat (mężczyźni 7–10).

01 ? Cztery powody, dlaczego kobiety są pomijane

1 · STEREOTYP CHŁOPCA

W kulturze ADHD = „hiperaktywny chłopiec”. Diagnostyczne kryteria oparte na męskiej prezentacji. **Dziewczynka „marzycielska” nie wpada w radar.**

2 · TYP NIEUWAGOWY

Brak widocznej hiperaktywności. Wewnętrzna „burza myśli”, ale spokojne ciało. **Nauczyciel/-ka nie zauważa** — dziecko nie przeszkadza.

3 · INTERNALIZACJA

Zamiast buntu — **lęk, depresja, zaburzenia odżywiania, perfekcjonizm**. Klinicysta widzi „depresję” — przepisuje leki — ADHD pozostaje niezauważone.

4 · MASKOWANIE

„Daję radę” za cenę pracy 2x dłuższej, perfekcjonizmu, list i alarmów wszędzie. **Funkcjonowanie maskuje deficyt** — aż do wypalenia w 30–40 latach.

02 ? Czerwone flagi diagnostyczne

„**Zawsze musiałam pracować 2x ciężiej**, żeby osiągnąć to, co inni osiągają normalnie”.

„**Uczyłam się na pamięć**, bo nie mogłam się skupić — i nikt się nie domyślił”.

„Jestem **zdezorganizowana mimo wysokiej inteligencji** — to wstyd, którego nikt nie rozumie”.


„**Tydzień przed miesiączką** nic nie idzie — myślałam, że to silny PMS”.

„Po urodzeniu dziecka **nie wróciłam do siebie** — wszystko stało się trudniejsze”.

„W **perimenopauzie** funkcjonowanie dramatycznie się pogorszyło — i nie wiem dlaczego”.

Trzy lub więcej „tak” + chroniczne wyczerpanie + diagnoza depresji/lęku w przeszłości = silna wskazówka do diagnostyki ADHD z uwzględnieniem **kobiecej specyfiki**.

03 Hormony a ADHD — cykl menstruacyjny



Quinn i Madhoo (2014): w fazie lutealnej (po owulacji) **estrogen spada** → dopamina spada → objawy ADHD **nasilają się**. Tydzień przed miesiączką może być najtrudniejszy. Strategie: większy bufor czasowy, mniej obciążenia w lutealnej fazie, świadome planowanie cyklu.

04 Specyficzne strategie dla kobiet z ADHD

ŚLEDZENIE CYKLU

Aplikacja do cyklu + aplikacja do objawów ADHD. Po 3 miesiącach widać wzorzec. **Większe terminy w fazie folikularnej**, mniej w lutealnej.

DYSKUSJA Z PSYCHIATRĄ

Niektóre kobiety odnoszą korzyść z **dostosowania dawki** leku w fazie lutealnej. Decyzja indywidualna z lekarzem — nie samodzielnie.

PERIMENOPAUZA

Po 40–45 r.ż. spadek estrogenów może **znacząco nasilić** objawy ADHD. Sygnał alarmowy: „*dawałam radę, teraz nie*”. Konsultacja z lekarzem.

GRUPY WSPARCIA

Społeczność kobiet z ADHD jest **znacząco inna** od mieszanej. Specyficzne tematy: cykl, macierzyństwo, maskowanie, perfekcjonizm.

Klucz: ADHD u kobiet to „*ukryta epidemia*” — Hinshaw i wsp. (2012, badanie długofalowe 20 lat): kobiety z ADHD niediagnozowanym w dzieciństwie mają **4-5x wyższe** ryzyko depresji, lęku, zaburzeń odżywiania i samouszkodzeń. Diagnoza w dorosłości — nawet po 40 — *realnie zmienia życie*. Quinn (2005): „*nigdy nie jest za późno na diagnozę ADHD — ulga, którą daje, ma własną wartość, niezależnie od wieku*”. Jeśli rozpoznajesz siebie w tej karcie — zgłoś się do psychiatry/teki znajomego/-ej specyfiki kobiecą.