

Emocje są częścią ADHD

Wybuchy frustracji, ekstremalna reakcja na krytykę, nuda jak ból. To nie dodatek do ADHD — to rdzeń.

CZAS: 15 min czytania Toolkit dzienny

ŹRÓDŁO: Barkley (2015); Dodson (2016, koncepcja RSD); Faraone i wsp. (2019); Linehan (1993, DBT)

JAK UŻYWAĆ

Gdy emocja narasta: **STOP** (pauza 5–90 sekund), **NAZWIJ** („to jest frustracja”), **SPRAWDŹ FAKTY** (czy intensywność odpowiada sytuacji?), w razie potrzeby **PRZECIWNE DZIAŁANIE**. Długoterminowo: dbaj o sen, ruch i regularne posiłki — fizyczne braki **zwielokrotniają** reaktywność emocjonalną.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Russell Barkley (2015) wprowadził pojęcie *deficytu emocjonalnej samoregulacji* (ang. *deficient emotional self-regulation*, DESR) — emocje w ADHD są **szybsze, silniejsze i dłużej wracają do równowagi**. To nie nadwrażliwość ani BPD — to neurobiologia tych samych obwodów, które kontrolują uwagę. William Dodson opisał *wrażliwość na odrzucenie* (ang. *rejection sensitive dysphoria*, RSD): ekstremalna reakcja na realne lub *postrzegane* odrzucenie. Techniki DBT (Linehan 1993) są **kompatybilne** z ADHD i dają redukcję objawów $d = 0,5-0,7$.

TERAZ Średnia intensywność wybuchów emocjonalnych w ostatnim tygodniu.

Reaktywność *spokój* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

wybuchy

01 {} Dwa pojęcia, które warto znać

DESR — DEFICYT REGULACJI EMOCJI

ang. *deficient emotional self-regulation*

Barkley (2010, 2015): trzy cechy emocji w ADHD —

- **szybsza** reakcja (krótszy „bezpiecznik”)
- **silniejsza** intensywność (małe rzeczy → duża reakcja)
- **dłuższy** powrót do równowagi (godziny zamiast minut)

RSD — WRAŻLIWOŚĆ NA ODRZUCENIE

ang. *rejection sensitive dysphoria*

Dodson (2016, koncepcja kliniczna): ekstremalna reakcja na **realne lub postrzegane** odrzucenie. Sygnały:

- krótka, nieostra wiadomość → katastrofa
- krytyka → atak na całą tożsamość
- unikanie sytuacji, gdzie można być ocenionym/-ą

02 ☉ Cztery kroki — gdy emocja narasta

KROK 1 · STOP

Fizycznie się zatrzymaj. Ręka stop, krok wstecz, głęboki wdech. **5 sekund** w łagodnej sytuacji, **90 sekund** przy silnej fali (tyle trwa szczyt fali neurochemicznej — Jill Bolte Taylor, neuroanatom). Nic nie mów, nic nie pisz.

KROK 2 · NAZWIJ

„To jest *frustracja*”. „To jest *wstyd*”. „To jest *poczucie odrzucenia*”. Nazwanie emocji obniża aktywność ciała migdałowatego (Lieberman i wsp., 2007, *fMRI*). Możesz się **uspokaja, gdy nazwie**.

KROK 3 · SPRAWDŹ FAKTY

DBT — *check the facts*. Pytania: Czy emocja pasuje do sytuacji? Czy intensywność jest **proporcjonalna**? Czy mam *dowody* na moje wnioski, czy interpretuję neutralne zachowanie?

KROK 4 · PRZECIWNE DZIAŁANIE

DBT — *opposite action*. Frustracja mówi „rzuć to” → zrób 1 min przerwy i **wrót**. RSD mówi „odpisz ostro” → odłóż na 2 godziny. Wstyd mówi „ukryj się” → zadzwoń do kogoś bliskiego.

03 PLEASE — fundament biologiczny (DBT)

Linehan (1993): zaniedbane ciało **zwielokrotnia** reaktywność emocjonalną. Trzy fundamenty, bez których techniki słabiej działają.

SEN

7–9 godzin, stała pora

Niedobór snu < 6 h: reaktywność emocjonalna rośnie o **60%** (Walker, 2017). ADHD często ma opóźnioną fazę snu — wymaga dyscypliny godzin.

RUCH

30 min/dziennie, intensywnie

Ruch aerobowy podnosi dopaminę i noradrenalinę — te same neuroprzekaźniki, na które działają leki ADHD (Ratey, 2008). Bieg, rower, taniec.

JEDZENIE

regularnie, z białkiem

ADHD często zapomina o posiłkach — spadek glukozy < 70 mg/dl wzmacnia drażliwość. Białko stabilizuje. Wodę pij nawet, gdy nie chce się Tobie.

04 Twoje wyzwacze emocjonalne

Wypisz 3 sytuacje z ostatniego tygodnia, gdzie emocja była nieproporcjonalna (DESR) lub gdzie poczułeś/-aś silne odrzucenie (RSD). Dla każdej zaplanuj jedno z czterech narzędzi.

1

SYTUACJA

EMOCJA + INTENSYWNOŚĆ /10

NARZĘDZIE, KTÓREGO UŻYJĘ NASTĘPNYM RAZEM (STOP / NAZWIJ / FAKTY / PRZECIWNE DZIAŁANIE)

2

SYTUACJA

EMOCJA + INTENSYWNOŚĆ /10

NARZĘDZIE, KTÓREGO UŻYJĘ NASTĘPNYM RAZEM (STOP / NAZWIJ / FAKTY / PRZECIWNE DZIAŁANIE)

3

SYTUACJA

EMOCJA + INTENSYWNOŚĆ /10

NARZĘDZIE, KTÓREGO UŻYJĘ NASTĘPNYM RAZEM (STOP / NAZWIJ / FAKTY / PRZECIWNE DZIAŁANIE)

Klucz: Dysregulacja emocji w ADHD to *nie* zaburzenie osobowości z pogranicza — choć wygląda podobnie. Różnica: w ADHD emocje są **reaktywne** (szybki wyzwalacz → silna reakcja → szybsze wygaszenie), w zaburzeniu z pogranicza — intensywne i długotrwałe powiązane z lękiem przed porzuceniem. Te same techniki (STOP, sprawdź fakty, przeciwne działanie) pomagają w obu, ale wymagają innej konceptualizacji. Faraone i wsp. (2019, *World Federation of ADHD*): dysregulacja emocji jest **integralna** dla ADHD u 40–70% dorosłych.

PO 2 TYG.

Po dwóch tygodniach stosowania STOP + NAZWIJ przy emocjach.

Reaktywność spokoj 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

wybuchy