

Ślepotą *czasowa*

„Wyjeżdżam za 5 minut” = 20 minut. „Zadanie zajmie godzinę” = 3 godziny. To neurobiologia, nie niepunktualność.

CZAS: 10 min czytania Strategie codzienne

ŹRÓDŁO: Barkley (1997, 2015); Toplak i wsp. (2006); Safren i wsp. (2017)

JAK UŻYWAĆ

Trzy rzeczy **od dziś**: (1) *widoczny zegar* przy biurku i w kuchni — analogowy, nie cyfrowy; (2) **mnoż przez 2** każdą swoją estymację czasu zadania; (3) **alarmy wyjścia** — 30 min, 15 min, 5 min przed wyjściem z domu. Nie „za chwilę”. Nie „zaraz”. Konkretna godzina + alarm.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Ślepotą czasowa (ang. *time blindness*) to neurobiologiczny **deficyt percepcji upływu czasu** opisany przez Russella Barkleya (1997). Toplak i wsp. (2006, *Brain and Cognition*): osoby z ADHD **systematycznie** źle oceniają czas — przeszacowują krótkie odcinki (5 min = „prawie nic”) i niedoszacowują długich (2 tygodnie = „masa czasu”). To nie kwestia charakteru. *Kora przedczołowa* w ADHD słabiej koduje upływ sekund i minut. Lekarstwo: **zewnętrzny zegar** — jak biała laska dla osoby niewidomej.

01 ⌚ Trzy objawy — rozpoznaj swoje

1 • CHRONICZNE SPÓŹNIENIA

5 min = 20 min

„Już idę”. „Zaraz wychodzę”. Mówisz to szczerze — i przychodzisz pół godziny później. Mózg nie czuje, że minęło 25 minut. Spóźnienia chroniczne, nie wybór.

2 • NIEDOSZACOWANIE ZADAŃ

1h = 3h

„To zajmie 30 min” — siedzisz 2 godziny i nie skończyłeś/-aś. Plan dnia zawsze przepełniony, bo szacowanie czasu rozbija się o realność. Codzienne wieczorne rozczarowanie.

3 • BRAK PILNOŚCI

2 tyg. = „kiedyś”

„Termin za 2 tygodnie” — masa czasu. Mózg nie odróżnia „2 tyg.” od „kiedyś”. Pilność włącza się dopiero *dzień wcześniej* (lub w dniu samym) — wtedy panika.

02 💡 Sześć technik wyprowadzania czasu na zewnątrz

1 • ZEGARY ANALOGOWE

W **każdym pokoju**, gdzie spędzasz czas. Analogowy (nie cyfrowy) — *wskazówki wizualizują upływ*. Mózg ADHD czyta ruch wskazówek lepiej niż liczby.

2 • TIME TIMER

Fizyczny timer pokazujący **czerwony obszar** zmniejszający się z czasem. Bestseller w społeczności ADHD. Widzisz, ile *zostało*, nie ile *minęło*.

3 • REGUŁA ×2

Ile *myślisz*, że zadanie zajmie? Pomnóż przez 2. To bliższe prawdzie. Po miesiącu sprawdź: czy mnożnik to 1,5, czy 2,5 dla Ciebie.

4 • ALARMY 30/15/5

Przed wyjściem: alarm **30 min, 15 min, 5 min** wcześniej. Trzy alarmy, nie jeden. Pierwszy = „zaczynaj”, drugi = „kończ co robisz”, trzeci = „wyjdź teraz”.

5 • PLANOWANIE WSTECZ

Spotkanie o 9:00? Dojazd 30 min = wyjście 8:30 → przygotowanie 45 min = start 7:45 → budzik 7:15. **Zapisz każdy krok** z godziną.

6 • BUFOR 15 MINUT

Dodaj 15 min do **każdego** planu. Wynika z deficytu — nie z lenistwa. Czas zgodny z rzeczywistością, nie z fantazją.

03 Eksperyment — kalibracja Twoich estymacji

Przez tydzień: zapisz, ile *myślisz*, że zadanie zajmie. Potem zmierz, ile faktycznie trwało. Po 7 zadaniach poznasz swój **osobisty mnożnik** (zwykle 1,7–2,5×).

DZ.	ZADANIE	OSZACOWANIE <i>min</i>	REALNY CZAS <i>min</i>	MNOŻNIK <i>realny / szac.</i>
<i>Pn</i>				
<i>Wt</i>				
<i>Śr</i>				
<i>Cz</i>				
<i>Pt</i>				
<i>Sb</i>				
<i>Nd</i>				

MÓJ OSOBISTY MNOŻNIK (ŚREDNIA Z 7 DNI)

— używam go odtąd przy planowaniu

04 Plan wsteczny — wzór do skopiowania

Zaplanuj jedno najbliższe spotkanie/wydarzenie metodą wsteczną. Wpisz godziny każdego kroku — zacznij od końca.

Godzina wydarzenia

– dojazd (min)

= godzina wyjścia

– przygotowanie (min)

= godzina startu rutyny

= godzina budzika

Klucz: „Nie umiem zarządzać czasem” — tak. Bo ADHD zaburza wewnętrzny zegar. Ale można **kompensować** zewnętrznymi zegarami i systemami — tak jak osoba niewidoma kompensuje białą laską. To nie jest słabość — to *realistyczne dostosowanie do biologii*. Toplak i wsp. (2006): zewnętrzne wskazówki czasowe niwelują 70% różnic w percepcji czasu między ADHD a grupą kontrolną.