

Brak *bezpiecznej dawki*

FAS i FASD są w 100% zapobiegalne. Ten arkusz wyjaśnia, dlaczego nawet pojedynczy kieliszek niesie ryzyko — i jak wesprzeć (siebie lub bliską osobę) w abstinencji w czasie ciąży.

CZAS: 12 min Psychoedukacja prenatalna

ŹRÓDŁO: May i wsp. (2018); AAP (2000); WHO; Hoyme i wsp. (2016)

JAK UŻYWAĆ

Przejrzyj **fakty** o wpływie alkoholu na rozwój dziecka (sekcja 01) i o przesiewowym kwestionariuszu *T-ACE* (sekcja 02). Sekcja 03 zawiera krótki **plan abstinencji w ciąży** — możesz wypełnić sama, z partnerem lub z lekarzem prowadzącym. Jeśli pijesz aktualnie i jesteś w ciąży, **nie odstawiaj nagle bez konsultacji medycznej** — przy ciężkim picu istnieje ryzyko poronienia w odstawieniu.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Alkohol przechodzi przez łożysko **bezpośrednio** do krwi dziecka — płód osiąga to samo stężenie co matka, ale jego niedojrzała wątroba nie potrafi go metabolizować. *FASD* (ang. *Fetal Alcohol Spectrum Disorders*, spektrum poalkoholowych zaburzeń rozwojowych) występuje u **1-5% dzieci** w populacji ogólnej (May, 2018) i jest najczęstszą zapobiegalną przyczyną niepełnosprawności intelektualnej. *AAP*, *NICE* i *WHO* są zgodne: **nie istnieje bezpieczna dawka** alkoholu w ciąży. Zasada „jeśli nie jesteś pewna — nie pij” obejmuje również okres planowania ciąży.

01 Co alkohol robi w ciąży — krótko i konkretnie

PRZEJŚCIE PRZEZ ŁOŻYSKO

Alkohol w krwi matki **w ciągu kilkunastu minut** osiąga to samo stężenie u dziecka. Wątroba płodu jest niedojrzała — alkohol pozostaje w jego krwi dłużej niż u matki.

PIERWSZY TRYMESTR

Najbardziej wrażliwy okres — rozwija się **cewa nerwowa, twarz, narządy**. To często moment, gdy kobieta jeszcze nie wie o ciąży. Dlatego picie ryzykowne przy planowaniu ciąży to także problem.

DRUGI I TRZECI TRYMESTR

Rozwija się przede wszystkim **mózg** — przez całą ciążę. Alkohol w późnej ciąży nie powoduje już dysmorfii twarzy, ale uszkadza neuronalne połączenia. Stąd cięższe postaci *FASD*.

SPEKTRUM FASD

Pełny *FAS* — dysmorfie twarzy + zaburzenia wzrostu + uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego. Lżejsze postaci: *ARND* (zaburzenia neurorozwojowe), *ARBD* (wady wrodzone). Wszystkie są trwałe.

Mit „lampka czerwonego wina”: żadne badanie nie wykazało, by którakolwiek dawka alkoholu w ciąży była dowiedziono bezpieczna. Nawet jednorazowe *binge* (≥ 4 drinki) w pierwszym trymestrze koreluje ze wzrostem ryzyka *FASD*. **NIE WIEMY**, jaki próg jest bezpieczny dla danej kobiety, danej genetyki, danego płodu — dlatego rekomendacja zerowa.

02 T-ACE — czteropytaniowy przesiew dla ciężarnych

Jedyny kwestionariusz walidowany specjalnie dla ciąży (Sokol, 1989). Cztery krótkie pytania, ≥ 2 punkty = wynik dodatni → wskazana pogłębiona rozmowa. Zaznacz **uczciwie** — to narzędzie ochrony Twojego dziecka, nie ocena.

T Tolerancja — ile drinków potrzebujesz, by poczuć efekt? ≥ 3 drinki = 2 pkt ☐

A Annoyed — czy denerwują Cię uwagi bliskich o Twoim piciu? Tak = 1 pkt ☐

C Cut down — czy myślisz, że powinnaś pić mniej? Tak = 1 pkt ☐

E Eye-opener — czy zdarza Ci się pić zaraz po przebudzeniu? Tak = 1 pkt ☐

Wynik ≥ 2 punkty oznacza wskazanie do rozmowy z położną lub lekarzem prowadzącym ciążę. Nie czekaj na kolejną wizytę — zgłoś przy najbliższej okazji.

03 Plan abstynencji w ciąży

Każdy dzień bez alkoholu od teraz to dzień ochrony dla dziecka — niezależnie od tego, co było wcześniej. Plan jest mocniejszy, gdy **angażuje partnera** i osobę zaufaną. Wypełnij razem.

SYTUACJE, W KTÓRYCH WCZEŚNIEJ NAJCZĘŚCIEJ PIŁAM

— miejsce, godzina, kontekst

CO ZASTĘPUJĘ W TYCH SYTUACJACH

— alkohol bezalkoholowy, woda, herbata, wyjście

CO PARTNER/I-KA KONKRETNIE ZROBI

— np. nie pije razem ze mną, nie trzyma alkoholu w domu, wesprze w sytuacjach społecznych

OSOBA ZAUFANA, DO KTÓREJ ZADZWONIĘ W TRUDNYM MOMENCIE

MÓJ LEKARZ PROWADZĄCY CIĄŻĘ

— imię, telefon

Klucz: Jeśli pijesz aktualnie i jesteś w ciąży — *najważniejszy jest moment, w którym jesteś teraz, nie ten, który już minął*. Hoyme i wsp. (2016): zatrzymanie picia **na każdym etapie ciąży** redukuje ryzyko i ciężkość FASD. Przy ciężkim, codziennym piciu konsultuj odstawienie z lekarzem — nagły detoks bez nadzoru niesie ryzyko dla matki i dziecka. *FAS jest w 100% zapobiegalny* — to jedna z nielicznych rzeczy w medycynie, gdzie pełna ochrona jest w pełni w zasięgu działania.