

Plan awaryjny

Jeden drink może uruchomić cały dawny wzorzec. To nie kwestia słabej woli — to neurobiologia. Plan na ten moment przygotowujesz teraz, zanim sytuacja się pojawi.

CZAS: 20 min Profilaktyka — przed sytuacją ryzyka

ŹRÓDŁO: Marlatt & Gordon (1985); Witkiewitz & Marlatt (2004)

JAK UŻYWAĆ

Przeczytaj wyjaśnienie **efektu prymowania** i **efektu naruszenia abstynencji** (sekcje 01-02). Następnie wypełnij swój **osobisty plan awaryjny** w sekcji 04 — trzy numery telefonów, lista pozornie nieistotnych decyzji, lista technik na *fala głodu*. Plan trzymaj *w portfelu lub w telefonie* — do użycia w momencie, gdy „pomyślisz, że jeden drink nic nie zmieni”.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Marlatt & Gordon (1985), klasyk profilaktyki nawrotów: większość nawrotów wydarza się w 3 miesiącach po rozpoczęciu abstynencji, w sytuacjach **negatywnych stanów emocjonalnych, konfliktu interpersonalnego lub presji społecznej**. Mechanizm: jeden drink aktywuje dopaminę w jądrze półleżącym (NAcc) — ten sam obwód, który kiedyś nagradzał picie. Plan przygotowany wcześniej skraca okno reakcji z minut do sekund. **NNT** dla profilaktyki nawrotów z planem ≈ 5 (Witkiewitz, 2013).

01 Efekt prymowania — dlaczego „jeden drink” to nie opcja

U osoby z ciężkim AUD pierwsza dawka alkoholu po dłuższej przerwie **uruchamia całą starą sekwencję**: 1 → 2 → 6 → butelka → ciąg. Mózg, który tysiące razy łączył alkohol z nagrodą, reaguje wzmocnionym wyrzutem dopaminy w jądrze półleżącym. To **efekt prymowania** (ang. *priming effect*) — udokumentowany przez De Wita (1996). To nie słabość charakteru, tylko trwała zmiana neurobiologiczna. Stąd: dla ciężkiego AUD *kontrolowane picie* zwykle jest nieosiągalne.

02 Efekt naruszenia abstynencji — pułapka myślowa po potknięciu

Gdy mimo planów wypijesz jeden drink, pojawia się klasyczna myśl: „Skoro już złamałem/-am abstynencję, to wszystko stracone — mogę pić dalej.” To jest **AVE** (ang. *Abstinence Violation Effect*, *efekt naruszenia abstynencji*) opisany przez Marlatta. To **fałsz poznawczy**, nie fakt. Nawrót jest *procesem*, nie *zdarzeniem* — w każdym punkcie tego procesu masz wybór.

STARA MYŚL AVE

„Wypiłem/-am jeden drink. Wszystko stracone. Cały miesiąc na nic. Mogę pić do końca.”

NOWA MYŚL RP

„To **potknięcie**, nie nawrót. Mój mózg jest po miesiącu trzeźwości lepszy niż wcześniej. Co zrobię teraz — decyduje o wszystkim.”

03 Pozornie nieistotne decyzje — łańcuch przed napiciem

Nawrót zaczyna się długo przed pierwszym kieliszkiem. Klasyczny łańcuch *Marlatta*: drobna decyzja → kontekst ryzyka → racjonalizacja → picie. **Punkt zawracania** jest najsilniejszy między krokiem 1 a 2 — im wcześniej, tym mniej energii kosztuje powiedzenie „nie”.

1

Drobna decyzja

„Pójdę na imprezę, ale nie wypiję.”

→

2

Kontekst ryzyka

„Wszyscy piją, ja z wodą wyglądam dziwnie.”

→

3

Racjonalizacja

„Jeden kieliszek to nie picie.”

→

4

Picie

„Skoro piję, drugi nie zaszkodzi.”

04 Mój plan awaryjny

Wypełnij *teraz*, w spokoju. Wytnij stronę lub sfotografuj — trzymaj zawsze pod ręką (portfel, ekran blokady telefonu, kuchnia). W momencie głodu nie będziesz w stanie myśleć jasno — plan ma być pod ręką, nie do przygotowywania na bieżąco.

TELEFON 1

— *terapeuta lub sponsor*

TELEFON 2

— *bliska osoba*

TELEFON 3

— *infolinia kryzysowa*

TRZY SYTUACJE, W KTÓRYCH JEST MI NAJTRUDNIEJ

— *miejsce, godzina, osoba*

TRZY RZECZY, KTÓRE ZROBIĘ W PIERWSZYCH 30 MINUTACH GŁODU

— *np. wyjdę na spacer, zadzwonię, wezmę prysznic*

CO POWIEM SOBIE, JEŚLI WYPIJĘ JEDEN DRINK

— *odpowiedź na AVE własnymi słowami*

05 HALT + fala głodu — szybkie techniki w momencie kryzysu

HALT — SPRAWDŹ PODSTAWY

Głód to często sygnał czegoś innego. Zapytaj się:
czy jestem **Hungry** (głodny/-a)? **Angry** (zły/zła)?
Lonely (samotny/-a)? **Tired** (zmęczony/-a)?
Zaadresuj *najpierw* potrzebę pod spodem.

SURFOWANIE NA FALI

Głód alkoholu działa jak *fala*: wznosi się, kulminuje (5–15 min), opada. Nie próbuj jej zatrzymać — **obserwuj ją**, jakbyś patrzył/-a na falę morską. Większość fal opada w ciągu 30 minut.

Klucz: Potknięcie *nie niszczy* dotychczasowych postępów. Każdy dzień trzeźwości realnie zmienia Twój mózg — gęstość receptorów dopaminy, odbudowa kory przedczołowej, obniżenie pobudzenia HPA. Nawrót cofa o krok, **nie na start**. Marlatt & Gordon (1985): osoby, które po pierwszym potknięciu sięgają po plan awaryjny, w 67% przypadków utrzymują abstynencję długoterminowo — wobec 25% u osób bez planu.