

Twój wzorzec

Sama ilość alkoholu w tygodniu nie mówi wszystkiego. Wzorzec — czyli kiedy, ile za jednym razem, sam/-a czy w towarzystwie — pokazuje, gdzie naprawdę leży ryzyko.

CZAS: 10 min 7 dni obserwacji **ŹRÓDŁO:** NIAAA (2004); WHO (2018); Benton (2009)

JAK UŻYWAĆ

Przejrzyj **cztery wzorce picia** w sekcji 01. Zaznacz ten, który najbardziej Cię opisuje (możesz wybrać więcej niż jeden). Następnie przez **tydzień** wypełniaj prosty dziennik z sekcji 03 — codziennie wpisuj, ile drinków standardowych wypieś/-am. Po 7 dniach policz sumę i porównaj z dawkami referencyjnymi WHO.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Klinicysta, który pyta tylko „ile pijesz w tygodniu”, przeoczy bingera (rzadko, ale za dużo na raz) oraz osobę z *high-functioning AUD* (pije dużo, ale „wszystko działa”). Każdy wzorzec ma **inne ryzyka i inną interwencję**. Bingerzy ryzykują wypadki, zatrucia i przemoc. Codzienne picie buduje zależność fizyczną. *High-functioning* opóźnia rozpoznanie o lata (Benton, 2009).

01 Cztery wzorce picia — zaznacz, co Cię opisuje

BINGE — PICIE CIĄGOWE ☐

≥5 drinków (M) / ≥4 (K) w 2 godziny

Rzadko, ale dużo. Często weekendowo lub okolicznościowo. Główne ryzyka: **wypadki, zatrucie alkoholowe, przemoc, ryzykowne kontakty seksualne**. W Polsce — najczęstszy wzorzec wśród młodych dorosłych.

CODZIENNE ☐

„nigdy się nie upijam, ale piję każdego dnia”

Regularnie, mniejsze ilości, narastająco. Klasyczne: piwo do obiadu, lampka wina wieczorem. Najpodstępniejszy wzorzec — **buduje zależność fizyczną**, ale długo nie wygląda na problem.

WEEKENDOWE ☐

„tylko w piątki i soboty”

Dwa do trzech dni intensywnie, reszta tygodnia bez. Eskalacja ilości typowa — z czasem zaczyna się też w czwartek, potem w niedzielę. Często łączy się z bingem.

HIGH-FUNCTIONING ☐

„wszystko działa, więc nie mam problemu”

Pije dużo, ale **utrzymuje pracę, relacje, finanse**. Rozpoznanie opóźnione o lata. Często wykształcony, zaradny, lubiany. Wewnętrznie: poczucie podwójnego życia, lęk przed odkryciem.

02 Drink standardowy — co to właściwie jest

1 drink standardowy = **10 g czystego alkoholu**. Każda z poniższych porcji to dokładnie tyle samo alkoholu w czystej masie — niezależnie od formy.

250 ml

piwo 5%

100 ml

wino 12%

30 ml

wódka 40%

80 ml

wino wzmocnione 17%

Niskie ryzyko wg WHO: mężczyzna ≤2 drinki/dzień, kobieta ≤1 drink/dzień, **minimum 2 dni** w tygodniu całkowicie bez alkoholu. Powyżej: picie ryzykowne. *Butelka wina 750 ml = 7 drinków* — to nie jest „mało”.

03 Dziennik picia — 7 dni

Codziennie wieczorem wpisz, ile drinków standardowych dziś wypieś/-am, w jakim kontekście (sam/-a, w towarzystwie, do posiłku, na imprezie) i jakie było wyzwalające uczucie. *Liczy się szczerść, nie wynik.*

DZ.	DRINKI standardowe	CO PIŁEM/-AM	KONTEKST <i>sam, towarzystwo, posiłek</i>	UCZUCIE WCZEŚNIEJ
<i>Pn</i>				
<i>Wt</i>				
<i>Śr</i>				
<i>Cz</i>				
<i>Pt</i>				
<i>Sb</i>				
<i>Nd</i>				

04 ✨ Po 7 dniach — podsumowanie

SUMA DRINKÓW ZA 7 DNI

DNI CAŁKOWICIE BEZ ALKOHOLU

— ile takich było

MÓJ DOMINUJĄCY WZORZEC

— który z czterech, własnymi słowami

CZEGO NAUCZYŁ MNIE TYDZIEŃ OBSERWACJI

Klucz: Wzorzec mówi więcej niż średnia tygodniowa. *Binge* ze średnią „tylko 7 drinków/tydzień” oznacza w rzeczywistości 7 drinków w sobotę i 0 przez resztę — to inne ryzyko niż 1 drink dziennie. „Piję tylko wino” lub „tylko w weekendy” to dwa najczęstsze warianty zaprzeczenia w gabinecie. Forma alkoholu nie zmienia jego działania — liczy się **czysta masa i częstość**.