

Twoje *ciało*

Bez moralizowania, bez zastraszania. Sześć układów, na które alkohol działa najsilniej — i okna czasowe, w których zmiany jeszcze można cofnąć.

CZAS: 15 min **Psychoedukacja** **ŹRÓDŁO:** IARC; WHO (2018); Lancet GBD (2018); Pfefferbaum i wsp. (2014)

JAK UŻYWAĆ

Przejrzyj **sześć obszarów** wpływu alkoholu na ciało (sekcje 01-02). Przy każdym jest okno czasowe: jak szybko pojawia się szkoda, czy jest odwracalna, w jakim czasie. Na końcu zapisz, które *obiektywne wskaźniki zdrowia* chcesz monitorować w najbliższych miesiącach — to **lustro**, do którego można wracać.

DLACZEGO TO DZIAŁA

W 2018 r. *Lancet* w meta-analizie ponad 600 badań (GBD Alcohol Collaborators) stwierdził, że **nie istnieje bezpieczna dawka alkoholu** z punktu widzenia ogólnego ryzyka zdrowotnego. IARC klasyfikuje alkohol jako **karcynogen grupy 1** — ta sama kategoria co tytoń, azbest i promieniowanie jonizujące. Nawet 1 drink dziennie zwiększa ryzyko raka piersi o 7-10% (Chen, 2011). Dane somatyczne mogą być potężnym motywatorem zmiany — pokazują, że to *nie kwestia kontroli moralnej*, tylko biologia, którą można odwrócić, jeśli zacznie się dostatecznie wcześniej.

01 ☉ Wątroba · serce · przewód pokarmowy

WĄTROBA

stłuszczenie → marskość

Stłuszczenie wątroby pojawia się u **>90%** osób pijących ciężko. *Stłuszczenie jest odwracalne w 2-6 tygodni abstynencji*. Marskość — **nieodwracalna**. Okno czasowe między nimi to Twoje najwartościowsze miesiące.

SERCE

arytmie, kardiomiopatia, nadciśnienie

Holiday heart syndrome — arytmie po weekendowym picu. Przewlekłe picie powoduje **kardiomiopatię alkoholową** (powiększenie i osłabienie serca) — częściowo odwracalną po abstynencji.

PRZEWÓD POKARMOWY

trzustka, refluks, owrzodzenia

Ostre i przewlekłe zapalenie trzustki, refluks żołądkowo-przełykowy, owrzodzenia, krwawienie z żyłaków przełyku. Trzustka — najbardziej wrażliwy organ przewodu pokarmowego na alkohol.

02 ☼ Mózg · ryzyko nowotworów · odporność

MÓZG

atrofia, częściowa regeneracja

Alkohol dosłownie **zmniejsza objętość mózgu** — widoczna atrofia kory na *MRI*. Dobra wiadomość: *częściowa regeneracja* po 6-12 miesiącach abstynencji (Pfefferbaum, 2014).

NOWOTWORY

grupa 1 — karcynogen pewny

Jama ustna, gardło, przełyk, wątroba, jelito grube, **piers**. Już 1 drink/dzień zwiększa ryzyko raka piersi o 7-10% (Chen, 2011). Brak prognozy bezpiecznego.

ODPORNOŚĆ I SEN

infekcje, zaburzony sen REM

Alkohol obniża aktywność komórek odpornościowych — więcej infekcji oddechowych. Pozornie usypia, ale **fragmentaryzuje sen** i blokuje fazę *REM* — stąd „nie wyspałem/-am się” mimo 8 godzin.

03

**Wskaźniki, które można monitorować z lekarzem**

Cztery proste badania krwi pokazują, czy wątroba *wraca do równowagi*. Wynik powtórzony po 4–6 tygodniach abstynencji zwykle pokazuje wyraźną poprawę — to obiektywne lustro, do którego można wracać. Każdy lekarz rodzinny może je zlecić.

GGT — GAMMA-GLUTAMYLOTRANSFERAZA

Najczulszy marker przewlekłego picia. Norma do ~40 U/l. Spada o połowę w 2–6 tygodni abstynencji. *Wartość ≥ 80 to wyraźny sygnał alarmowy.*

AST / ALT — AMINOTRANSFERAZY

Wyższe AST niż ALT (stosunek ≥ 2) — typowy wzorzec uszkodzenia alkoholowego. Po odstawieniu — szybka normalizacja, jeśli nie ma marskości.

MCV — ŚREDNIA OBJĘTOŚĆ KRWINKI

Powiększone krwinki czerwone (**MCV > 100 fl**) to częsta cecha przewlekłego picia. Wraca do normy w 2–4 miesiące. Pokazuje, że obraz *układowo* się wyrównuje.

CDT — TRANSFERYNA UBOGOWĘGLOWODANOWA

Najbardziej swoisty marker picia z ostatnich 2–4 tygodni. Drogie, ale pewne. Stosowane zwłaszcza w monitorowaniu zmotywowanego trzeźwienia.

04

**Mój plan badań — co zlecę i kiedy powtórzę****WYNIKI, KTÓRE JUŻ ZNAM**

— GGT, AST, ALT, MCV, ostatnia data

CO CHCĘ DODATKOWO ZLECIĆ U LEKARZA**DATA UMÓWIENIA KOLEJNYCH BADAŃ****LEKARZ PROWADZĄCY**

— imię, nazwisko, numer

Klucz: *GBD Alcohol Collaborators (Lancet, 2018)*, meta-analiza 694 badań z 195 krajów: minimalne ryzyko zdrowotne odpowiada **spożyciu zerowemu**. Wcześniejsze badania pokazujące korzyść umiarkowanego picia okazały się obciążone błędem metodologicznym (porównywanie z byłymi pijącymi). Liczby krwi są *obiektywnym lustrem* — nie minimalizują, nie wstydzą się. Pokaż wyniki sobie i lekarzowi: „To są dane, co Ty o nich myślisz?”