

Wyciszanie *alarmu*

Systemu przywiązania nie da się wyłączyć — jest biologiczny. Ale jego reaktywność można świadomie obniżyć.

CZAS: 5–10 min **Codziennie** **ŹRÓDŁO:** Mikulincer & Shaver (2001); Carnelley & Rowe (2007)

JAK UŻYWAĆ

Dwa kroki. **1)** Rozpoznaj, kiedy Twój wewnętrzny alarm rośnie (skala 0–10 + sygnały ciała). **2)** Codziennie przez 5 min stosuj **torowanie bezpieczeństwa** (ang. *security priming*): wyobrażaj sobie osobę, która Cię kocha i akceptuje. Nie walcz z systemem — wycisz go innymi narzędziami.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Mikulincer i Shaver (2001) wykazali, że ekspozycja na sygnały bezpieczeństwa — nawet podprogowa — obniża aktywność systemu zagrożenia. Carnelley i Rowe (2007): regularne torowanie przez kilka dni przesuwają **wewnętrzne modele robocze** (ang. *internal working models*) w stronę bezpieczniejszych. Reaktywność lęku spada, gdy mózg częściej „ćwiczy” poczucie bycia kochanym.

PRZED

Zaznacz, jak głośno alarm dzwoni teraz, zanim zaczniesz ćwiczyć.

Aktywacja
teraz

cisza 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

pełny
alarm

01 ? Rozpoznaj nadmierną czujność

Nadmierna czujność (ang. *hypervigilance*) to ciągłe skanowanie drugiej osoby w poszukiwaniu sygnałów odrzucenia. Zadaj sobie trzy pytania — jeśli choć jedno brzmi znajomo, alarm prawdopodobnie pracuje na zawyżonych obrotach:

Czy analizuję **każdą** wiadomość pod kątem ukrytego znaczenia?

Czy ton głosu partnera traktuję jak **informację o całej relacji**?

Czy brak odpowiedzi odczytuję od razu jako **początek porzucenia**?

02 ? Torowanie bezpieczeństwa — ćwiczenie 5 min

JAK TO ROBIĆ

- 1 · Usiądź wygodnie, dłoń na sercu.
- 2 · Przywołaj osobę (żywą lub nie), przy której czułeś/-aś się bezpiecznie i akceptowany/a.
- 3 · Przez 5 min wyobrażaj sobie jej ciepło, głos, spojrzenie.
- 4 · Pozwól ciału zareagować na to wyobrażenie.

MOJA FIGURA BEZPIECZEŃSTWA

— kto i jaki konkretny moment z nią pamiętam

03 Mapa Twojego alarmu — sygnały ciała

Ciało zwykle wie pierwsze. Zaznacz, gdzie i jak odzywa się u Ciebie rosnąca aktywacja — to Twój wczesny sygnał ostrzegawczy, dający czas na reakcję zanim pojawi się protest.

GDZIE TO CZUJĘ W CIELE

— np. ścisk w klatce, napięte ramiona

CO ROBI WTEDY MOJA GŁOWA

— np. rozkręca się rozpamiętywanie

04 Dziennik torowania — 7 dni

Po każdym ćwiczeniu zanotuj aktywację przed i po. Po tygodniu zobaczysz, czy regularne torowanie obniża reaktywność.

DZ.	ĆWICZYŁEM/- AM? <i>tak / nie</i>	PRZED <i>0–10</i>	PO <i>0–10</i>	CO ZAUWAŻYŁEM/-AM
<i>Pn</i>				
<i>Wt</i>				
<i>Śr</i>				
<i>Cz</i>				
<i>Pt</i>				
<i>Sb</i>				
<i>Nd</i>				

Klucz: już 3 dni regularnego torowania bezpieczeństwa zmieniały w badaniach Carnelley i Rowe (2007) sposób, w jaki uczestnicy myśleli o relacjach. To nie „udawanie spokoju” — to *trening neuronalny*: im częściej mózg przeżywa bycie kochanym, tym ciszej dzwoni alarm porzucenia.

PO Po tygodniu praktyki — uśredniona aktywacja z ostatnich dni.

Aktywacja
po tyg.

cisza 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

pełny
alarm