

Eksperymenty *behawioralne*

Test prognozy w rzeczywistości. *Spisana prognoza* → *działanie* → *spisany wynik*. McManus 2012: skuteczniejsze niż sama restrukturyzacja — dostarczają doświadczenia, nie argumentów.

CZAS: 15 min Wersja edukacyjna **ŹRÓDŁO:** Beck (1979); McManus (2012); Bennett-Levy i wsp. (2004)

JAK UŻYWAĆ

1 · Zrozumiesz, dlaczego sama *dyskusja* nie rusza schematu (sekcja 01). **2** · Poznasz **prediction error** — mechanizm neurobiologiczny eksperymentu (sekcja 02). **3** · Zaplanujesz *swój* pierwszy eksperyment (sekcja 03). **4** · Poznasz zasady gradacji — dlaczego AvPD wymaga wolniejszego tempa niż SAD (sekcja 04).

DLACZEGO TO DZIAŁA

Eksperymenty behawioralne to **systematyczne testowanie przewidywań w rzeczywistości**: zapisana prognoza („wyśmieję mnie”) → zaplanowane działanie → zapisany wynik. McManus i wsp. (2012): eksperymenty są **skuteczniejsze** niż sama restrukturyzacja — pacjent **doświadcza**, a nie tylko myśli inaczej. Sama dyskusja poznawcza generuje intelektualną zgodę („wiem że tak mówisz, ale i tak to czuję”). Bez doświadczenia w ciele zmiana zostaje na poziomie deklaratywnym. Eksperyment uruchamia *pamięć epizodyczną*: pacjent **był** w sytuacji, **zrobił** coś, **zobaczył** wynik. Mechanizm: *prediction error* — różnica między oczekiwanym (katastrofa) a rzeczywistym (zwykle nic strasznego). Mózg uczy się przez prediction error silniej niż przez powtórzenie dyskusji. Bennett-Levy i wsp. (2004, *Oxford Guide*) opisali 50+ wzorców eksperymentów dla różnych zaburzeń.

01 Dlaczego sama dyskusja nie wystarcza

SAMA DYSKUSJA POZNAWCZA

„To nieprawda, że ludzie cię odrzucają”. Pacjent: „wiem, że tak mówisz, ale *i tak to czuję*”. Intelektualna zgoda. Schemat **się nie rusza** — zostaje na poziomie deklaratywnym.

EKSPERYMENT BEHAWIORALNY

Pacjent *był* w sytuacji, *zrobił* coś, *zobaczył* wynik. Pamięć epizodyczna (nie tylko semantyczna). Doświadczenie w ciele. Schemat dostaje **konkretne dane**, których nie umie zignorować.

Klucz zapisu: spisana prognoza *przed* + spisany wynik *po*. Bez zapisu mózg po fakcie zniekształca: „chyba jednak było źle”. Z zapisem nie da się zniekształcić — masz *obiektywny dowód* przed i po.

02 🎯 Prediction error — neurobiologia uczenia



Mechanizm: mózg uczy się przez *prediction error* silniej niż przez powtórzenie dyskusji. Im większa rozbieżność między oczekiwanym (katastrofa) a rzeczywistym (zwykle nic strasznego), tym silniejsza zmiana. Dlatego **katastroficzne prognozy** przed eksperymentem są *cenne* — zapewniają duże *prediction error*, gdy nic strasznego się nie dzieje.

03 ✎ Mój pierwszy eksperyment

SYTUACJA, KTÓREJ ZWYKLE UNIKAM

— *SUDS 20–40 (nie najgorsze)*

KONKRETNE DZIAŁANIE

— *krótkie, mierzalne, jednorazowe*

PROGNOZA — CO SIĘ STANIE?

— *ile osób, jakie reakcje, prawdopodobieństwo?*

WYNIK — WYPEŁNIJ PO EKSPERYMENCIE

— *co rzeczywiście się stało?*

04 💡 Zasady gradacji — AvPD wolniej niż SAD

1 • GRADACJA SUDS

20 → 40 → 60 → 80. **Nie skacz.**
Schemat AvPD jest głębszy niż lęk SAD — wymaga wolniejszego budowania doświadczeń korygujących.

2 • 1 EKSPERYMENT/TYDZIEŃ

W pełni przygotowany. „Zrób kilka rzeczy w tym tygodniu” → przeciążenie → „*nawet tego nie zrobiłem*” → potwierdzenie schematu.

3 • DEBRIEFING

Po każdym: spisuj wynik, porównaj z prognozą. **Co to mówi o moim schemacie?** Bez debriefingu eksperyment się ulatnia.

Klucz: eksperyment to *test prognozy*, nie wyzwanie heroiczne. Małe kroki, w pełni przygotowane, ze spisana prognozą i wynikiem. McManus i wsp. (2012): eksperymenty *skuteczniejsze* niż restrukturyzacja kognitywna — bo dostarczają **doświadczenia**, nie argumentów. AvPD wymaga *wolniejszego* tempa niż SAD — schemat głębszy, więc każdy eksperyment **w pełni przygotowany**: prognoza, plan B, debriefing. Bez zapisu — mózg po fakcie zniekształca. Z zapisem — masz dowód, którego schemat nie umie cofnąć.