

Stopniowa *ekspozycja społeczna*

Hierarchia SUDS 20 → 90, 3×/tydzień, **bez zachowań zabezpieczających**. Craske 2014: wariacja kontekstu silniejsza od powtórzenia. W AvPD — **wolniej** niż w SAD.

CZAS: 15 min Wersja edukacyjna

ŹRÓDŁO: Craske i wsp. (2014); Wolpe (1958); Marks (1969); Alden & Capreol (1993)

JAK UŻYWAĆ

1 · Poznasz *hierarchię SUDS* dla AvPD (sekcja 01).
2 · Zrozumiesz **uczenie hamujące** (ang. *inhibitory learning*) Craske (sekcja 02) — mózg nie zapomina lęku, uczy się konkurencyjnego skojarzenia. **3** · Zbudujesz *swoją* hierarchię (sekcja 03). **4** · Poznasz cztery zasady skuteczności: bez safety, wariacja, 3×/tydz, równoległe z tożsamością (sekcja 04).

DLACZEGO TO DZIAŁA

Stopniowa ekspozycja społeczna pozostaje **rdzeniem behawioralnym** terapii AvPD — hierarchia od SUDS 20 (uśmiech do sprzedawcy) do SUDS 90 (celowa „głupota” publicznie, *shame attack* Ellisa). Craske i wsp. (2014, uczenie hamujące, ang. *inhibitory learning*): mózg *nie zapomina* lęku — uczy się **konkurencyjnego skojarzenia** („sytuacja społeczna → bezpieczna”), które rywalizuje ze starym. **Wariacja kontekstu** (różne miejsca, różne osoby) działa silniej niż powtarzanie tej samej ekspozycji. Pacjent zaczyna od zbyt trudnej sytuacji („idę na imprezę”) — porażka potwierdza schemat, terapia kończy się przed startem. Albo: ekspozycja z *zachowaniami zabezpieczającymi* (alkohol, telefon, partner obok) — bez efektu, bo mózg uczy się „przeżyłem dzięki safety”, nie „przeżyłem mimo lęku”. W AvPD przejście przez całą hierarchię trwa zwykle **6-12 miesięcy**, nie 3 — schemat głębszy niż w SAD.

01 Hierarchia SUDS dla AvPD

SUDS 20–30 • START

Uśmiech do sprzedawcy. Krótkie *dzień dobry* do sąsiada. Pytanie o godzinę na ulicy. Sytuacje, w których wycofanie jest **nieuzasadnione**, ale schemat i tak je sygnalizuje jako zagrożenie.

SUDS 40–50 • ROZMOWY

Pytanie kasjerki o produkt. Rozmowa z osobą w kolejce o pogodzie. Kawa z kolegą z pracy. Pierwsze sytuacje, w których pacjent *mówi coś o sobie* (choćby błaho).

SUDS 60–70 • GRUPY

Dołączenie do kursu/grupy. Zabranie głosu na zebraniu. *Samodłonięcie* — powiedzenie czegoś osobistego. Tu zaczyna się prawdziwa praca z tożsamością.

SUDS 80–90 • SHAME ATTACK

Prezentacja publiczna. Celowa „głupota” publicznie (*shame attack* à la Ellis: zapytanie na ulicy o coś bezsensownego). Cel: **doświadczyć**, że wstyd minie, nie zniszczy.

Reguła wzrostu: +10–15 SUDS na tydzień, *nie skacz*. 8–10 stopni w pełnej hierarchii. W AvPD wolniej niż w SAD — schemat defektywności potrzebuje wielu doświadczeń korygujących, by zacząć ustępować. *Cierpliwość = warunek skuteczności*.

02 🕒 Inhibitory learning — mechanizm Craske 2014

STARE: SYTUACJA → ZAGROŻENIE

sieć trwa — nie znika, nie da się jej „wymazać”

NOWE: SYTUACJA → BEZPIECZNE

konkurencyjne skojarzenie — buduje się ekspozycją

WARIACJA KONTEKSTU = GENERALIZACJA

różne miejsca, różne osoby — nowa sieć przebija starą w każdej sytuacji, nie tylko ćwiczonej

Klucz: stara sieć neuronalna „sytuacja społeczna = zagrożenie” zostaje — ale jeśli zbudujesz *silniejszą* nową sieć „sytuacja społeczna = bezpieczna”, ta nowa *przebije* starą w momencie aktywacji. Wariacja kontekstu generalizuje nowe skojarzenie. Powtarzanie tej samej ekspozycji w tym samym kontekście — uczy *tylko tego kontekstu*.

03 ✎ Moja hierarchia — 5 stopni

SUDS 20–30 — START

— najłatwiejsze, zacznij tu

SUDS 40–50 — KRÓTKA ROZMOWA

— z osobą znaną

SUDS 60 — GRUPA / COŚ OSOBISTEGO

— co konkretnie powiedział(a)byś?

SUDS 80 — NAJTRUDNIEJSZE

— cel na 6–12 miesięcy

04 💡 Cztery zasady skuteczności

1 • BEZ ZACHOWAŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH

Alkohol, telefon, partner-tarcza — **neutralizują efekt**.
Mózg uczy się „przeżyłem dzięki nim”, nie „mimo lęku”.

2 • WARIACJA KONTEKSTU

Craske 2014: *różne miejsca, różne osoby* > powtarzanie.
Generalizacja nowego skojarzenia.

3 • MINIMUM 3×/TYDZIEŃ

Rzadziej — uczenie się nie utrwała. Częściej — bez sensu,
bo mózg potrzebuje czasu na konsolidację.

4 • RÓWNOLEGLE Z TOŻSAMOŚCIĄ

Sama ekspozycja *nie wystarcza* w AvPD. 100 ekspozycji
bez pracy ze schematem = unikanie wraca po terapii.

Klucz: ekspozycja w AvPD *nie wystarcza* bez pracy nad tożsamością. Możesz zrobić 100 ekspozycji — jeśli nadal wierzysz „*jestem wadliwy/-a*”, po zakończeniu terapii unikanie wraca. Protokół AvPD = **ekspozycja + ST + CFT**, nie sama ekspozycja. Craske 2014: *inhibitory learning* + **wariacja kontekstu**. Reguła: 3 ekspozycje/tydzień, *bez safety*, wzrost +10–15 SUDS na tydzień. W AvPD pełna hierarchia: 6–12 miesięcy. *Nie szybciej* — schemat defektywności wymaga wielu doświadczeń korygujących, by zacząć ustępować.