

Drabina *mikrokroków*

Anhedonia — utrata zdolności do odczuwania przyjemności — nie cofa się od razu. Drabina kroków od 1 do 10 pomaga odzyskiwać ją stopniowo, bez frustracji „wciąż nic nie czuję”.

CZAS: 20 min · zbudowanie drabiny Codziennie 1 krok, 4–6 tygodni

ŹRÓDŁO: Dimidjian i wsp. (2006); Ferster (1973)

JAK UŻYWAĆ

Anhedonia w depresji nie znaczy, że *nigdy* nie będziesz odczuwać przyjemności — znaczy, że mózg **chwilowo nie wykorzystuje sygnału nagrody**. Odzyskuje się to przez powtarzaną ekspozycję na drobne nagradzające bodźce. Zbuduj **drabinę 10 stopni**: od najprostszego (na łóżku, 30 s) do najtrudniejszego (większa aktywność społeczna). Wykonuj *jeden stopień dziennie*. Nie czekaj na uczucie radości — wykonaj i przejdź do następnego. To trening systemu nagrody, nie test motywacji.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Mechanizm anhedonii: w depresji obniża się aktywność **układu mezo limbicznego** (dopamina, jądro półleżące, brzuszny obszar nakrywk) — układu nagrody. Jednorazowa ekspozycja nie wystarczy, by go aktywować. Potrzeba *regularnego, powtarzanego, drobnego stymulowania* — i wtedy wraca zdolność do hedonicznego odbioru sygnałów. Ferster (1973) opisał to jako „odbudowywanie warunkowania nagrody”. W praktyce: po 3–4 tygodniach codziennej drobnej ekspozycji ludzie zaczynają odczuwać uśmiech, przyjemność z herbaty, ciepło — sygnały, które wcześniej nie docierały.

01 Jak zbudować drabinę — 4 zasady

1 · MIKROKROKI

Stopień 1 ma być **tak mały, że wręcz absurdalnie łatwy**. Nie „wyjść z domu”, lecz „założyć skarpetki w łóżku”. Cel: 100% wykonalności.

2 · KONKRET ZMYSŁOWY

Każdy stopień ma **konkretny zmysłowy element** — ciepło wody, smak, zapach, dotyk koca. Mózg nagradza sensorykę, nie abstrakcję.

3 · STOPNIOWANIE WYSIŁKU

Każdy następny stopień *nieco* trudniejszy. Skoki o 3–4 poziomy = frustracja i porzucenie. Skok o 1 poziom = utrzymanie.

4 · BEZ OCENY PO WYKONANIU

Nie oceniaj „czy się udało” w sensie odczutej przyjemności. Oceniaj tylko **czy wykonałeś/-am**. Sygnał nagrody przyjdzie po 2–3 tygodniach.

02 Przykładowa drabina (do zaadaptowania)

1. Otwarcie okna na 1 minutę — wpuścić chłodne powietrze, poczuć na twarzy
2. Włączenie ulubionego utworu — 1 piosenka, bez wstawania
3. Ciepły prysznic — 5 minut, świadome czucie wody
4. Filiżanka kawy/herbaty — zaparzyć powoli, pić bez telefonu, czuć smak
5. Wyjście przed dom na 5 minut — postać, zobaczyć niebo
6. Spacer 15 minut w okolicy — bez celu, tylko ruch i powietrze
7. Krótkie spotkanie — kawa z bliską osobą, 30 minut
8. Aktywność, którą lubiłeś/-am — gra, czytanie, gotowanie, 30 minut
9. Dłuższy spacer w parku/lesie — 45 minut, świadoma ekspozycja na naturę
10. Wyjście z bliską osobą — kawiarnia, kino, wystawa, 1–2 godziny

03 \ Moja drabina — 10 stopni

Zaczniij od stopnia 1 (tak małego, że nie da się go nie wykonać). Dodawaj stopniowo trudniejsze, w gradacji intuicyjnej dla Ciebie.

NR	MÓJ KROK <i>konkretnie co, gdzie, ile czasu</i>	WYKONANE <i>data + ✓</i>	CO POCZUŁEM/-AM <i>0–10</i>
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

04 ☉ Co robić, gdy...

WCIĄŻ NIC NIE CZUJĘ PO WYKONANIU

To *normalne* w pierwszych 2–3 tygodniach. Mózg uczy się odzyskiwać sygnał, nie wytwarza go od razu. Wykonuj dalej.

NIE UDAŁO SIĘ WYKONAĆ KROKU

Cofnij się o pół poziomu. Jeśli „5 minut spacer” nie poszło, zmień na „wyjść przed dom na 1 minutę”. Krok ma być wykonywalny.

CZUJĘ SIĘ GORZEJ PO WYKONANIU

Sprawdź, czy nie wybrałeś/-am za trudnego kroku albo czy nie była to *aktywność społeczna w fazie wysokiej anhedonii* (kontakt z ludźmi wymaga większego progu). Wróć do kroku samotnościowego.

NAGLE SIĘ ŚWIETNIE CZUJĘ, CHCĘ WIĘCEJ

W ChAD: ostrożnie. Trzymaj drabinę. „Skok o 4 poziomy bo nareszcie mam energię” to częsty wstęp do hipomanii. Zapisz w wykresie nastroju i sprawdź sen.

Klucz: w klasycznym modelu Ferstera (1973) anhedonia depresyjna to *wynik wycofania się ze świata nagród*, nie odwrotnie. Drabina mikrokroków odwraca ten proces — nawet jeśli pierwsze kroki wydają się „bezsensowne”, po 3–4 tygodniach mózg odzyskuje czułość na sygnał nagrody. Pacjenci wykonujący drabinę systematycznie raportują pierwsze *odzyskane uśmiechy* i mikroradości około 14. dnia (Dimidjian i wsp. 2006).