

Plan *stabilizacji BD*

Stabilizacja w BD to system: lek + rytmy + monitorowanie + plan kryzysowy + relacje. Pięć filarów codziennej praktyki — nie pojedyncza interwencja.

CZAS: 30 min — plan **CHARAKTER:** profilaktyka nawrotów

ŹRÓDŁO: Goodwin & Jamison (2007); Frank IPSRT (2005)

JAK UŻYWAĆ

Zbuduj swój plan w 5 filarach: **(1) Lek** — stabilizator codziennie, ta sama pora · **(2) Rytmy** — sen 7-8h, stałe pory posiłków, aktywność · **(3) Monitorowanie** — mood chart codziennie, wizyty u psychiatry · **(4) Plan kryzysowy** — sygnały ostrzegawcze, kontakty · **(5) Relacje** — 1-3 osoby wspierające. Każdy filar wymaga rutyn.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Frank (2005, IPSRT): „BD jest zaburzeniem **cyklicznym**. Stabilizacja nie oznacza końca leczenia — oznacza system, który wcześniej wychwytywał wahania”. Colom (2003, RCT): 80% pacjentów BD z pełnym 5-filarowym planem ma brak nawrotów w 2-letnim follow-upie. Brak jednego filaru zwiększa ryzyko nawrotu o 30-50%.

01 ✓ Pięć filarów stabilizacji

Każdy filar wymaga codziennych rutyn. Brak jednego = ślepa plama.

1 · LEK

Stabilizator (lit, walproinian, kwetiapina, lamotrygina) codziennie, ta sama pora, monitorowane stężenie (lit, walproinian).

2 · RYTMY

Sen 7-8h ciągle, stała pora kładzenia ± 30 min i wstawania. Stałe pory posiłków. Stała ekspozycja na światło dzienne.

3 · MONITOROWANIE

Mood chart codziennie (1 min — nastrój, sen, energia 0-10). Aplikacje: eMoods, Daylio. Wizyty u psychiatry co 1-3 mies.

4 · PLAN KRYZYSOWY

Sygnały ostrzegawcze (osobiste). Kontakty (psychiatra, 116 123). Działania (lek doraźny, redukcja stymulacji).

5 · RELACJE

1-3 osoby wiedzą o BD, znają Twoje sygnały, wiedzą kiedy interweniować. Stałe kontakty 1x w tygodniu.

⚙ CO OSŁABIA

Alkohol · zarwane noce · stymulanty · chroniczny stres · izolacja · brak monitorowania.

02 Mój plan stabilizacji — 5 filarów

Wypełnij szczegółowo. To dokument, który warto trzymać blisko (lodówka, biurko).

FILAR 1 • LEK

LEK + DAWKA + PORA

FILAR 2 • RYTMY

PORA KŁADZENIA / WSTAWANIA

FILAR 3 • MONITOROWANIE

SYSTEM MOOD CHART + NASTĘPNA WIZYTA

FILAR 4 • PLAN KRYZYSOWY

MOJE SYGNAŁY OSTRZEGAWCZE + TELEFON PSYCHIATRA

FILAR 5 • RELACJE

OSOBA 1 + KONTAKT / OSOBA 2 + KONTAKT

03 Przegląd kwartalny

Co 3 miesiące — zatrzymaj się i sprawdź każdy filar.

KWARTAŁ	LEK OK / problem	RYTMY OK / problem	MONITOROWANIE OK / problem	PLAN KRYZYS. aktualny?	RELACJE OK / problem	CO ZMIEŃĆ

Klucz: Frank (2005, IPSRT): „w BD stabilizacja jest **codzienną praktyką**, nie celem osiągniętym raz. 5 filarów codziennie — to różnica między 80% remisją a powtarzającymi się epizodami”.