

Surfowanie *po impulsie* (*urge surfing*)

Obserwacja impulsu jak fali — narasta, kulminuje 15–30 min, opada sama. **NIE** walka, **NIE** działanie — tylko towarzyszenie. Bowen 2014 MBRP.

CZAS: 20 min · trening + użycie w kryzysie · Etap 2–3 CBT-E · narzędzie kryzysowe

ŹRÓDŁO: Marlatt (1985); Bowen i in. (2014, MBRP)

JAK UŻYWAĆ

Poznaj **metaforę fali** (sekcja 1), **siedem kroków protokołu** (sekcja 2). Sekcja 3 — praktyka. Sekcja 4 — krzywa impulsu.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Surfowanie po impulsie (*urge surfing*) — technika z *Mindfulness-Based Profilaktyki Nawrotów* (Marlatt & Gordon 1985), adaptacja dla bulimii Bowen i in. (2014). Założenie: impuls jest jak **fala** — narasta, szczyt, opada. *Nie trwa wiecznie*. Typowa fala trwa **15–30 minut**, jeśli „*nie nakarmisz*” jej zachowaniem. Klient uczy się *obserwować* impuls jak surfer obserwuje falę — nie walczyć, tylko *towarzyszyć*. Bowen i in. (2014): MBRP redukuje nawroty o 30–50%. Witkiewitz i in. (2014): skuteczne w BED i bulimii. Pokazuje, że *można wytrzymać*, bo impuls **opadnie sam**. Uzupełnienie DBT distress tolerance.

01 ● Metafora impulsu jako fali

Faza 1 — narastanie: Impuls rośnie 0 → 7 w 5–10 min.

Faza 2 — szczyt: 8–9 z 10, trwa 5–15 min. Wrażenie „*nie wytrzymam*”.

Faza 3 — opadanie: Sam z siebie impuls słabnie 9 → 4 w 10–20 min.

Faza 4 — wyciszenie: Cichnie do 1–2. Pełna fala: **15–45 min**.

Klucz: impuls *nie* trwa wiecznie. Wrażenie „*muszę zjeść albo umrę*” jest *iluzją* — fizjologicznie impuls **opada sam**. To *fakt biologiczny*. Każde „*przesurfowanie*” uczy mózg, że *można przetrwać*.

02 ≡ Siedem kroków surfowania po impulsie

1 · ZAUWAŻ IMPULS

„*Mam silny impuls epizodu*”. Nazwanie obniża siłę. *Affect labeling* (Lieberman 2007).

2 · NIE WALCZ, NIE DZIAŁAJ

Dwa typowe błędy: *walka* („*zatrzymaj impuls!*”) lub *działanie* (epizod). Trzecia droga: **tylko obserwacja**.

3 · OBSERWUJ JAK FALĘ

Zauważ jak impuls się *zmienia*. Gdzie czujesz w ciele? Jak intensywnie? Czy rośnie? Słabnie?

4 · ODDECH JAKO KOTWICA

Wolny, spokojny oddech. Wydech dłuższy od wdechu. Kotwica do tu-i-teraz, gdy mózg krzyczy „*działaj*”.

5 · MONITOROWANIE CO 5 MIN

Co 5 minut sprawdź intensywność impulsu (skala 0–10). Zapisz. Zobaczysz, że krzywa się *zmienia*.

6 · OPÓŹNIJ 15–30 MIN

Decyzja na końcu: „*za 30 minut, jeśli nadal będę chciał/-a — wtedy*”. Zwykle do tego czasu impuls znacząco opadnie.

7 · OBSERWACJA: OPADŁ SAM

Po 30 minutach — sprawdź: impuls opadł? Zwykle tak. To *dowód empiryczny*: można przetrwać bez

03 \ Moja praktyka surfowania po impulsie

GDZIE CZUJĘ IMPULS W CIELE

— żołądek, klatka piersiowa, gardło, ramiona; opisz

CO ZWYKLE MYŚLĘ W SZCZYCIE IMPULSU

— „muszę zjeść”, „nie wytrzymam”, „nie ma sensu”; konkretne myśli

04 \ Obserwacja krzywej impulsu

Następnym razem, gdy pojawi się silny impuls, **nie działaj** — zamiast tego mierz intensywność co 5 minut. Zobaczysz *krzywą fali* na własne oczy.

MINUTA	0	5	10	15	20	25	30
Intensywność 0-10							

Klucz: surfowanie po impulsie jest *uwalniającą* techniką, ponieważ przeformułowuje impuls jako *tymczasowe zjawisko*, nie *wszechpotężną siłę*. Marlatt (1985) opracował tę technikę dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków — i okazała się jedną z najsilniejszych pojedynczych interwencji w profilaktyce nawrotów. Bowen i in. (2014) rozwinęli *Mindfulness-Based Relapse Prevention* (MBRP), w którym surfowanie po impulsie jest centralną techniką. Witkiewitz i in. (2014): w BED i bulimii surfowanie po impulsie redukuje epizody o 30–50%. **Mechanizm:** pacjent dosłownie *doświadcza* spadku impulsu na własnej skórze. To nie jest *teoria* — to *obserwacja*. Po 3–5 udanych „surfowaniach” impulsy stają się znacząco słabsze, ponieważ mózg uczy się: „*impulsy opadają same — nie musisz działać*”. **Pierwsze próby** są najtrudniejsze. Pacjenci często zgłaszają „*nie wytrzymam, muszę zjeść*” — to *fala*, nie fakt. Wystarczy *nie działać* przez 15–30 minut. Wsparcie zaufanej osoby (telefon, obecność) **znacząco** ułatwia. Technika *nie* jest dla pacjentów z ciężką dysregulacją emocjonalną w ostrej fazie — wtedy lepiej zacząć od TIPP (aktywna regulacja fizjologiczna). Surfowanie po impulsie jest *uzupełnieniem* DBT skille, nie zastąpieniem.