

# Pokarmy *zakazane*

Systematyczne wprowadzanie pokarmów wywołujących lęk lub epizody. Stopniowo, w hierarchii, z monitoringiem dyskomfortu. Glasofer 2013: efekt porównywalny do ekspozycji w fobiach.

**CZAS:** 45 min · sesja + zadania domowe Etap 2-3 CBT-E (sesje 10-16) · po regułach

**ŹRÓDŁO:** Fairburn (2008); Glasofer, Albano i in. (2013); Steinglass i in. (2012)

## JAK UŻYWAĆ

Poznaj **mechanizm** food exposure (sekcja 1), **siedem kroków protokołu** (sekcja 2). Sekcja 3 — hierarchia 5 pokarmów. Sekcja 4 — dziennik ekspozycji.

## DLACZEGO TO DZIAŁA

Ekspozycja na pokarmy zakazane to **systematyczne wprowadzenie** pokarmów, których klient *unika*. Mechanizm: lęk → unikanie → gdy „pęka” → **cała dzienna ilość zjadana naraz**. Glasofer, Albano i in. (2013): efekt porównywalny do ekspozycji w leczeniu fobii ( $d = 0,7-0,9$ ). Steinglass i in. (2012): istotny spadek lęku przed pokarmem. Technika: **stopniowe wprowadzanie** małych ilości, **bez kompensacji**. Cel: pokazać mózgowi, że „po zjedzeniu nic się nie dzieje”. Wymaga stabilności 3+2 i świadomości reguł.

## 01 ● Mechanizm — dlaczego ekspozycja działa

**Bez ekspozycji:** Lęk → unikanie → pokarm staje się *magnesem* → epizod → potwierdzenie „*nie umiem tego jeść*”.

**Z ekspozycją:** Mała kontrolowana porcja → **tolerancja** 30-60 min bez kompensacji → mózg uczy się: „*nic strasznego się nie stało*” → powtórzenie 5-10× → pokarm *traci magnetyczność*.

**Cele:** habituacja lęku, dekonstrukcja kategorii „*dobre / złe*”, tolerancja bez kompensacji, integracja do normalnej diety.

## 02 = Siedem kroków protokołu

### 1 · LISTA 10-20 POKARMÓW

Wszystkie pokarmy, których unikasz lub które wywołują lęk. Konkretnie nazwy, nie kategorie ogólne.

### 2 · OCENA LĘKU SUDS 0-100

Dla każdego pokarmu — jaki lęk (*Subjective Units of Distress Scale*)? 0 = brak, 100 = maksymalny.

### 3 · HIERARCHIA ROSNĄCA

Uporządkuj pokarmy od najmniejszego lęku do największego. To Twoja *drabina* ekspozycji.

### 4 · START OD 30-40 SUDS

Nie od najtrudniejszego. Średnio niska sztywność. Sukces budowniczo działa.

### 5 · POWTARZANIE — SUDS W DÓŁ

Każdy pokarm 5-10× przez tydzień. Cel: *SUDS* spada do poziomu „*normalny*” (poniżej 20).

### 6 · TYGODNIOWO NOWY POKARM

Po opanowaniu jednego — następny z hierarchii. Cierpliwość: 10-20 tygodni dla pełnego programu.

### 7 · BEZ KOMPENSACJI — WARUNEK KLUCZOWY

Po ekspozycji **nie kompensuj** (bez wymiotów, ćwiczeń, głodówki). Kompensacja niszczy ekspozycję — mózg uczy się: „*zjadłem zakazany pokarm i musiałem to naprawić*”. Bez kompensacji uczy się: „*zjadłem i nic strasznego się nie stało*”.

### 03 \ Moja hierarchia pokarmów

Wypisz **10 pokarmów** w kolejności rosnącego lęku. Najmniej lęku na górze, najtrudniejszy na dole. Każdy poziom realizujesz przez tydzień, dopóki lęk znacząco nie opadnie.

| # | POKARM | SUDS 0–100 | KONTEKST EKSPOZYCJI |
|---|--------|------------|---------------------|
| 1 |        |            |                     |
| 2 |        |            |                     |
| 3 |        |            |                     |
| 4 |        |            |                     |
| 5 |        |            |                     |

### 04 \ Dziennik ekspozycji

Dla każdej ekspozycji zapisz: pokarm, ilość, *SUDS* przed, *SUDS* po 30 minutach. Z czasem zobaczysz, że *SUDS* spada — to dowód, że ekspozycja działa.

| DATA | POKARM + ILOŚĆ | SUDS PRZED | SUDS PO 30 MIN |
|------|----------------|------------|----------------|
|      |                |            |                |
|      |                |            |                |
|      |                |            |                |

**Klucz:** ekspozycja na pokarmy zakazane *nie* jest „*narzucaniem sobie*” jedzenia — jest **strukturyzowanym treningiem** tolerancji lęku. Glasofer, Albano i in. (2013): mechanizm jest *identyczny* jak w leczeniu fobii — habituacja przez wytrzymanie dyskomfortu, bez ucieczki. Po 5–10 powtórzeniach z jednym pokarmem lęk spada o 50–70%. Steinglass i in. (2012): w szpitalnym RCT z pacjentkami z zaburzeniami odżywiania *food exposure* dawała **znaczący** wzrost spożycia *normalnych* porcji i spadek lęku przed pokarmem — efekty utrzymywały się 6 miesięcy po zakończeniu. **Warunek krytyczny:** *bez kompensacji*. Kompensacja niszczy ekspozycję, ponieważ uczy mózg „*zjadłem zakazany pokarm i musiałem to naprawić*”. Tylko *bez kompensacji* ekspozycja daje uczenie się: „*zjadłem i nic strasznego się nie stało*”. Fairburn (2008): w CBT-E ekspozycja na pokarmy *integruje się* z pracą nad regułami żywieniowymi — po identyfikacji reguły „*nie wolno X*” naturalnym krokiem jest ekspozycja na X. To *logiczne* rozszerzenie poprzedniego handoutu. Pacjenci często czują **znaczącą ulgę** po opanowaniu pierwszych 3–4 pokarmów — bo widzą, że „*magia*” zakazanych jedzeń znika. To jest *moment przełomowy* w terapii.