

# Traumatyzacja *wtórna*

*Opiekun może rozwinąć objawy podobne do stresu pourazowego — nie z powodu własnej traumy, lecz z ekspozycji na cierpienie bliskiego. To realne i wymaga troski.*

**CZAS:** 15 min **POZIOM:** średni **ŹRÓDŁO:** Figley (1995); Stamm (2010)

## JAK UŻYWAĆ

Karta wyjaśnia zjawiska traumatyzacji wtórnej i zmęczenia współczuciem u opiekunów — i normalizuje prawo opiekuna do własnych objawów oraz wsparcia. Pokazuje, jak rozpoznać sygnały i zadbać o siebie, zamiast bagatelizować („to nie ja jestem chory”).

## DLACZEGO TO DZIAŁA

Osoby bliskie i opiekunowie mogą rozwijać objawy podobne do stresu pourazowego — nie z powodu własnej traumy, lecz z ekspozycji na cierpienie bliskiej osoby (Figley, 1995). Zmęczenie współczuciem (ang. *compassion fatigue*) to wyczerpanie emocjonalne z przewlekłego pomagania. Objawy: powracające obrazy, unikanie, nadmierne pobudzenie, cynizm, bezradność. Dotyka znacznej części opiekunów osób przewlekle chorych. Kluczowe: opiekun *ma prawo* do własnych objawów i do leczenia.

01



## Jak o siebie zadbać

**1 • Rozpoznaj objawy u siebie** powracające obrazy, unikanie, pobudzenie, cynizm, bezradność.

**2 • Uznaj swoje prawo do nich** „to nie ja jestem chory” nie znaczy „nic mi nie wolno czuć”.

**3 • Sięgnij po własne wsparcie** terapia lub superwizja własna — nie tylko dla bliskiego.

**4 • Zachowaj tożsamość poza rolą** jesteś kimś więcej niż opiekunem; pielęgnuj to.

## 02 Częsta pułapka

### PUŁAPKA

Bagatelizowanie własnych objawów („to nie ja jestem chory, nie mam prawa”) — prowadzi do zaniedbania własnego zdrowia. Albo utrata tożsamości — „jestem tylko opiekunem”, całe życie podporządkowane roli.

### CO POMAGA

Opiekun ma prawo do własnych objawów i leczenia — zadbanie o siebie nie jest egoizmem, lecz warunkiem dalszej pomocy. Tożsamość poza rolą opiekuna (relacje, zainteresowania) chroni przed wypaleniem.

## 03 Moja praktyka

### PO CZYM POZNAJĘ U SIEBIE ZMĘCZENIE WSPÓŁCZUCIEM

— *moje sygnały ostrzegawcze*

**Klucz:** to ważne i często pomijane: troska o cierpiącego bliskiego potrafi zranić *opiekuna* — objawami podobnymi do tych po traumie, mimo że sam jej nie przeżył. Bagatelizowanie ich („przecież to nie ja choruję”) tylko pogłębia problem. Opiekun ma takie samo prawo do wsparcia jak osoba, którą się opiekuje — a często bardziej je odkłada. Zadbanie o siebie jest tu warunkiem, nie luksusem.

### NARZĘDZIA POWIĄZANE Z TEGO MODUŁU

⊕ **Wypalenie opiekuńcze** — *pokrewne wyczerpanie*

⊕ **Plan samoopieki opiekuna** — *konkretne strategie troski o siebie*