

Plan *profilaktyki nawrotu*

Sześć części na jednej stronie A4: sygnały ostrzegawcze, strategie pierwszego i drugiego rzutu, kiedy wracać do terapii, zasoby, sesje przypominające. Bez planu efekt wygasa w 6–12 miesięcy.

CZAS: 60 min Ostatnie 3–5 sesji, po min. 3 miesiącach dziennika dowodów

ŹRÓDŁO: Hollon i in. (2005); Beck J. (2021)

JAK UŻYWAĆ

Tworzysz z klientem jednostronicowy dokument przygotowujący na przyszłe aktywacje przekonania. Sześć elementów: **sygnały wczesnego ostrzegania, strategie pierwszego rzutu, strategie drugiego rzutu, kiedy wrócić do terapii, lista wsparcia i zasobów, sesje przypominające** (ang. *booster*). Plan ma się zmieścić na A4, by klient mógł go nosić przy sobie i przeglądać co kilka miesięcy.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Po sukcesie terapii klient bez planu reaguje na aktywację paniką („wraca!”), katastrofizacją i regresją; bez profilaktyki 30–50% nawrotów w ciągu roku, a efekt terapii wygasa w 6–12 miesięcy. Dodanie planu profilaktyki istotnie zmniejsza nawroty (Hollon i in.). Plan normalizuje aktywacje („to nie powrót do punktu zero, to znajomy sygnał”) i daje gotową sekwencję działań, gdy emocje utrudniają jasne myślenie. To kluczowy dokument przygotowujący do „życia bez terapeutę”.

01

Sygnały wczesnego ostrzegania

Po czym klient pozna, że przekonanie się reaktywuje? Myśli, emocje, zachowania, sygnały z ciała.

MOJE SYGNAŁY OSTRZEGAWCZE

02

Strategie pierwszego i drugiego rzutu

PIERWSZY RZUT

— co robię od razu

DRUGI RZUT

— gdy to nie wystarcza

03 ☉ Kiedy wrócić do terapii + wsparcie

Jasne kryterium powrotu (np. objawy utrzymują się 2 tygodnie mimo strategii) i lista osób oraz zasobów wsparcia.

KIEDY WRACAM DO TERAPII

WSPARCIE I ZASOBY

04 ✨ Sesje przypominające i przegląd

Zaplanuj sesje przypominające (np. po 1, 3, 6 miesiącach) i przegląd planu co pół roku. Zapisz harmonogram.

HARMONOGRAM SESJI PRZYPOMINAJĄCYCH

Klucz: aktywacja przekonania po terapii jest normalna, nie oznacza powrotu do punktu zero. Plan na jednej stronie A4, noszony przy sobie, zamienia panikę w gotową sekwencję działań — i znacząco zmniejsza ryzyko nawrotu w ciągu pierwszego roku.